






(p599)


















# Ouvrage de Chirurgie

## Second Volume

### Suite des Plaies en particulier

#### Plaies des Voies Urinaires

De toutes les parties qui se composent  
c'est la vessie qui est la plus exposée, il  
est cependant rare qu'elle soit blessée par les  
urines, ce qui ne se reconnaît que par des signes  
proprement, puis par le mélange du sang  
avec les urines, qui sont tout mélangés ensemble,  
lorsqu'ils ont été lésés de ce côté, il n'est pas  
aussi aisé de les reconnaître, lorsqu'ils  
se sont fait en dedans. L'urine en sort la  
sortie des ces ligaments par l'urètre, les  
symptômes à employer, ne sont autres  
que ceux indiqués dans les paragraphes - Les Vessies  
générales.

Les Vessies peuvent aussi être divisées  
mais il faut pour cela que toutes  
les parties qui les recouvrent le soient  
aussi. Si la chose arrivait, on ne  
pourrait le reconnaître que par l'urine  
cadaverique, ou que les urines s'épanchaient  
dans l'abdomen.

La Vessie peut ensuite être divisée  
et dans des parties différentes suivant qu'elle

De la Vessie

Un peu plus au quelle l'écaille d. l. n. n. d.  
l'esp. ord. n. la part. postérieure d. l. n. n.  
Postérieure, généralement cela arrive partant  
dans celle-ci de la division immédiate  
avec le fœtus, l'urine s'épanche dans le  
si l'autre est alién, ce qui n'arrive  
le tissu est. alors c'est d. se donner  
est peut se passer d. la réunion  
à l'urine. L'urine qui le est. L'urine appuie  
la division d. l. l'urine, au mélange dans d. l.  
l'urine, la situation de la plaie. L'autre  
l'urine n'employez que la saine.

Plaque des intestins par  
instrumente tranchante d'une assez large étendue  
Cause dans la division d'un intestin  
il y a toujours un écartement des bords  
de la plaie, par la contraction des fibres  
musculaires qui se trouvent divisées eq.  
parant aux incisions faites de l'épave  
dans l'abdomen, on demande s'il faut faire  
le débridement des parois de l'abdomen pour  
faire une suture, ou bien si l'on doit  
abandonner la plaie à elle-même. Il faut  
même abandonner la plaie à elle-  
même, parce qu'il peut se faire  
que les intestins ne soient perdus  
ou bien quand même ils le seraient,  
la division peut être si petite, que  
les matières fécales ne puissent pas  
passer, et que d'ailleurs il peut y en avoir  
d. l. intestins, il y a toujours d. l. digestion



~~est~~ faite, parce qu'alors elle se trouve dans  
dans les gros intestins. L'animal peut se  
faire que la portion lésée ne soit point  
et si l'ouverture déplaçait des parois de  
l'abdomen et se ne croit impuissamment que  
l'animal chercheroit tout ce qui se trouve dans  
intestins, la portion lésée, parce qu'elle ne  
tandé pas de se faire. L'animal se croit.

Quant au cas de déplacement de l'intestin,  
si la lésion de celui-ci, n'étant pas viscérale  
de l'importance, il n'est pas d'avis de se faire tout  
seulement que de se faire une certaine portion  
d'intestin et dans le cas où une lésion se fait  
par, il n'est pas d'avis de se faire tout  
plus tard. Dans le cas que l'on se croit  
la portion lésée, on ne peut se faire  
apparence, il faut se croit tout  
l'intestin et dans le cas que l'on se croit  
un point de se faire tout, il faut se croit  
de l'intestin lequel des intestins en fait page 310.  
une des suture que l'on se croit dans.  
par la circonstance, l'animal que l'on se croit  
intestin dans tout son épaisseur, il faut se  
croit de même, on ne se croit un animal  
contre nature qui se fait alors se croit  
une des portions de l'intestin et l'animal  
par la suture animale, on se croit en se croit  
soit la même manière que par la suture  
d'intestin qu'on se croit.

Il faut de même se croit de l'animal.  
se croit que les intestins, l'animal

Il peut être intéressant par ses sentiments  
tranchants, qui paraissent dans une âme  
grande et tendre qui sont plus sensibles que  
simple jupon. Ces sortes de plâtres, sont  
plus sensibles lorsqu'ils sont que lorsqu'ils  
est plain, que lorsqu'il est tendu, par lequel  
peut se faire un épanchement dans l'âme.

Il est cependant à remarquer, que l'âme  
ne jouissant point de mouvement, et tant  
longtemps dans la même position il paraît  
se faire qu'il ne se fasse point d'émotion  
dans l'âme, parce que les premières parties  
passent au travers l'ouverture et sortent au  
dehors par le moyen de cette qui est ouverte  
par elle de l'âme, ensuite c'est que l'âme  
jouissant d'une forte irritation par la suite  
du corps vulnérable, il se constitue un état  
et produit le frémissement, que l'âme peut  
se sentir déterminer à volonté, ou irritant  
la balle avec le bout du doigt, ou bien  
tout autre corps, ce qui fait que les  
trois moyens déterminent l'intensité de la  
de l'âme.

Il n'y a point d'autre moyen à employer  
pour les sortes de plâtres, que les gâteaux  
d'émulsion et de sucrée le frémissement.

De la suture que l'on  
L'usage de  
11 suture employée dans les divisions. des plâtres de  
la suture, simplement pour les plaies.  
Au praticien pour cela celle qui se  
distingue dans le nom de suture au drapeau.

Voilà pour les  
plâtres pour les  
plaies, lire  
10 page 509.



Il faut aussi la pratiquer, avec une aiguille  
semblable à celle dont on se sert pour faire  
les simples. On est avec deux baguettes d'ivoire  
ou de bois, qui sont courbées, des fils et deux  
petits cylindres soit de bois, ou bien deux  
morceaux de plumes, ou bien tout autres  
corps cylindriques, tel que du taffetas  
d'Angleterre ramé etc.

Ainsi comment se pratiquer cette ouverture  
opération, ou ouverture d'oreille par le fait.  
insérer dans les brins de fils de la dentelle  
l'aiguille qu'il conviendrait, ensuite au bout  
d'une manière à peu près que pour  
les précédentes, si même qu'il y a que le  
doigt indicateur appliqué sur l'ouverture  
et le pouce dans l'ouverture, l'un ainsi  
on introduit au doigt de la même  
ouverture à celle qui tient l'aiguille, dans  
la plaie, avec lequel on ramène le petit  
du côté du bord de la plaie, en même  
temps que le pouce de la même main est  
appliqué sur le côté du bord supérieur  
de la plaie, qui était ainsi maintenue on  
introduit l'aiguille avec le pouce et le  
doigt indicateur de l'autre main, pendant  
que les autres sont fléchies, dans le bord  
de la plaie, en commençant par celui qui  
est le plus inférieur, qui une fois passé  
on introduit les extrémités du fil dans  
le bord supérieur de la même manière  
qui sont aussi grande le plus et les autres



Que les autres.

On fait tout les fils passés en nombre  
suffisant, qu'il conviendrait pour l'usage de la  
plaine, en augmentant par introduction l'ap-  
puyement de deux dans deux, les autres qui  
préviennent les fils dans toutes extrémités  
inférieures, qui étant introduit, on tire  
les fils par leurs extrémités opposées, de  
manière à enlever le cylindre comme celui  
de la plaine, après quoi on place entre  
chacun deux fils un petit cylindre  
que l'on fixe au point d'attache d'un simple  
cordon, puis de tissu en double, ou même en  
triple, et de cette manière la tuberculose  
traverse fait.

On laisse tout dans cet état, jusqu'à ce  
qu'il soit fait le temps qu'il conviendrait pour que l'épave  
se cicatrise, qui une fois cicatrisée, il  
passe les deux dans les brins de fil, les  
coudes vers le cylindre inférieur, qui lève  
l'autre, après quoi on le tire dans une  
du cylindre supérieur, on le saisissant par  
extrémités, et tirant par un bas qui est  
attaché sur les fils, qui se détachent de cette  
manière.

Sutures employées pour les  
plaies des intestins.

De celle de  
Pellat.

Il y en a de trois espèces, et  
de quatre d'usage de celle de Pellat,  
qui se pratiquent de même que les autres  
avec des aiguilles d'acier, et d'un cordon  
sans effiler que d'une seule et d'un fil,  
que l'on a enroulé de l'écorce de cerise.

que pour les Substantifs.

Voici comment elle se fait, au communément. On prend  
par exemple un fil dans l'aiguille dont elle se fait  
on doit la servir, qui s'est enfistée, on  
prend les deux bords de l'entaille desués;  
que l'on a réunit l'un contre l'autre, après  
qu'on a fait passer l'aiguille avec le  
fil dans les bords de la plaie, que l'on fait  
entrer d'un côté et passer de l'autre, après  
qu'on a fait passer de nouveau d'un côté  
que l'on a recommencé la première fois,  
à côté du bord de la plaie, et l'on continue  
de suite jusqu'à l'autre extrémité, après à  
celle d'un côté recommencé, qui une fois  
faite, on retire l'aiguille du fil, et l'on  
maintient l'entaille rapprochée contre les  
bords de la plaie des parois des bords  
au moyen des deux bouts du fil que  
l'on a, en ayant eu soin de l'entaille  
d'un côté par le bord au commencement à l'autre  
l'aiguille, comme à l'autre bout de la plaie.  
Cette suture n'est point aussi serrée  
comme que celle à deux qu'on a allans  
décrite, que celle à point passé par les  
bords de la plaie de l'entaille, qui  
par contraction des bords avec les  
parois abdominales, comme celle décrite.  
Lorsqu'il s'agit de la suture que l'on fait  
les bords de la plaie sont réunis, il ne s'agit  
que de réunir un des bords du fil  
que l'on maintient en dehors, au moyen  
qu'il faut le vent, tout l'autre bout.



De cette On fait de suite celle à deux, et de  
à deux. en un seul et même fait; Il faut pour cela  
avoir des aiguilles et des fils, qui soient  
égal aux points de sutures que l'on se  
fait, au lieu d'un grand fil et de deux  
aiguilles, qui sont l'un et l'autre comme  
la précédente.

Comment Lorsqu'on veut la pratiquer, elle se  
diffère de la précédente en ce qu'elle a plusieurs  
aiguilles et plusieurs fils, au lieu qu'elle n'en a qu'une  
et un seul fil. On se sert de la même  
de la plaie de l'intestin. De la même manière  
que pour la suture de l'utérus, mais on  
a soin de laisser un grand intervalle  
entre les ans, c'est à dire entre les points de  
chaque suture, que l'on continue de se  
servir jusqu'à la fin, on a soin de  
laisser un bout de fil d'une assez grande  
étendue, de manière qu'il se continue  
qui se fait, on a soin de faire comme  
la dernière se fait, de continuer tout le  
de fil les uns après les autres, au moyen du  
quel, après quoi, on s'assemble le tout  
à dire tout d'un côté avec ce qu'on  
l'autre, au moyen d'un torsion qu'on se  
fait en roulant, et l'on maintient de sorte  
les bords de la plaie contre la paroi  
abdominale.

Comment Dans la dissection, on coupe toutes les  
les appariées à un des côtés, après  
ce qu'on a vu le moyen tant ce qui se  
trouve de part et d'autre des bords de la plaie

Il y a en effet celle a point pres, qui  
s'ajoute a une autre aequale. D'oila et une  
fils. Voici comment qu'on la fait, on  
s'interaduit l'aiguille en la faisant passer  
d'un cote des bords de la plaie, qui la yant  
traverse avec celui du cote oppose, on  
la fait entrer de la meme maniere  
du cote par la quelle elle est sortie, et  
elle se cede du cote oppose, et l'on  
conduit ainsi de la meme maniere jusqu'a  
la fin, au point de s'arrêter la bague  
de la plaie l'aiguille, qui est faite au  
rapprocher les bords de la plaie des parois  
abdominales, de la meme maniere que  
dans les precedentes, et l'union est  
dans celle de l'exterieur le fil. Cette  
derniere espece de suture est due a cette  
suture, la quelle parait se voir souvent  
dans les autopsies de l'homme. Les  
membres autopsies de l'homme contractent  
un egre les bords de la plaie contractent  
ainsi de l'homme avec les parois abdominales.

De l'ouverture sanguine

Dans la cavite de l'abdomen, il y a  
indubitablement de la division des. Ce qui les  
naissent, que nous avons dit précédemment.  
et se divisent en parlant des larmes  
renferme dans la cavite de l'abdomen,  
il y en a encore d'autres qui sont  
et se divisent en parlant des larmes  
il y a, la veine cave, qui se divise  
a la par leur division dans le



10 à un épanchement sanguin vers qui ne se  
forme pas tout d'abord aussi étendu  
le croissant au premier abord, de cause de  
la pression continue et insupportable  
par les viscères abdominaux, <sup>humans</sup> ce qui fait  
qu'on ne remarque pas aussi bien l'épanche-  
ment le croissant et qu'on ne connaît que  
quelque chose de 15 jours et même trois  
semaines, et que pour cela on s'est dit  
un peu considérable par conséquent il n'est  
pas la cavité abdominale, car c'est  
celle du crâne et de la poitrine qui  
ne peut s'accumuler pour trop grande  
quantité de fluide sans que les fonctions  
des organes qui se trouvent dans ces  
cavités se dérangent, aussi se fait-il dans cette  
cavité une très grande accumulation de fluide  
comme nous en avons des exemples dans  
les apoplexies.

Quant à l'épanchement  
sanguin dans la cavité de l'abdomen  
le sang se toujours se loge au dessus des  
poumons, dans une des fosses iliales et  
par la présence, fait qu'il s'accumule  
en embarras comme dans les embarras  
qui ont au lieu pour les péricardes  
et s'écoule en une seule fosse et provoque  
une éruption dans les intestins au lieu d'un  
de suite, que l'on remarque que par  
des symptômes souvent analogues à ceux  
indiquant une inflammation du péricarde  
abdominal, d'où à une difficulté

durées, à une fluctuation que l'on voit  
dans la rigueur hyppocratrice en y portant  
la main. L'écoulement est épanchement d'un  
sang toujours très long temps qu'on le donne  
qu'on lui donne issue le sang lorsqu'il  
est à une adhérence fœdale et tout cela.

C'est surtout au fils de Jean Louis, fils  
que l'on doit des notions exactes sur  
les épanchements, car avant lui on n'en  
avait que très peu, qui a fait un mémoire  
à ce sujet et qu'on se trouve dans les  
mémoires de l'académie de chirurgie.  
Il n'y a guère d'exemple à ce sujet, il  
est rapporté qu'un, M. Sabatier en  
cite aussi un.

Il n'y a point d'autres moyens pour épancher  
l'écoulement aux épanchements, que de lui donner issue  
pratique une ouverture aux parois de  
l'abdomen, que l'on fait soit avec un  
triquart, ou bien avec une bistouri, il  
vaud mieux le servir de ce dernier que  
de celui, parce qu'il peut se faire que  
le sang étant grumeux ne puisse passer  
à travers sans ouverture, parce qu'il n'a  
point une assez grande fluidité. Il n'y a  
pas de règles précises pour pratiquer  
cette incision qui varie d'après la position  
du fœtus, l'état de l'utérus, l'état de la mère  
et de son fœtus, qui une fois ouvert,  
on laisse de donner issue à tout le sang  
qui se trouve contenu, l'écoulement.



12. on se conduiroit avec une dextérité pour  
acquiescer regardant l'aspect de la plaie.  
Lorsqu'on que l'on aurait des idées issues  
au fluide, il ne faudrait pas s'arrêter pour  
celui que le malade guérira, parce qu'il  
pour y avoir une inflammation plus ou  
moins considérable des parois du péricrâne  
et des fibres qu'elle renferment.

Des Plaies Des Membres  
Sans nerfs que de chose à dire de  
Sujet, surtout des parties molles, ma  
gré nous nous y sommes déjà arrêtés  
en parlant des générables; et qui nous  
occupe les autres sont les plaies des artères  
et les fractures.

#### Plaies Des Articulations.

Comme partout d'une manière générale  
et nous ne parlons nullement de la, qu  
la lésion des parties qui les entourent  
ou qui affermissent les os, et avec le  
rassemblement de ces os qui les forment.

Il s'agit ces parties nous ont et réintégré  
par toutes les espèces de corps étrangers  
dont nous nous sommes occupés, car  
piquants, tranchants, contondants et etc.  
parties au de la de leur inutilité à nous  
est par ces dernières qu'on en a l'usage.

De l'écoulement sanguin par ces parties qui servent à affermir  
au de la de la des parties qui servent à affermir  
des parties qui servent à affermir  
les articulations le contact de ces parties, peuvent être

porter au-delà de leur ductilité naturelle,  
et produire trois maladies qui sont des  
affections différentes, qui sont l'entorse, le  
diastasis et les luxations, mais nous ne parlons  
de ces dernières qu'en traitant des déplacements.

### 1<sup>re</sup> Des Entorses.

On peut entendre par là, la dislocation  
littéralement des parties qui sont en contact  
immédiat les os qui se touchent  
à former les articulations; On lui oppose  
souvent avec les lésions, les affections de la  
capsule.

Toutes les articulations ne sont point également  
aussi sujettes les uns que les autres aux articulations  
entorses, que les frottements ne parlent, et sont plus  
quels sont du saignement et de la jambe également  
toutes les articulations ne sont point également  
exposées également, lorsque le pied  
pour celle de l'humérus, lorsque on fait l'extension  
une chute sur le poignet, et quelle est  
sujette de douleurs assez fortes qui durent  
quelque temps assez long, sur le bras  
coudé, par une chute d'objet sur cette  
partie, d'ailleurs par un choc (coup).

En général plus une articulation est  
renforcée de ligaments et quelle joint  
de mouvements, plus elle est exposée  
à l'entorse, c'est pour quoi nous en  
parlons assez souvent aux poignets, aux  
coudes,

Il y a entorse dans une partie, toutes les





le premier c'est qu'entre les articulations an-  
il y en a beaucoup, les inférieures sont les  
plus faibles, c'est ce qu'on remarque  
l'hy. pour l'articulation du pied avec la  
jambe et dans celle du poignet. Enfin la  
première encore, c'est qu'il y a une différence  
ou l'on sait qu'il y a une différence de force  
c'est à dire de trois sortes d'articulations, ce qui  
est facile à constater par les animaux  
vivants, et même sur l'homme dans le  
cas d'amputation, tandis que même, il  
ne document pas de différence.

On pourroit croire que les os qui  
en résultent, comme le font les physiologues  
et les anatomistes, que le docteur qui leur  
pose et le chirurgien qui surmonte après  
une lésion, ne dépendent que de la rupture  
et tiraillement des nerfs et des ligaments.  
qui servent à une articulation, mais il est  
faute de savoir analyser ce qu'ils ont  
dit, que le chirurgien qui surmonte, ainsi  
que le docteur, ne dépendent que de l'effet  
du tiraillement des ligaments.

Ceci revient qu'une personne à une certaine  
intense, par la douleur que l'on a de la  
revenir quelque temps après qu'il a été reconnu  
une chute et par la difficulté de marcher  
qui l'accompagne, qui sont suivis d'une  
guérison ou d'une cure, qui doivent  
plus en avoir considérable, qui de même  
par les moyens appropriés, lesquels ont  
été employés à tort, tandis que



16 toutes les fois qu'on y a pas remédié, toutes  
elles durent très long temps, et dignes  
en une maladie. De l'art de l'art, toutes  
quand on les abandonne à elles mêmes.  
Il n'est cependant pas rare de savoir les  
malades elles sont été bien traitées, qu'on  
personnes ne souffrent à des époques très  
éloignées, tel que H. jusqu'à deux ans  
après, dans une même fièvre, sans point de  
maladie certaine, mais pas intervalle.

*magnum quoniam*  
*employé pour*  
*elle* On ne peut pas l'appeler abirritation  
qui la cause de l'irritation, mais au point  
en empêchant les effets, au moyen de bons  
régimes, qui l'employé dans ce cas,  
telle que l'air qui est le meilleur, toutes  
les fois qu'il est très froid, et qu'on a été  
de la remède, il faut même l'employé  
à la glace et même s'il est plus petit, dans  
laquelle on fait plonger le membre affecté  
au point de se voir très long temps,  
tel que deux ou trois heures, après  
quoi on le retire et on lui donne de  
réparation au moyen de l'air.

Il est cependant des circonstances où  
on ne peut pas l'employé, tel que dans  
le cas où est une femme qui a, et  
qui à un moment de l'air, par exemple  
si on l'employé, elle souffrirait dans  
l'air à la suppression des règles, et c'est  
le cas de mal. Il n'est de même pour  
une femme grosse qui donnerait peut-être



lien à l'appartement. A l'ord d'un ce cas de 17  
d'ont l'employé d'entre-voies effigies, l'effigie  
de l'effigie d'effigies, ce qui fait alors  
d'effigies le gonflement et l'effigies  
qu'il ne s'effigies, un d'effigies d'effigies  
Il a effigies par l'effigies d'effigies  
au ne doit la effigies en usage gonflement  
cas au le gonflement, un d'effigies d'effigies  
cas il d'effigies d'effigies d'effigies.

Par l'employé de l'effigies en l'effigies  
restent à l'effigies d'effigies le gonflement  
au lien à l'effigies, mais au d'effigies  
point d'effigies au d'effigies d'effigies  
après la effigies à un lien, qui d'effigies  
d'effigies au d'effigies d'effigies, au  
lien à une effigies de l'effigies. Il  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies chez les personnes d'effigies  
au d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
point d'effigies, d'effigies d'effigies d'effigies  
de l'effigies et cause des d'effigies, qui  
d'effigies lien à des d'effigies d'effigies  
d'effigies, qui d'effigies d'effigies d'effigies  
Cela d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
qui d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
une d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies  
d'effigies d'effigies d'effigies d'effigies

## Conclusion des articulations

Aucune n'est plus exposée que celle du genou, qui a le plus d'ord. par une articulation diserte, tandis que celles du flume, de l'humérus, etc. ont d'autres, n'ont le plus souvent que par une cause indirecte, telle que par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.

D'autres maladies peuvent occasionner la mortification, des humeurs, les tumeurs, etc. d'ord. par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.

Les plaies faites par les instruments piquants, et transforants des articulations, sont d'ord. par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.

Les plaies faites par les instruments piquants, et transforants des articulations, sont d'ord. par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.

Les plaies faites par les instruments piquants, et transforants des articulations, sont d'ord. par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.

Les plaies faites par les instruments piquants, et transforants des articulations, sont d'ord. par une chute sur les pieds, les genoux, etc. celles du flume, de l'humérus, etc. sont d'ord. par une chute sur le flume, à la cavité des cartilages articulaires.



permettre même dans l'intérieur de la cavité, 19  
qui toutes les fois qu'elles ne s'entraînent pas,  
elles restent dans celles des plaies faites  
aux parties molles comme ailleurs. Quand  
et celles qui pénètrent, elles sont les plus  
fâcheuses, que l'on a vu de quelques <sup>moyens de</sup> ~~réparation~~  
par des ligens certains, mais quel est celui qui  
qu'en possible, si c'est le sort de la <sup>partie</sup> ~~partie~~ <sup>des articulations</sup>  
synoviale. Encore pourroit-elle servir de la division

d'une membrane synoviale d'un tendon  
puis encore par le moyen de la pression  
d'une saignée dans l'intérieur de la cavité  
ou bien d'un fil, mais ce moyen est  
encore que par les plaies de la cavité  
du ligament, un moyen très incertain,  
par lequel peuvent servir de fautes de  
suppléer la cause d'acécité, par ce  
moyen peut servir de fautes de  
et produire la rupture de la membrane  
synoviale, ce qui encore divise les  
vaisseaux, lors même que toutes ces choses  
n'existent point et pénètrent dans l'articulation.  
D'ailleurs, est-ce qui peut servir la faire, toutes  
les fois qu'on a pas l'un de ces deux qui  
existe de corps étrangers dans l'articulation.

La conduite à tenir pour ces sortes de lésions  
de plaies, est d'abord de faire de suite  
toutes les fois que l'on a vu d'un  
quelque lésion un corps étranger, pour  
empêcher la pénétration de l'air dans la  
cavité articulaire, que l'on fait au moyen de  
lignes, le mieux possible, qui sont agencés



20 être accompagné de toutes fractures  
parce qu'il n'y a eu un autre D. de  
et qu'après le sang pénétre dans l'utérus  
de l'articulation, et donne lieu à un dépôt  
sanguin, mais on peut s'en rendre  
compte, et on se rendrait de la manière  
indignée, parce qu'on croit qu'il peut se faire  
un abcès du sang, comme il s'en fait  
une de la lymphe.

Lors qu'il se trouve des corps étrangers,  
comme des os, ou des tumeurs de les extraire s'il est possible  
sans nuire au corps. Des instruments convenables pour  
le cas de corps étrangers qu'ils ont faits, qui dépendent  
de la situation qu'ils ont faite, qui dépendent  
de la nature d'une tumeur, de. au lieu de la  
leur la nature, il faut faire alors une incision  
ou une tumeur, mais qui ne doit point être faite  
dans le diamètre opposé à celle qui lui a  
provoqué, le plus qu'il est possible.

Il faut aussi que les fractures qui  
sont faites de plusieurs parties par une même tumeur  
travaillant qu'il y a une articulation  
dépend, que des os se trouvent assez large qui  
peut servir, qui donne lieu à la pénétration  
de l'air dans elle, qui donne lieu à l'écoulement  
de la membrane synoviale qui la recouvre  
qui dans ce cas, sont très-dangereux  
qu'il faudrait les séparer, parce qu'on  
il faut réunir le plus possible les os de la  
l'apophyse.

Mais dans ce cas on est obligé de faire  
un bandage pour la conservation de la  
division de l'os au même temps, et qu'il

arrive  $\gamma\gamma$  pour la clavicule. Les  $\gamma\gamma$   
peuvent être en place sans  $\gamma\gamma$  <sup>distanc</sup>  
considérable, que l'on combattre par le  
usage du régime, du repos, et des  
cataplasmes émollients; si elle intervient  
par une violente suppuration et par <sup>dans les cas</sup> de clapiers  
des clapiers, et que le malade soit en <sup>d. foye</sup>  
danger par la dépense la vie, il faut <sup>parait</sup>  
en venir nécessairement à l'Amputation  
~~suppuration~~

### Plaine des Membres Supérieurs <sup>Leçon du</sup> ~~fracturée~~

Sans aller d'abord commencer par les  
parties molles, auxquelles nous nous arrêtons  
peu, — vu que nous en avons parlé d'une  
manière générale, en traitant des plaies;  
nous parlerons seulement de la division de  
artères et des plaies qui peuvent arriver  
au piquet et à la fracture de la main.

#### Plaies des artères.

Quelle que soit celle qui se trouve divisée,  
par les membres supérieurs, elle n'est  
pas d'autre nature, que ceux que nous avons  
indiqués en traitant de leur lésion d'une  
manière générale. Sans nous borner  
seulement à l'artere axillaire, par laquelle  
divisée, elle saigne  $\gamma\gamma$  et  $\gamma\gamma$  <sup>il y a</sup>  
en saie la ligature, ou qu'il est <sup>particulier</sup>  
difficile de le reconnaître  $\gamma\gamma$ , et qu'il est  
l'une des proloins très <sup>de laillure</sup>  $\gamma\gamma$  <sup>qui sont</sup>





en commençant par D'écarter les ligaments, et  
en faisant une incision au moyen du  
Pectore, qui commencerait au milieu  
de la clavicule et finit dans l'apophyse  
correspondant au creux de l'aisselle, mais finit  
divisée, au-dessus le muscle grand Dorsal  
après avoir introduit au-dessous la bande  
cannelée, qui est dirigée d'une manière à ce  
que la saumure regarde en haut, dans  
laquelle on fait q. l'écarter le Pectore, qui en  
fait la Division, en élevant le tranchant,  
en sorte de guérir au ne fait autant au pectore  
Pectoral, qui étant au dessous de la  
Vaine Brachiale et le plectre dans la  
quel on cause ensuite l'artere Brachiale,  
que l'on met à découvert, au moyen de  
la dissection en prenant garde d'écarter la  
Vaine et de diviser les nerfs. Unfois l'artere  
découverte et isolée, on la saigne, que l'on  
peut faire soit la fait avant dans le moment  
on il faudrait arrêter le cours du sang, au  
moyen du cruet de dent au se des nerfs.  
Opération de la taille, dans le cas opposé,  
ce qui permet de faire une ligature d'attente,  
avec laquelle on peut embrasser tout le  
plan Brachial, qui arrête le cours du sang  
pendant que l'on presse l'apophyse avec  
les doigts en doit faire les ligatures, au  
moyen d'aiguilles en commençant d'abord  
par faire la ligature supérieure, puis,  
l'inférieure, en même temps que l'on a saigné



24 <sup>sup</sup> rasso trois ligatures - Dattentes <sup>sup</sup> une  
infirmité, dans le cas où l'on seroit  
un apécio. Besoin. Ceci fait un état de  
l'infirmité les Gards de la plaine pour qu'ils  
entraissent adhésions et l'un se conduisant  
pour le reste comme il convient.

Pour les - Quand aux divisions des autres astères  
elles n'ajoutent rien de particulier, si ce n'est  
que dans d'assez que pour la division de  
la tige. Radiale simple du bras, au fond  
plus l'expansion que la ligature, en effet  
étant que division que dans l'opération  
de la tige, comme on voit que de la  
du chirurgien, on ne peut pas l'entendre  
aller proposer à faire la ligature de l'art  
qui soit qu'une maladie de l'un pour  
le vulgaire ne s'apparaisse, mais pour il  
faudrait toujours faire, si l'on n'aurait  
surpassé tout esprit de prévention la d'op

Il y a encore la croix palmaire, profonde,  
pour laquelle il faudroit inciser tout  
les muscles de la région ténar pour  
la mettre à découvert, comme la fait  
Maturant qui étoit chirurgien de l'hôtel  
Dieu, ténar est, qui y fut conduit par  
sa division qui l'aurait peut-être  
la tige radiale par la ténar est  
assez considérable pour recevoir l'art  
le sang qui conduit à l'art ténar. Il parait  
qu'il ne le fit que parce que cette ténar  
à une grande communication avec la  
croix palmaire, qui aurait pu faire

## Plais du Vignot.

Quand à la division des parties molles qui composent le pignot, il faut remarquer qu'il y a des accidents, en ce qu'elles peuvent sans parler de la division des tendons plus les qu'on les nous ne résistent pas, puisque nous avons vu qu'il y a des parties molles qui sont divisées. Dans ce cas, il y a la partie de la synoviale, qu'elle contient, et les parties de l'inférieur en fait de la partie, qui sont les parties molles qui sont divisées, à la suite de la partie qui se sont formées, qui mettent les tendons ne résistent pas, et on peut dire qu'il y a une partie de la partie, ou bien de la partie. Des parties molles avec les tendons, qui sont les parties molles de la partie de la partie, et on peut dire qu'il y a une partie de la partie, ou bien de la partie.

## Plais de la femme de la main.

Mettant qu'il y a des parties molles, par les parties de l'inférieur qui sont les parties molles, la partie de la partie de la partie, et on peut dire qu'il y a une partie de la partie, ou bien de la partie. Des parties molles avec les tendons, qui sont les parties molles de la partie de la partie, et on peut dire qu'il y a une partie de la partie, ou bien de la partie.

## Des fractures de la clavicule.

On a observé avec qu'on se parle que nous avons vu qu'il y a des parties molles, et on peut dire qu'il y a une partie de la partie, ou bien de la partie.



26 De même que celles des membres inférieurs  
que nous avons parlées de la légitimité  
de leur fracture dans leur ordre de classe  
c'est ce qui fait que la distinction des plates  
côtes de l'est très intéressante. Nous ne  
passons cependant point ce qui est essentiel  
à savoir.

La Clavicule qui se trouve à la partie  
anérieure et supérieure de la poitrine, qui  
représente un arc soutenant entre le moyen  
de l'épaule et le sternum, est très fragile  
exposée à être fracturée, ce qui a lieu par  
des causes différentes, la plus commune fait  
sur l'épaule, puis par la traction des corps  
vulnérants portés sur elle.

Lorsque les fractures arrivent, elles ont lieu  
dans trois lieux différents suivant l'époque  
de cause. Lorsque c'est par une chute sur  
l'épaule, elles arrivent le plus ord. à la  
partie moyenne, ce qui tient à la convexité  
qu'elle présente dans cette endroit, parce  
c'est là que se fait l'effet de la chute.  
Lorsque c'est par des chutes directes, elles  
peuvent arriver non seulement à la partie  
moyenne, mais encore à ses extrémités.  
Quand à son extrémité humérale, elles  
peuvent avoir lieu entre les bords  
proprement dits et le lieu où se trouve le  
ligament coraco-claviculaire, puis au delà  
et ultérieurement.

Quand à celle du scapulum, qu'il y ait  
esquille ou qu'il n'y en ait point, il y a

constamment déplacement, suivant l'épaisseur; ?  
et souvent suivant la longueur.

On croit anciennement que le chevènement s'insère de  
avant l'hum par l'action du muscle grand pectoral de  
~~partant~~ sternocostoidien, mais cela n'est déplacé  
puint, l'os requiert d'être planté trop près des fragments  
de l'humérus, et que d'ailleurs son action se  
ferait indirectement par l'action des pectoraux  
du sous-lèvre et du grand dorsal. M. L. Petit  
disait que cela était déterminé par l'action  
du muscle deltéroïde, qui a bien dépendu  
son action sur la clavicule et sur l'épaule  
à l'occasion, le grand sous-humérus et l'humérus  
par là l'os s'élève de la clavicule. Cette  
opinion que n'est pas d'ailleurs fondée,  
on peut cependant dire quelle est fondée  
au moyen de l'action du muscle trapèze,  
qui s'y approxime. Celle qui l'est admet  
indubitablement, est celle présentée par la  
présence du muscle, ce qui donne le  
premier, c'est que les malades peuvent diminuer  
le mouvement possible qu'ils exercent, porter  
la main du bras du côté opposé, pour  
pourrait travailler le coude, ou bien le  
lever de l'autre bras.

Le déplacement suivant l'épaisseur à  
lieu par l'action des muscles sus-épineux  
est adieu par les pectoraux, le grand  
dorsal et le sous-lèvre, aussi si l'on examine  
le fragment voit-on qu'il est toujours latéral



28 qui se trouve juste dessous l'ultra-  
Lecay. Lorsque la fracture existante ne peut  
144 / ~~fracturer~~ suivie de déplacement, c'est ici qu'il faut que l'on  
soit sage on ne peut point les reconnaître, ce qu'il faut  
estimer au ligament coracoclaviculaire qui soutient le  
seul la pesanteur de tout le membre, tant  
que le bras est à l'horizontale lorsque la fracture  
existe au dedans de lui, à raison du pincement  
que présente la clavicule, qui dans ces cas  
devient rentre dans la classe des os surnom-  
més claviculaires.

Les signes. Aussi l'on ne signale par aucun  
reconnoît la fracture de la clavicule, et  
l'impossibilité que le malade se déplace le  
membre du bras correspondant au bras, qui  
ne peut avoir lieu sans qu'il y ait une lésion  
de la clavicule usagée en un mouvement de  
circumduction, dans son articulation avec le  
sternum dans l'état naturel, qui n'existant point  
les malades ne peuvent pas faire le mouvement  
d'inclinaison, sans qu'ils souffrent l'écart des  
os et qu'ils ne puissent <sup>lever</sup> la tête de devant, l'épaule  
et ainsi elle tout le membre est porté en  
bas, en dedans et avant sous la poitrine, ce  
qui fait que l'épaule du malade se rapproche  
du sternum, que celle du côté sain  
le malade s'incline du côté de la fracture,  
lorsque le gonflement est très survenu  
on voit le fragment inférieur faire l'effet  
en dehors, tandis que rarement l'autre

produit le même effet, en tenant une éponge? 9  
amener bien, lorsqu'on remue le pied, lequel  
ne fait jamais sans cause trop de douleur.  
Ces signes suffisent pour caractériser la  
fracture jointe au crâne. Cette fracture  
est peu grave, et les parties molles sont ébranlées  
par de légères lésions, ce qui est exprimé par insensibilité.  
Mais elle l'est davantage lorsqu'il y a des esquilles,  
et que le plexus brachial est plus ou moins  
enervé.

Enlèvement

Les signes reconnus d'une fracture de la  
clavicule ayant lieu, il faut ~~la réduire~~  
fragments, et les maintenir dans la position  
qui empêche l'épanchement de la cicatrice sans faire,  
si bien que cette sorte de fracture et a  
été insensiblement guérie de bandages et d'appareils.  
Sans trop nuire y arriver sans en altérer  
un mot. D'après les anciens et le plus part  
des modernes, on croit que pour réduire  
favorablement il faut porter l'épaule en  
arrière, et ramener les bras en avant le bras d  
chêne, qui embrasse comme l'un fait les deux  
épaules et les tirent en arrière, ce qui est  
facile de faire que par ce moyen le fragment  
antérieur est porté en avant et peut faire  
saisir contre les ligaments qu'il peut traverser  
en passant par l'intérieur, par conséquent est  
d'une très mauvaise, et le bras de support.



30 par l'écrit le corset décrit par Brissot  
les Mémoires de l'Académie, la courroie de  
Cuir posée par Brunninghausen, dans son  
traité sur les fractures de la clavicule, sur  
quelques modifications qu'on fait d'après  
et sur les entorses du coude d'après.  
D'autres d'après tous les moyens connus,  
voyant qu'on ne parvenoit point à obtenir une  
cicatrice parfaite et absolue de toutes les fractures  
ont dit qu'il falloit abandonner la fracture  
à elle même, et c'est dans cette intention  
qu'il y en a eu et qui n'ont été ni plus ni moins  
faits, dans le organe au il faut, au lieu  
qu'on ne peut point bien réunir, avec sans  
trop blâmer cette conduite, cela ne tient  
que parce qu'on employoit des moyens  
qui ne causent point de mal; c'est à l'égard de la  
première à qui l'on doit le genre d'écrit  
le premier montre les moyens dont il  
s'est servi, par les quels on voit les  
fragments dans l'écrit, comme dans  
les autres fractures, en agissant sur les  
de solid qui est fracturé, qui est l'écrit  
dont on se sert pour agir sur la clavicule  
comme un levier. Du premier genre, qui  
porte un nom, au moyen d'un couteau  
de crin ou de l'ampiqui, fait en forme de  
cane, un peu moins long que l'autre

large de 15 ans ponce, épais de trois ponce. Il  
Vers la base, est placé dans le creux de  
l'aisselle, à sa base tennue enroulant l'un des  
membres du fil, qui passe devant et derrière  
la poutre, sans ramener et avoir une  
légende, apposée. Cette espèce de l'antennaire  
est préférable à la première bande, à  
cause de laquelle on arrête le cousin dans  
l'aisselle et sous-couche de la poutre,

Le cousin étant placé sous l'aisselle, le  
Chirurgien saisit la corde du côté malade. Dans  
l'autre bras est d'une poutre, il le ramène en  
dehors, en haut, et en dedans, le pousse et l'applique  
avec force contre la poutre, par cette manœuvre  
l'humérus entraine en dedans l'épaulé qui  
serait toujours les mouvements, et on exécute  
une sorte de bascule sur le cousin placé  
à son côté intérieur.

La corde étant ainsi relevée et rapprochée  
du corps, la réduction est faite; on tient à  
l'istant les fragments de mettre en rapport  
avec les surfaces carrées et les difformités  
disparaissent. Il ne s'agit plus que de fixer  
le membre dans cette position et de tenir  
immobile, pendant tout le temps que la  
nature emploiera à la consolidation du  
cousin. On tient la corde à tenir à main  
qui presse beaucoup contre la poutre et l'agit.



38 De même que l'avant bras qui se fléchit  
horizontallement, pendant que l'on applique  
les deux bandes qui servent à faire le bandage  
dans l'ordre qu'il convient.

Comme l'application de bandage présente  
quelques difficultés à appliquer et de l'habileté  
des Boyes et Chapelles assistent à chaque  
un qui prévoit le même test, d'autre celui  
de M. Boyer. Je trouve dans le traité de  
maladie des os. Voilà les moyens qui  
conviennent pour procurer la consolidation  
de la fracture; Mais dans le cas où il y  
auroit quelque chose de plus pour enlever  
l'emploi des résorbables, on s'en servirait  
de même que des irritables, impureté les  
espèces, car l'irritation, moelle, l'irritation de  
Cantabrica de, pour faire disparaître  
la paralysie qui survient après l'opération  
la consolidation des os est de plusieurs espèces  
on appliquerait également une petite attelle  
au devant des fragments, dans le cas où  
ils se rapprocheraient de devant.

Sec fractures de l'omoplate  
15<sup>e</sup> fracture. Elle est rarement fracturée à raison de sa  
maladité, qui se rapporte à l'articulation de  
dans quelle corps osseux. Lorsqu'elle l'est, les fragments  
partie de l'os se rapprochent ou s'éloignent à une partie moyenne et à une  
partie extrême.  
une de partie moyenne et à une partie

existence de trois manières différentes, suivant 3.3  
la longueur de l'os, l'enduit qui l'en-  
voûte de l'os. Divisée en deux parties au moyen  
d'une fente transversale; en travers, en l'os  
avec le rassemblement. Quand on les voit réunies, elles  
peuvent servir bien à son agilité et coracide,  
mais cela est très-rare; réunies à son  
apophyse. De l'os même; puis à son angle  
inférieur.

Lorsque les fractures existent à l'apophyse <sup>à l'apophyse</sup>  
moyenne, soit longitudinale ou transversale <sup>ou moyenne</sup>  
rarement elles sont accompagnées de déplacement,  
mais si elles le sont, il faut se faire att. qu'il  
y en a une dans les fractures avec  
déplacement, qui par les esquilles qui existent  
dans ce rassemblement, peut donner lieu à une  
irritation d'ulcère cutané et cause une  
inflammation qui peut être suivie de dépôt  
et que le rapporte Maréchal, qui fait  
obliger de briser l'apophyse pour y donner  
issue. Par cela même qu'il n'existe point  
de déplacement, il est très-difficile de  
reconnaître les fractures, qui exigent que  
l'on imprime à l'os divers mouvements  
pour parvenir à lui de l'extérieur  
excepté dans celle de l'os ou de l'apophyse  
qui n'est pas l'apophyse qui présente la  
manière de  
la consolidation de la rimedieu



Quand à la fracture de l'apophyse coracoïdienne, est qq. Difficile de la reconnaître, surtout quand on n'y fait pas de déplacements, à cause de l'attache du muscle trapèze qui s'y insère et de la tête de l'humérus qui empêche qu'on ne descende, la forme et la position ne sont point précises, qui ont bien toujours pas l'activité de corps extérieurs. Mais cependant d'autant plus, que les lésions il y a une contusion qq. assez considérable.

Pour reconnaître la consolidation ancienne, on attendrait l'humérus, d'un autre à recevoir, représente une angle droit avec le bras, en disant que la consolidation s'en fonderait.

Mais depuis qq. temps, on a abandonné cette méthode, avec constance de faire le bras contre le tronc, et de l'élever, afin que l'acromion se trouve par là maintenu, se fait au moyen d'un bandage, circulaire autour du bras et du tronc, puis des bandes ascendantes et descendantes qui passent sous l'épaule et sous le bras, après avoir fait des résolutions sur le lieu de la fracture, le bras l'élevé - qui par là agit de haut en bas et de bas en haut sur l'acromion.

Il est inutile de parler de la fracture de l'apophyse coracoïde, qui grandit. Cette fracture existe jamais sans dent, mais qui est toujours accompagnée de celle de l'acromion, qui saige alors qu'on y remédie au même temps.

Quand la fracture existe à un angle inférieur, il faut comme pour la fracture de l'angle supérieure de l'angle inférieure de l'angle de la mâchoire, à raison qu'on a vu qu'on a vu le bras, agit sur le corps de l'os, que le fragment est entraîné en avant et horizontalement, par l'action du muscle grand rond, grand dentelé et par une petite portion du grand dorsal, ce qui se fait en portant le bras en avant et en haut, au même temps que l'avant bras est fléchi, que l'on maintient de l'extérieur par l'un des sert dans la fracture de l'humérus, qui est dérangé d'une manière à ce qu'il ait sa base au bras et son sommet en haut, que l'on fixe, puis une bande pour y tenir le bras, qui à une longueur suffisante. On se sert d'une écharpe pour tenir l'avant bras et le bras.

Il faut en général comme son espèce de fractures sont différentes, les uns sont imprimés de différents manières, et les autres sont des cas ou l'on doit se servir des résolutifs.



## Fractures de l'humérus.

elles peuvent exister dans toutes les étendues directes, tant à son milieu qu'à son  
 air elles. extrémité inférieure et à la supérieure, qu'on  
 peut aussi appeler  
 l'humérus.

On l'a même vu se rompre dans le langage  
 chirurgicale par cet, celui qui les avants  
 désignent les encoûrures et par cet, que  
 le rétrécissement qui se trouve entre l'articulation  
 de l'humérus et les tubérosités qui existent  
 dans cet endroit, tandis que les tubérosités  
 occupent par cet espace de deux doigts  
 au dessous des tubérosités.

Ces fractures sont de la partie moyenne  
 de l'humérus, c'est-à-dire l'humérus lui-même  
 comme on le voit dans les extrémités, c'est-à-dire l'humérus  
 par son milieu. Les fractures de l'humérus, qui peuvent  
 exister en travers au lieu de l'humérus  
 lesquelles sont très peu suivies de l'humérus  
 qui qu'on les voit, il est facile de  
 remédier au moyen de la traction et de la  
 réduction, qui se remplissent très facilement.  
 Il est en général très facile de reconnaître  
 ces fractures de l'humérus jointes par la  
 la partie moyenne, parce qu'il n'y a  
 jamais de contusions assez fortes pour  
 empêcher et qu'il n'y a pas de l'humérus  
 les parties molles au bras.

Cependant si l'on voit qu'il y ait une fracture  
 compliquée, il faut appliquer le bandage.

de l'ouïe, comme nous l'avons dit dans les 87  
généralités, de la qu'on a une entorse d'os  
en employant joint à cela, des moyens qui de la fracture  
empêchent l'union et la consolidation de la fracture  
l'inflammation si elle existe en faisant  
garder le lit au malade, après qu'on l'a  
fracturée et dissipée, si c'est qui  
existe, on peut appliquer le bandage  
circulaire, au cas que la formation des  
fragments de la fracture compliquée  
à acquiescer un degré de solidité anormale.

Mais toutes les fois qu'il y a une fracture  
simple, il est inutile de faire le bandage  
de l'ouïe, il ne faut employer que le  
bande, qui est celui qui convient pour parer  
la fracture. Comme que des os de la main  
de bras seulement, dont une doit être  
un peu unies l'autre que les deux autres,  
qui doit être placé à la partie interne  
depuis le bras jusqu'au poignet de  
la main, grande de la blessure, tandis  
que les deux autres doivent être de la  
longueur du bras bien placés à la  
partie antérieure et l'autre à l'opposée  
des premières.

Voici comment doit être fait le  
bandage, les deux fragments réduits,  
de la manière indiquée, au plutôt avant  
de commencer par appliquer le



38 bandage circulaire en commençant par le  
cristin, en enveloppant tous les doigts, après  
qu'on l'avait bras, afin de prévenir l'égar-  
gner l'appon droit à l'autre, et par là, de  
l'aspect pas voir de la compression telle  
aucune l'application de son bandage  
jusqu'à la partie supérieure du bras, cela  
fait et donne à tenir la bande ronde  
à une globe, et l'on applique les attelles  
enroulant de l'acier, que l'on fait tout  
au long l'on soutient pendant que l'on fait  
des tours de bandes molles, en descendant  
le bras et l'on continue l'application de  
bandage du haut et du bas.

Ceci fait, on flet l'avant bras, et l'on  
l'appuie sur le bras, avant le bras  
que l'on enroule au moyen d'un band  
analogue pour la fracture de la clavicule  
On doit peut-être mettre l'avant bras  
en charge, en fixant un peu le bras  
recommande au Mula du D<sup>re</sup> point sur  
la main possible le membre.

Lors qu'on que l'application de la  
attelles ont été bien faite et enroulé  
toute les fois qu'il y a fracture, que la fracture  
est compliquée, il faut continuer l'app  
de la bande pendant que l'on fait, par  
cette l'engorgement qui survient et qu  
dure longtemps pendant que l'on  
il faut toujours tenir en l'air  
pour ce point que la consolidation se fasse

Leus en particulier point de la fracture 89  
de l'extrémité inférieure de l'humérus, par exemple  
un lieu le plus ord. que dans les fractures le cas du  
cubitus inférieur et que même en certains points 16' fracture  
dans les gémissements. et nous allons maintenant  
traiter de celle du col de cet os.

Le col de la portion de l'humérus que fracture du  
les pathologistes appelle col, qui peut être col de l'humérus  
fracturé, il paraît que cette des pathologistes  
pour être, l'humérus. Desant en rapport  
un exemple dans les autres chirurgie  
peut peut-être bien se faire que la fracture  
n'y ait pas existé réellement, mais qu'elle  
soit été prise pour l'os tubérosité de cet os, qu'elle  
ait été méprise pour la pratique.

Les causes qui donnent lieu à cette  
espèce de fracture, sont des chutes sur la  
paume de la main, sur l'épaule, ou bien  
sur l'épaule, et peut se faire que dans  
ce dernier cas, il se forme un épanchement  
sanguin entre l'os et la tumeur qui est  
généralement violent, et qui rapporte  
encore un exemple le célèbre Desant  
qui aigreur alors qu'il y a une tumeur.

Lequel y a fracture au col de il y a tumeur.  
humérus, et y a tumeur déplacement déplacement  
des fragments, qui tient à la contraction  
des muscles grands pectoraux et dorsaux  
qui s'implantent à la partie antérieure  
et postérieure des fragments inférieurs.



40 pour indiquer les deux parties de l'os  
ainsi que du bras le plus bas, pour le dire  
qui en traitant les os le fragment infé-  
rieur, les autres du bras; qui dans  
ce cas le déplacement à l'origine d'un bras  
l'épave de l'os.

Signe

On reconnaît la fracture du col d'os  
à l'impossibilité que le malade puisse  
des mouvements du bras, à la présence  
qui forme le fragment inférieur en place  
l'épave, aux rapports du malade, grand  
à la manière dont il est touché, à la  
dépense qui n'est pas dans l'os, à la  
dépense qui est visible, à la lésion  
dans la lésion de cet os avec l'os  
par la lésion de la tête de l'humérus  
de l'os, et dans le bras, on trouve d'autres  
l'os, que la fracture il n'y en a rien  
on voit seulement que le bras est  
éloigné du bras. On reconnaît  
la fracture, par la présence d'un os  
qui forme l'extrémité du fragment infé-  
rieur, on peut même faire des mouvements  
de rotation au bras, pour déterminer  
l'orientation des fragments, qui se fait  
saisissant l'extrémité de l'humérus, on  
de l'os de l'os. Si malgré tous ces signes  
on ne peut reconnaître la fracture  
par le gonflement qui existe, le  
bras est très considérable, il faut  
attendre pour porter son jugement.

pendant que l'on fait ce qui convient au  
malade, ce qui n'auroit point d'inconvénient  
en attendant même qu'on guérisse.

En supprimant la fracture de l'humérus existant  
recamée, il faudroit en faire la réduction  
et en poursuivre la consolidation une fois  
réduite. Les mêmes raisons nous pourrions  
toujours employer pour cela. Anciennement  
d'abord le bœuf de Spigola, de même que ces anciens  
les frictions de la clavicule, qui ont une  
très-bonne efficacité, quoiqu'on n'ait pu  
faire auparavant que l'on en obtienne la  
consolidation, mais alors ce ne seroit pas  
par l'effet du bandage, mais l'impulsion  
le temps que l'on s'est gardé au malade,  
Ensuite est venu le moyen consistant par  
malguets, qui consistoit dans l'impulsion d'un  
d'un os des clavicules, dans laquelle  
trouvoit des compresses, avec lesquelles on  
recouvrait toute l'épaule, avec puis de  
étages également que l'on y trouvoit et  
d'abord du recouvrait avec, après quoi  
on appliquoit des compresses sèches. Le  
moyen qui forme une espèce de carton  
qui se décollant, on en bâte l'attache  
en recouvrant toute l'épaule et très  
marché, par lequel ne peut point dans  
le cas où il se développe une inflammation  
et rétrograde à moins que l'on n'ait  
certaine est qu'on ne peut point s'en passer.



42 consolidation se fait, & le bras se remue au  
insensiblement, c'est qu'il faut qu'il se laisse  
le bras d'une halade libre. Cependant  
malgré tout cela, on enjoint à cet adage  
par lequel on prétend que le bras se  
détend, après maintenant il se détend  
aussi que celui qui le précède.

Madame. On ne se sert plus actuellement, que  
d'un appareil approprié au malade à cet  
de la clavicule. Voici en quel il consiste  
une fois les fragments réduits dans  
position convenable, on place les caissons  
comme pour la fracture de la clavicule  
on l'applique sur le bras au bout du  
doigt comme pour la fracture de l'os  
de l'os, qui se tient par une attelle  
supérieure du bras, on l'attache à l'autre  
bras on applique dans attelles comme de  
l'autre en arrière enjoin leur base  
et l'on continue le bandage par l'autre  
comme pour le cas précédent.

Pour faire, on place le bras comme de  
l'autre, on l'attache au bras  
d'une bande qui s'entoure et s'attache  
dans une ceinture si l'on veut, on l'en  
l'autre par le bandage.

On place dans l'attelle pour la  
fracture, après qu'il en a fait point de  
déplacement en devant ou en arrière  
et de l'os, on enjoint de l'autre  
muscle l'autre, tandis qu'il se

puient être guéries en six semaines. 49  
En conséquence, l'os plus défectueux  
cinq à quatre-vingt jours, parce que la  
cicatrisation de la fracture n'est d'habitude  
et toute l'attention de la guérison dans les  
mouvements du bras, absorbés en entier  
en dernier, ainsi que cela est fait.

### Fractures des os de l'avant-bras

Cela nous amène par le même temps  
des fractures de ces deux os, par conséquent  
se ressemblent assez bien dans les mêmes cas, mais  
indiquent les différences qu'elles présentent  
dans les deux os. il en résulte.

Les os qui composent l'avant-bras sont  
le Radius et le Cubitus, qui peuvent être  
fracturés en même temps, ou bien l'un.  
Les anciens les désignaient dans les mêmes  
des fractures incomplètes et complètes.  
C'est à dire que cette dernière avait lieu  
lorsque les deux os étaient fracturés tandis  
qu'ils étaient séparés par l'autre elle n'y  
avait qu'un seul os; Mais les modernes  
n'y font point attention, ils entendent  
également par fracture incomplète le cas  
où un seul os est fracturé, et par  
celle qui est complète. Ils disent seulement qu'il  
y a une fracture des Cubitus seule ou bien  
de Radius en même temps.

On observe le plus ord. la fracture  
de l'os qui est  
le plus exposé  
à l'extension.



Atteint l'os, qui est le Radius, en est  
celui qui supporte tout le poids du  
trou. Le cubitus tombe sur la main  
cette main également qui est la plus haute  
à recevoir l'attention des corps extérieurs,  
tel que quand on se repose. Le cubitus est plus apte  
à recevoir le poids des corps extérieurs, que  
celui à être distendu par les corps  
extérieurs, parce qu'il est celui qui est le  
plus fort, surtout par la figure;  
il est de même lorsque nous sommes assis,  
celui qui supporte le tronc dans ce cas.  
Ils peuvent cependant être fracturés.  
Mais à la fois, alors dans ce cas, il a fait  
que la cause agissante fait trois fractures,  
que quand une main passe dans l'axillaire.  
Il arrive qu'il y a les deux os fracturés  
fracturés en même temps, que les fractures  
en sont pas liées au bras d'avant, mais  
dans un autre endroit. C'est ordinairement dans  
la partie la plus faible de l'os que se trouvent  
les fractures, par conséquent il est possible  
d'avoir une fracture du Radius, tandis que l'autre  
est dans le cubitus.

Si on dit  
fractures

Il y en a qui ont encore double os  
la fracture du Radius par l'action et le  
cubitus nous l'avons dit dans les précédentes  
des fractures, mais nous avons réfuté  
l'opinion.

Lignes

Dans les fractures des os de l'avant  
bras, il y a presque toujours une

soit en épaisseur, ou bien en largeur, 45  
ce dernier la largeur lorsqu'ils sont  
os se réunissent fracturés en même temps  
en faisant observer que dans les fractures  
soit d'un seul os ou de deux os, il y a  
presque toujours un rétrécissement de  
l'espace intercostale, qui dans un seul os  
naît bien que dans l'endroit de la fracture,  
tandis qu'il n'y a pas de rétrécissement dans  
presque toutes les fractures de deux os. C'est  
dépêché en haut de l'action du muscle  
pronateur, tandis qu'en bas cela se dé-  
gagne du quarré pronateur, le déplacement  
suivant la longueur à lui, par l'action du  
muscle pectoral.

Il est des circonstances où il n'y a pas  
de déplacement, alors dans ces cas où  
par la fracture du Radius, on fait  
éprouver des mouvements de pronation  
et de supination au bras, en lui  
saisissant la main, et qui si la fracture  
à lieu au lieu où se trouve le point de  
appui, on ne peut pas le reconnaître au point de  
appui, par la tête de la main (Radius) antérieure  
sans point, comme dans l'état naturel,  
fait des mouvements de rotation, lesquels  
se perdent dans le lieu de la fracture qui  
ne manifeste aucun signe de déplacement.  
Il n'est pas cependant sans intérêt  
de noter que chez certaines  
personnes, même chez les blanchissantes



46 Sans que l'on sache à quoi cela tient,  
si ce n'est que l'aplique par le défaut de  
synonim dans la grande ténacité, qui  
ne peut être.

Quand on s'aperçoit que l'on a un  
deux os brisés, il faut à peu de chose  
près, que l'on tâche de le confirmer par  
la même.

Ensuite la fracture de l'os, un peu des deux  
il faut commencer par appeler les fragments  
en mettant l'os dans l'attitude de la co-  
stitution, qui se fait en faisant tenir l'os  
de l'os un peu inférieurement, l'os se  
tient mieux. La main du Malade q  
l'on tire en l'os en l'os que la fracture  
existe, si l'os a un os, l'os se  
tient dans une direction horizontale,  
y en a deux.

Une fois la fracture réduite, il  
faut maintenant les fragments dans le point  
que l'on a fait prendre, qui doit être  
le plus naturel. On se sert pour cela  
d'un compresse gradué, que l'on applique  
l'un en devant, l'autre en arrière de l'os  
intermédiaire, dont le plus long des os  
est dirigé en dedans, que l'on tienne  
avec un bandage circulaire, en l'os  
on l'os de l'os jusqu'à la cande,  
appliquée d'attelle si l'os se tient, l'os  
les fois qu'il y a bien faites, on  
si l'os se tient on applique quatre, deux

l'articulation et dans autres, l'une en avant #7  
et l'autre en arrière de l'avant bras  
qui le soutient avec le bandage, le  
quel étant fait on fixe l'avant bras  
dans une escarpe.

Il ne faut guère plus de vingt à  
au trente jours pour parvenir à la  
consolidation de ces sortes d'os  
qui ne font pas consolider, au fait  
accident plus au moins de six semaines  
à l'avant bras l'os de la main pour un peu  
au bras long au bras court qui en  
est ord. la tête.

Au bout de six semaines d'application incessante  
bandage circulaire pour parvenir à la  
formation du cal, car il en résulte  
une difformité parce qu'il y a lieu de  
s'apercevoir aux déplacements de fragments  
au dedans, on ne fait que l'augmenter  
cette remarque est due à l'expérience.

Fracture de l'apophyse Olécrane.

Sans parler des lésions des fonctions  
de l'olécrane à celle de la tête, qui  
est l'un et l'autre pour l'un, de l'extension  
de l'humérus contracté, qui  
donne lieu à l'extension du bras et de  
la jambe. On peut dire autant de  
l'humérus contracté de la jambe pour la  
tête; et l'on se rappelle que  
la tête et l'olécrane ont un rôle



48 Différent, puis que celle-ci forme la  
Mouvement du bras, tandis que la tra-  
versée forme pas.

Cancer. L'éclaire est susceptible de se faire  
soit par l'action musculaire, soit par  
la contraction. Des corps extérieurs, tels que  
l'air, une corde. Un organe qui  
rotule et l'éclaire qui se joint. L'usage  
de la fracture, comme elle, mais  
à cette différence entre elle et la tra-  
versée de fracture, autant par  
l'usage, qui par la contraction musculaire,  
l'un que pour l'éclaire, est le contraire  
ce qui arrive par les études scolaires  
lorsqu'arrive par l'action musculaire, et  
au lieu que pour une forte contraction  
du muscle triceps brachial, qui agit  
fortement sur le bras de même  
sur le bras, ce qui ne peut arriver  
que dans ce cas, au lieu que pour  
la rotation elle peut non seulement  
avoir lieu par la contraction de la jambe  
sur la cuisse, mais même lorsqu'elle  
est étendue, telle qu'il arrive par  
les convulsions, au lieu de la contraction  
musculaire. Or, il est très évident que  
l'un peut l'appeler l'autre, et  
agissent sur la même manière  
pour le ressortir q. d. à l'origine de la tra-  
versée.

J. T. Can...

en relevant le bras, dans le moment où  
l'on a franchi l'axe fémoral et que l'on se  
pourrait tomber en arrière, alors dans ce cas on  
peut de ramener autant qu'il est possible le  
bras en devant par l'act. des muscles allongés.  
Enlevant encore pour le dessous.

Le lieu de la fracture pour l'olécranon est  
au milieu du poulce sur l'extrémité, au-dessus  
à son union avec le cubitus. Suivant  
observation que dans ce cas, la portion fémorale  
qui s'élève peut être déformée en plusieurs  
lignes entières, ce qui fait que l'on ne la  
maintient plus au corps de l'os. Alors on  
peut se représenter les deux tubérosités de  
l'humérus qui existent à son extrémité  
inférieure se trouvant plus en rapport avec  
l'olécranon comme dans l'état naturel, on  
remarque un intervalle entre elles qu'on  
ne remarque point, ce qui dépend de l'action  
du muscle brachial qui est en  
contraction et qui entraîne en haut le  
fragment le plus petit, tandis que le plus  
considérable qui est le corps de l'os s'élève  
par la contraction des muscles fléchisseurs  
qui fléchissent le bras. C'est ainsi  
seul à expliquer le rapport qu'il y a entre  
ces trois os, qui dans l'état naturel  
se trouvent à égal distance  
de la diaphyse.

Il y aura donc la fracture à l'intervalle  
qui existera entre les fragments, à l'impossibilité





que moins cette tubercule intermédiaire  
étoit considérable, moins les mouvements  
se faisoient, surtout ceux de flexion de  
le H. stule, ce qui est moins étendu il y a  
l'ellierane, parce que les mouvements se font  
toujours bien.

Comme il y en a peu pour la  
consolidation des fractures, qui ont dit  
que l'on pourroit abandonner la fracture  
à elle même, tel que L'ampère le pensoit,  
qui d'autres mettoient le bras panché  
dans la plus forte extension, et que cette  
manière faisoit des inconvénients, avec  
que l'on de l'avant bras peut dépendre  
du bras, et que cela pourroit causer la  
distension des ligaments antérieurs qui  
unissent l'humérus au cubitus. Les  
plusieurs des pathologistes tiennent continuellement  
un millier entre les deux, c'est à dire qu'ils  
placent l'avant bras dans la demi-flexion  
et voici comment ils se conduisent.

Ils commencent par appliquer un  
bandage circulaire autour de toute la  
main et de l'avant bras comme dans  
la fracture de l'humérus, qui est communément  
jusqu'à la partie supérieure, et étant  
parvenu, ils donnent à tout le bras la bande  
et commencent par rapprocher les os  
supérieurs, après quoi ils appliquent  
deux ou trois bandes en long, exprimant



52 qu'on se hâte d'empêcher les téguments du  
bras, qu'ils s'ouvrent par les bords du  
bandage continu jusqu'à la partie inférieure  
de l'humérus, au même temps qu'il entoure  
l'avant bras dans l'admission d'extension, afin  
de quoi ils ramènent la bande sur elle  
et appliquent soit une attelle droite de  
la partie du bras d'un moyen grandeur,  
après avoir rempli le vide qui s'y trouve  
ou bien une de ces parties inférieures  
de l'avant bras de l'épave qui s'est accumulée  
en conséquence, que l'on s'attache à l'un  
l'autre au moyen de la bande. Par là  
ainsi tenu, pendant l'intervalle de temps  
qu'il conviendrait pour la consolidation de la  
fracture, qui a lieu ordinairement au bout de 2  
ou 30 jours, après quoi on fait usage  
des mouvements au membre, pour faire  
dissiper l'engorgement qui a lieu, et  
pourrait exister que l'infirmité qui  
peut.

Il faut se garder de parler qu'on a la  
fracture simple, dans le cas où il y a  
contusion considérable, il faudrait alors  
la fracture à elle même, à la manière  
de l'empereur, en appliquant seulement  
le moyen qui s'applique à la partie  
dissiper, après avoir qu'on s'attache à  
on pourrait s'apercevoir qu'il s'en est dissipé  
la seconde, comme nous le verrons.

en appliquant la pexarail. Dans le cas de  
fracture compliquée. fig. on applique les  
moyens indiqués dans les généralités.

## Fractures des os de la Main

### 1<sup>re</sup> De ceux du Carpe

Jamais il n'y a qu'un seul os de fracturé;  
il y en a toujours plusieurs, qui naissent  
le plus ord<sup>re</sup> que par des causes qui ont  
agité avec violence, tel qu'une pression plus  
ou moins, qui ne sont jamais fractures  
par elle-même, mais bien à raison de la  
lésion des parties molles, puis que par  
elles mêmes elles ne peuvent avoir une  
particulière, mais bien une desmure,  
qui depuis cela rentrent dans les fractures  
compliquées.

### 2<sup>o</sup> De ceux du Metacarpe.

Elles sont très rares et quand elles  
existent il est rare qu'il y en ait qu'une,  
c'est surtout les qui correspondent au premier  
qui est le plus exposé, qui est ord<sup>re</sup>  
par suite de déplacement. On reconnaît  
ces espèces de fractures aux ecchymoses  
qui lui fait faire ecchymose au tégument  
en les montrant, la région y est déplacée  
il faut ord<sup>re</sup> très peu sensible à la  
pexarail, on peut y remédier en  
les replaçant et les soutenant avec une



54. Les plusieurs petites attelles du côté par  
où il se ripandent. Il suffit d'attacher  
qu'il y a pas de déplacements, de l'index  
main allongée du moyen à l'index, pour  
sa consolidation sans faite, que l'on envoie  
avec un bandage.

### 3. Des phalanges.

Pour ce qui regarde la fracture du 1.  
il y a presque toujours coraillement, car  
les premières sont susceptibles de se  
et lorsqu'il y a déplacement, qui sont  
généralement considérables, au point que les  
des fragments sont traversés les chairs, et  
ne peuvent point de l'action musculaire,  
mais bien de l'effet du contact, car  
ils ne forment que les ossements, au point  
des tendons qui se trouvent situés dans  
des gaines synoviales, en dessous et en  
dessus.

Pour en procurer la consolidation,  
il faut tenir les doigts allongés, au  
moins seulement celui qui est blessé dans  
le cas où le malade ne voudrait pas  
les avoir tous dans cette position, car  
bien pour sa santé, après avoir  
les fragments, dans le cas où il se  
déplace, que l'on maintient avec une  
attelle et un bandage.

Dans le cas de fracture des deux  
phalanges, il vaudrait mieux en que  
lorsqu'ils sont compliqués d'une lésion

non pas que les accidents qui pourrissent  
arriver d'automatisme à la mort, mais qu'  
souvent lorsque même que l'on ait passé un  
ou plusieurs la consolidation il en résulte  
une difformité qui gêne l'usage du malade  
et qui rend vaine toute bonne circonstance  
en traitement prise que dans les autres.  
Lorsque même la dernière phalange est  
intacte, il ne faudrait pas pour cela  
qu'on se le fasse pincer dans d'autres cas,  
parce qu'il en résulterait un mauvais résultat.

## Plaies des Membres inférieurs <sup>Le second</sup> 78 fractures

Celles de parties molles suffisent pour être  
remarquables, si ce n'est qu'il y a souvent  
des lésions, mais en cas de lésion dans les os  
dans nous assurez parties et d'ailleurs nous  
y reviendrons en parlant des fractures des  
os qui leur donnent insertion.

### Fractures du fémur

Elles sont les plus fréquentes après celles  
de la jambe et suivant le siège qu'elles occupent  
affectent <sup>distinction</sup> les os de l'extrémité inférieure <sup>de la</sup> de la  
de l'extrémité supérieure et en vertu du Corps  
toutes ces fractures sont produites par  
l'action des corps extérieurs. <sup>Cette distinction</sup>

Par fractures du fémur extrémité inférieure  
ou plutôt celles de l'épiphyse, mais elles <sup>1.°</sup> sont  
très rares, et s'accompagnent souvent de lésions  
de l'extrémité inférieure.



16. De l'articulation, tantôt il y a qu'une lésion  
de l'apophyse d'autrefois la fracture existant  
des condyles, et en même temps des apophyses  
de l'autre, ou cette articulation peut être  
cassée, que soit le lieu où elle se présente  
il y a point de déplacement ou il est  
peu sensible. Lorsqu'il existe, ce sont les  
condyles qui sont entraînés en arrière par  
les muscles du biceps brachii, ce qui  
fait que dans les traitement, on y applique  
un corps plus ou moins épais, qui  
tend à repulser les fragments dans leur  
situation naturelle. Il y a place au combat  
ou les combats par les muscles qui sont  
restés sains.

20. De la  
corps

Paro les fractures du corps d'un  
fémur dit, il y a celles de la partie  
supérieure, celles qui arrivent au centre  
du condyle, puis celles au dessous du grand  
trochanter.  
Les fractures qui arrivent au dessous  
des condyles, ont de particularité qu'elles  
ont tendance au déplacement versant  
l'épaisseur des fragments inférieurs par les  
des muscles, lorsqu'il s'agit de l'articulation, il  
y a puissance d'autant plus ou moins  
l'effort des muscles, ce qui fait  
en rompissant la partie postérieure  
général d'un corps plus ou moins saillant  
à l'égard du bandage qui enveloppe, il se  
le même que pour les fractures du  
proprement dit.  
Les fractures qui arrivent au dessus



du grand trochanter sont divisés de déplacement  
du fragment supérieur, qui est entraîné  
en avant et en haut par l'action des psoas,  
et iliaque, du psoas traversant la lésion  
en haut et se redressant sur la tête inférieure.  
Puis le psoas sous la branche horizontale  
du pubis, mais le membre n'a guère  
diminué de longueur, parce que la branche  
horizontale du pubis est dans la même ligne  
que sous la cavité cotyloïde, tandis qu'en  
les fractures il y a raccourcissement parce que  
le fragment inférieur est entraîné en haut  
et dans la lésion, la tête du fémur fait  
saillie au niveau de la branche horizontale.  
Tandis qu'en fait il y a fracture la saillie  
est adossée de cette branche. Une autre  
différence, c'est qu'en fait la lésion est  
traçante et rapprochée de la symphyse,  
tandis que dans l'état naturel antérieur,  
et fracture, il est plus près de l'épine  
iléale antérieure et supérieure. Par conséquent  
que dans les fractures qui occupent  
l'extrémité inférieure, elles exigent l'applic.  
d'un corps saillant pour s'opposer au  
déplacement.  
Quant aux fractures du milieu même  
du corps, elles peuvent arriver par des  
causes, ou par l'applic. Directes  
des corps extérieurs, ou bien par une  
chute sur les pieds, soit sur les genoux  
mais ces espèces de fractures sont  
rares, la fracture du col survenant plutôt.



§ 8 opposée la manière d'agir du corps, la fracture est toutes transversale, tantôt oblique, ou enfin peut être comminutive.

Dans les fractures de causes directes, y a toujours affection des parties molles, et même § 9. Elles exigent l'amputation, qui succède à ces fractures; § 10. y a toujours constamment déplacement qui se prendant forme transversale peut l'empêcher, de déplacement qui a les plus fréquemment de celui qui se fait suivant la longueur, § 11. y a une circonstance qui dispose au déplacement suivant l'axe ou la circonférence. Ces deux déplacements peuvent être simples et existes en même temps. Le déplacement suivant la longueur est favorable pour la guérison oblique de la fracture, les causes de ce déplacement, sont les muscles des os fémur, c'est le déplacement qui rend la guérison difficile et qui exige d'autres moyens que ceux qu'on emploie ordinairement.

Figures

Illes ont pu être des signes propres, mais commun aux fractures des os longs. Les fractures du col, du fémur, du radius, sont généralement dangereuses, à toutes les âges de la vie, car chez les enfants on les voit guérir avec une résistance, il est toujours facile de vaincre les fragments et de les rapprocher, tandis que dans l'adulte, l'os résiste et est difficile à réunir. Une circonstance qui rend encore moins dangereuses,



chez l'enfant ~~est~~ quelle est ~~propre à l'usage~~  
transversale et d'ailleurs chez les enfants  
ou l'ossification n'est pas encore complète  
la courbure du fémur diminue et le  
membre s'allonge de 29 ou 30 lignes, c'est pour  
cela que chez les enfants on emploie  
peu de latrusion continue. Au contraire  
de la supplantation du bandage de tulle,  
et jamais le bandage seul, le bandage  
à bandelette consistant d'autant mieux,  
qu'il est obligé <sup>de</sup> d'empêcher l'appareil. Raison

Si on a jugé la fracture transversale  
on emploie simplement le bandage de  
tulle lequel doit occuper toute la  
longueur du membre. Dans les fractures  
du fémur, ainsi que les autres, on observe  
que celles qui sont voisines des articulations,  
doivent de préférence les articulations, puis on  
applique le membre sur un coussin de  
manière à ce qu'il appuie dans tous les  
points.

Dans les fractures obliques quand elles  
existent chez les adultes, latrusion  
continue doit être mise en usage  
en outre du bandage de tulle, et ces  
mêmes moyens sont employés pour les  
fractures du col du fémur. D'autres  
moyens que l'on se sert, celles qui  
sont éloignées de toute supplantation  
exigent dans le milieu de la tige une  
ligature ou enroulement des fragments  
l'un d'eux peut faire saillie à l'extérieur  
ce qui a de plus communément lieu



C'est à la partie antérieure, si on ne peut en  
faire la réduction on est obligé d'en faire  
la résection, et le membre est toujours  
carré, qu'il ne soit amputé qu'après  
autres complications, elles entraînent  
les fractures compliquées.

3<sup>e</sup> du col  
du fémur

Enfin le fémur peut être fracturé  
au col, et il est toujours cela de ces  
les fractures qui y arrivent, ou celles qui  
sont dans l'intérieur de l'articulation, et  
qui ont leur siège à la base de l'insertion  
de la capsule, de manière qu'une partie  
du grand trochanter se trouve séparée.

Les premières sont à dire qui surviennent  
dans l'articulation, sont encore de deux  
sortes, arrivent dans la jeunesse, ou dans  
l'adulte, dans le premier il y a déviation  
de l'os, mais cette déviation  
reculant. Dans le second cas, la  
fracture peut arriver dans deux lieux  
de son étendue.

On en compte deux la fracture  
du col, celles qui surviennent à la base,  
en comprimant une portion du grand  
trochanter, si les fragments sont encore  
maintenus par l'insertion de la capsule,  
le déplacement est peu considérable, tant  
qu'il n'y a pas de déplacement.

La seconde  
19<sup>e</sup> fracture

Les fractures du col du fémur arrivent  
dans deux circonstances différentes, une  
cause de chute faite sur la plante du  
pied, ou sur le genou, puis par cette  
cause de côté du grand trochanter.

Dans le premier cas, le col du fémur est  
brisé d'une part par l'effort du bras et au  
moyen des muscles inférieurs par l'autre,  
D'autre part il est le plus souvent par  
le grand pectoral, qui fait effort sur lui,  
les quels tendent comme l'un doit à  
mettre le col du fémur en ligne horizontale  
avec le corps. Dans le deuxième cas au  
contraire le col du fémur étant frappé  
latéralement, l'effort du bras tend à le  
qu'il devienne horizontal par le bras du corps.  
De l'air. L'air doit alors qui dans ces deux  
derniers cas, les fractures ont lieu par  
contre-coup, tant quand elles arrivent par  
chute sur la plante des pieds, que sur le  
grand trochantère qui ne pourroit point dans  
ce dernier cas avoir lieu par cause directe  
à cause de la grande quantité de parties  
molles qui environnent le col du fémur,  
ainsi que son ligament capsulaire.

Il a été cependant au n° 99. Des  
fractures arrivées au diaphyse de l'os  
alors on ne sait pas trop si elles peuvent  
arriver par cause directe, ou par cause indirecte  
les marques dont elles ont lieu, de l'air  
qu'elles ont lieu le plus ordinairement par  
chute sur le grand trochantère, ce qui  
n'est pas rare. De plus même pendant  
les plaies, lorsqu'on glisse dans les deux.  
Les parties de fractures ont lieu presque  
toujours avec déplacement, qu'il soit  
extrêmement rare d'y arriver cependant.



[illegible]

*Signum*

Tous les fractures de col inférieur  
il peut suffire qu'il y ait un déplacement  
l'absence de force que la fracture s'écarter  
dans la ligament capsulaire, par suite  
grand fragement dans ce cas, et route  
en avant par lui, a raison que les os  
sont unis. D'ailleurs du lieu. Tandis qu'il  
tandis les os se déplaçaient au lieu  
d'être, il y a toujours déplacement avec  
d'une manière différente, puisque tant  
le déplacement est à peine sensible, tant  
de gros ligaments. Tandis que d'autre  
il est très manifeste, puisque quelque

est 99. l'accusait de l'esp. puer. M. 6. 3  
99. très difficile de porter un prognostic  
relatif à la fracture, à raison de l'absence  
des parties molles qui s'écarteraient alors  
dans ce cas et font le ressort à un autre  
moment, en ce qu'il n'y a point d'inconscience  
de rétrocession, puis qu'on a vu des praticiens  
très célèbres, qui ont cru que la fracture  
n'aurait pas, elle avait cependant bien fait  
d'avoir porté un prognostic très fâcheux.

On peut rapporter les signes de cette  
fracture ~~à l'os~~, qui sont le raccourcissement du  
de membre, lue changement de direction  
le défaut de rapprochement du grand trochanter,  
l'impossibilité <sup>de</sup> la malade de fléchir la  
cuisse, puis la répercussion des fragments.

1.° Grand au raccourcissement du membre, si  
il ne fait pas beaucoup avec un qui n'est pas  
pourrait exister naturellement chez l'individu, le membre  
ce qui est bon de s'informer au lieu par  
une luxation de la tête du fémur, qui  
ne confirme la fracture que quand elle  
résistent point.

2.° Au changement de direction du  
membre, lorsqu'il est incliné en dehors,  
que l'on a appliqué par l'action du membre  
du quart des oblique, et des pectoraux,  
Mais cela peut tenir plus à l'attitude  
qu'à la lésion de l'articulation de la cuisse  
à raison de la position de la cavité articulaire,  
que par l'action des muscles.

3.° Au changement de rapprochement du grand  
trochanter.







De la typographie sur les fragments, d'ailleurs  
que de l'élancement du due essens, d'un  
point du pirovate qu'on s'approprie p'bit  
la tuerie cela. Mais tout cela est exultation  
maintenant, il suffit que de l'indignation  
sans sans d'ailleurs parle si l'indignation  
et se servir pour son temps que si accipio  
pu que la chose est trop l'impression.

Ceux qui apportent p'bit s'efforcent  
que le col du p'bit se cumule  
point, disant que l'un avait du de  
fragments ne peut être contracté  
d'ailleurs, cela est possible,  
mais il faut remarquer qu'ils ont  
appris que des fractures de tuiles  
sont image, et que l'un s'approprie  
d'ailleurs, que les forces p'bit ne sont que  
faites s'efforcer, et que d'ailleurs il faut  
un degré de de assez fort dans les fragments  
pour que la combustion puisse s'en faire.

Ces dans cette intention qui d'ailleurs  
ont abondamment des choses d'ailleurs  
et, sans que p'bit s'efforcent  
rien employer, d'ailleurs que la font  
g'ême, l'effort de l'effort, et l'effort  
à leurs opinions, une p'bit s'efforcent  
embrassé une, que l'un peut regarder  
comme un esprit de p'bit s'efforcent, c'est  
après avoir des cas à l'effort s'efforcent  
en peut p'bit s'efforcent, et que s'efforcent  
les p'bit s'efforcent ag'ême s'efforcent  
en l'effort s'efforcent qu'il s'efforcent une différence



66 cela se voit par le fait que par un  
long usage.

Or, comme les machines pour empêcher  
la coarctation, ont été trouvées par les  
premiers qui ont été mis en usage  
est l'attelle continue, qui se fait  
longtemps continue, et qui est maintenue  
par le même usage. Il est même  
à remarquer que l'on ne l'a pas employé  
depuis le moment de son invention  
dans les trois d'usage, puisqu'il paraît  
l'on en faisait une description des  
deux de Dypocrate, et qui n'est  
employée que pour l'attelle en  
l'un, qui est employé différemment  
et que la spica, le quel est une  
est affecté au bandage partiellement  
ne présente pas une espèce de  
puisque il se fait la base d'attelle  
partiellement dans l'attelle, en assurant  
le bras et le jarret qui ne sont  
ou se l'aurait tant le membre de  
à être toujours étendu, et qui a  
fait que le déplacement avait lieu  
ou le redressait, en étendant le  
et qui avait lieu dans le bras, puis que  
ne supposait à la contraction des  
membre opposé, à l'attelle etc.

Secoy de  
10<sup>e</sup> fructidor  
Avant l'usage on se fait le bras de  
manière à ce le membre et le bras se



tant en même temps, qui se faisoit en attachant  
les éponges au moyen de laques au chevet du  
lit, tandis que d'autre part tout le membre  
étendu avec une semblable laque qui étoit  
attaché au pied, qui étoit l'extrémité du  
lit, auquel se trouvoit suspendu de corps  
très-pesant qui l'entretenoit de cette manière.  
Néanmoins que le bras se remonta, elle  
méthode ne présente pas de grande efficacité  
et pourroit être employée toutes les fois que  
les os se pressent comme, et que l'on auroit pu  
d'autres moyens.

Les instruments et autres ~~en~~ anciens, ont été  
inventés d'effrayer même par la  
consolidation de cette espèce de fracture,  
mais ils présentent des inconvénients, et  
sont en même temps plus ou moins compliqués  
et que la machine inventée par Bell, qui se  
trouve dans son ouvrage.

C'est dans ce dernier temps que l'on a employé  
inventa, des moyens qui étoient ~~en~~ employés  
sont cependant infiniment meilleurs, qui  
sont au nombre de trois que l'on connoît  
dont la première est le bandage extensible  
de laque, puis deux autres machines faites  
d'après la manière d'agir de ce de rétro, qui  
sont celles de M<sup>rs</sup> Boyer, et de Green, les  
quels nous nous arrêterons.

Voici comment se compose le bandage de  
Bell, on commence d'abord par réduire  
la fracture en enlevant une escharre ou

bandage  
de Bell.



8 le bassin, d'une manière à être retenu, au lieu  
en agissant sur les épaules, puis agissant sur  
cette action, tandis que l'on fait l'extension  
sur la jambe au moyen du pied, qu'on  
tire, cela fait, on applique sur tout le  
membre, soit à dire de la cuisse, de la jambe la  
bande de boudin, qui est appliquée sur  
le dos qu'il couvrait, on applique trois  
attelles, deux sur des os, soit à dire une  
de chaque, et une entre eux, l'autre  
est sur la langue d'une manière à s'étendre  
depuis la tête jusqu'à un doigt  
du pied au delà de l'extrémité du pied, et une  
plus longue que plus petite, parce qu'il y  
a la langue, et une plus petite sera repliée sur  
dehors, au moyen de la bande qui sera  
implantée au-dessous, comme nous l'avons  
dit. Elle doit en outre avoir une épaisseur  
considérable, pour pouvoir supporter  
l'effet de l'extension et de la contre action  
que l'on fait sur elle pour procurer la  
formation du cal de la fracture, et faire  
qu'elle ait proche les extrémités. Elle doit  
en outre d'une manière de mortaise, se  
quadrer au bout, mais le plus ordinairement  
qui sont destinés à la pince, pas mal de  
laque ou bande qui sont destinés à pro-  
duire l'extension, elle doit aussi avoir une épaisseur  
et une largeur assez grande.  
Quand aux deux autres, l'intérieur ne  
peut dépasser le niveau du pied, en même  
temps qu'elle s'étend jusqu'à la partie



l'extrémité de la Cuisse: l'une l'autre. Elle doit s'étendre depuis la partie supérieure de cette dernière, jusqu'au-dessus du coude-pied. Il faut surtout avoir des parties attelles pour soutenir les attelles dans lequel on les roule, des rembourrages et des langes, puis des bandes au nombre de deux, une pour la partie supérieure et l'autre pour l'inférieure, avec les quilles ou poutres servant à la contre extension.

Le Bandage de Soulet appliqué, ainsi que les attelles de, dans l'ordre qu'il convient voici comment on exerce ces dernières. On commence par appliquer une bande à la partie inférieure de la jambe, de manière que son milieu se trouve posé sur la partie postérieure du tibia, après quoi on ramène le tibia sur le côté qui se trouve en bas, après on le ramène à sa place, on le protège au-dessus, il faut ensuite qu'il y ait une autre bande de l'extrémité que la supérieure, cela fait, on se donne tout à son aide, pendant avec une contre extension, tandis que l'extension est en place. Le Bandage extensif, l'application en fait le Bandage extensif, qui pour cela, aura tout d'abord d'un empiètement que l'on place à la partie inférieure de la cuisse, posé sur l'endroit où doit être appliquée la bande inférieure à faire la contre extension que l'on applique, dans un des chaps par un



70 la partie antérieure de la cuisse mesurant  
2 1/2 p. tandis que l'autre rose de cuivre, due  
au fait passer un des chefs dans la mort  
au bûche dans l'échancrure qui présente le  
de l'attelle externe, qui lui sert avec tout  
en même temps lui tire à part le haut  
la cuisse, pour entraîner le fragment de  
côté du fémur dans cette direction, pour  
maintenir en contact avec la portion de  
grâce fréquente fracture, pendant l'usage  
des 2 1/2 p. de la bande inférieure botte  
à part. Cela fait on revient à cette derri  
rière, que l'on maintient de la même  
manière, en passant une des chefs dans  
la mortaise et l'autre due le bout de l'attelle  
passant indépendamment de cela, que  
le malade soit couché sur le dos dans  
une lit, et que celui-ci soit fait en même

Mais on a rapproché des instruments  
Bandage, qui à l'attelle empruntée, est  
que de l'autre il est susceptible de se relâcher  
très fréquemment, en ce que les bandes pètes  
à raison de leur peu de fermeté, ce qui  
qu'on le réajuste très souvent, qu'on  
agissant sur le pied il peut causer des  
accidents, qui se font par 92 p. de même  
la partie interne de la cuisse, mais il  
protège et immobilise, après toutes les  
machines inventées. Depuis, si on la  
relâchement des bandes, et qu'on se le  
pied est exposé de côté, que l'on doit  
maintenir avec une bande dans les



La machine sur les parties latérales de l'appareil  
qui doit être appliquée immédiatement après  
la fixation des attelles, qui se trouvent  
passer par la laque, en même temps que  
les remplissages ont rempli les intervalles qui  
se trouvent entre elle et la membrane, mais  
si présente est inconvénient, il présente  
aussi deux avantages, est qu'il n'est point  
d'indispensable à faire et que lui peut se  
procureur soit même, au moment où il  
est appliqué pour un malade qui en a  
besoin, tandis que toutes les autres machines  
sont plus ou moins compliquées, tandis  
qu'elle est extrêmement simple, et qu'elle  
n'est pas d'achat car le fait la machine  
de cette Boyer et Brunet, qui est  
dernière est même que celle-ci.

On ne nous amène point à la machine  
d'après la machine de M. Boyer, mais de M. Boyer  
qu'elle se trouve dans le traité de M. Deland  
des os, nous dirons seulement qu'elle est  
de partition sur le bandage de l'os  
est qu'elle agit inférieurement sur l'os  
de la membrane, mais pour du reste elle  
les mêmes inconvénients que toutes les  
bandages ci-dessus et de la machine inventée  
est qu'elle n'agit que sur l'un des côtés du  
bassin, ce qui fait qu'il est très-inutile  
de cette machine de M. Brunet et de M. Boyer  
machine compliquée que celle de M. Boyer



72 Boyer et moi-même. Disposition requise  
 quel'un pour voir l'os qui consiste  
 dans un morceau de bois de longueur  
 différentes, dont l'un peut servir et  
 être remplacé par un autre, de façon  
 proportionnée à celle du membre, ce qui  
 est différent de <sup>celle de</sup> M. Boyer, dans lequel  
 l'os est une seule et même pièce. Il  
 présente l'un et l'autre avec avantage,  
 en ce que l'un agit sur l'autre. Dans  
 celle de M. Boyer au moyen d'un fil  
 en manière de corde, que l'on guide au  
 membre au moyen d'un corps distingué par  
 cela, tandis que l'autre cela se fait au  
 moyen d'une espèce de chef, qui se  
 fixe dans la queue est une construction  
 de la bande, après avoir été ce fil sur  
 une petite poulie, et que l'on tire  
 plus au moins. Il faut remarquer  
 toutes fois, que ces deux machines agissent  
 différemment dans une espèce de l'os  
 de l'os qui se trouve adapté à la machine.  
 Cette dernière machine, n'empêche  
 pas non plus que l'on applique le bandage  
 de tulle, que l'on soutient avec des

Leçon du  
 même jour

### Structure de la Rotule.

C'est os qui existe au devant du fémur  
 diffère de beaucoup des autres os, en ce qu'il  
 se développe dans le ligament ou plutôt  
 le tendon qui existe dans les premiers





7<sup>de</sup> des muscles extenseurs de la Cuisse qui se  
surmontent, la quelle ne s'est absorbée qu'un  
fois, qui se trouve rapportée par l'artère  
Ménar de même de son ligament Rotatoire  
Qu'est-ce qui se rapporte que dans ces muscles  
par l'artère, et l'autre par le ve. l'artère  
est par le ve. l'autre par le ve. l'artère  
qui se trouve qui s'est très bien vu dans son  
une chirurgie malgre tout ce qu'on a dit  
dans le temps. Le qu'on a dit la Rotule est  
fracturée par l'action des muscles  
que par l'action des corps extérieurement, et  
communément par l'usage de l'arme  
ou d'un de l'arme qu'on a dit de l'arme  
lorsqu'on se trouve en arriere, car lorsque  
l'on se trouve en arriere.

La direction. Lorsque la fracture de la Rotule a lieu  
des fragments de l'os il y a deux genres  
fragments, un qui correspond au tendon de  
muscles de la Cuisse, un autre au ligament  
de la Rotule. Quant à ce cas, on a dit  
qu'il n'y a point de même pour les  
qui ont lieu par l'action des corps extérieurs  
et arriere l'autre qui est par plusieurs fragments  
qui peuvent avoir une direction  
direction transversale, mais peuvent être  
verticale, ou bien avoir différentes directions  
Ils sont accompagnés de la rupture  
de la gaine fibreuse qui l'entoure, tandis  
d'autre fois il n'en est pas, qui lorsque  
est rompu, peut être dans les directions



various

Une fois que la fracture à lieu, il se fait un  
interval entre les fragments, qui est d'autant  
plus sensible que la jambe est dans une extension  
plus forte, de sorte que les os se séparent de la  
cuisse sans plus contracter, le point est si  
si fort qu'il n'y a point de plan de séparation  
facile. qui est encore en raison de la rupture  
de la gaine fibreuse qui les entoure, car plus  
elle est rompue, plus exactement à lieu avec  
quand on se cas, il n'y a plus rien qui les retient.

On peut prouver la fracture de la cuisse  
d'après ce qui est arrivé au malade, de l'équivalent  
chute de la jambe d'une manière, une action  
très forte des ossements de la cuisse au moment  
où l'on a senti un choc et qu'il n'y a point de  
ce à dire, ce qui donne lieu à la ressemblance  
au quelle a lieu la chute, aussitôt, par la différence  
que l'on a de la tension de la jambe, au moment  
de la rupture du ligament de la cuisse, de la cuisse,  
ce qui fait que l'on tombe. On remarque  
aussiment que la fracture de la cuisse n'est  
liée qu'à un moment où l'on tombe, lorsqu'on  
se soulevait point encore très bien à l'instant  
de la chute de la cuisse, mais cela n'est point,  
la chute n'a lieu qu'après de longs temps de  
la fracture. lorsqu'il n'est plus de fragments  
il ne suffit qu'une petite lésion pour  
la reconnaître, et lorsqu'on n'a qu'un os  
quand il ne suffit que d'interrompre la jambe  
pour la rendre plus d'interrompre la cuisse qui se  
trouve entre les fragments, de sorte que l'on appuie



Il s'agit de l'apophyse en haut ou en bas, au lieu de  
seul s'agit de l'apophyse en haut ou en bas, au lieu de  
Cependant lorsque la fracture est verticale.

Sans procurer la consolidation de la fracture  
ou la formation du cal, il faut distinguer  
deux cas dans cette espèce de fracture, l'un  
il y a simplement fracture sans contusion  
ou lésion des parties sous-jacentes au lieu  
de l'autre, alors le traitement est différent.  
Dans le premier cas, il faut se borner dans les premiers  
jours à tâche de dissiper l'effusion et  
l'infiltation du sang dans les parties au moyen  
des résolutions et des emollients, après qu'on  
s'est dissipé en état de se servir de sangsues  
si l'on veut, que l'on soit dans la partie,  
pour déterminer une large saignée, de la  
manière que le sang des artères, dans les  
phlegmasies, joint appétit, à la suite de  
ceps, on applique une bandelette compressive  
Mais il est à observer qu'on ne doit l'appliquer  
qu'après l'usage de ces onctions, sans  
avant, car il pourrait s'opposer  
l'application, au moment où l'effusion se dissipe  
se dissiperait tout et dissiperait tout ce qu'il  
aurait été plus, parce que les fragments de  
os seraient entre eux de adhérence, au moyen  
d'une substance intermédiaire fibreuse, qui  
permettrait plus qu'ils ne le feraient d'adhérer  
immédiatement.

On ne doute point que les fragments  
de l'os ne se réunissent, mais on  
doute s'ils peuvent se réunir immédiatement.



ce bien que si cela ne faisait que médiocrement  
un moyen d'une sublimation intermédiaire.  
Il y a en des opinions pour l'un et l'autre.  
Comme et la nature des parties  
croient qu'ils ne peuvent se défaire qu'en  
un moyen d'une sublimation intermédiaire laquelle  
est d'autant plus nécessaire qu'il n'est  
pas apparemment à l'action des ossements qui se défont  
l'écartement des fragments, tels que la fracture  
de la jambe, l'articulation du bras, de la  
cuisse, qui agissent sur la jambe par le contact.  
Desaut est de ceux qui ont écrit que la  
réunion parvenue se faire d'une manière  
immédiate qui pour cela avait grand besoin  
de rétrocession pour empêcher l'apparition de  
pourrait se faire en contact immédiat les  
fragments; à la vérité. Il paraît qu'il y a  
très bien la réunion, mais parait que le fait  
n'est pas d'empêcher aucun intérêt entre  
les fragments, mais de se résister à qui il agit  
pour en empêcher cela soit en occasion de  
voir par la suite qu'il y en a fait un, car  
les mouvements se font avec difficulté plus  
de difficulté qu'il se trouve <sup>plus</sup> d'inter-  
valles, il faut avoir soin de faire  
surtout qu'il ne soit point considérable, lequel  
n'est point et la preuve que par la sublimation  
pour se voir de nouveau la nature, ainsi peut  
être par une sublimation qui se développe  
entre les fragments.  
Les images à employer pour prouver cela



78. consolidation Des fragments, ou leur réunion  
est l'extension de la jambe sur la cuisse  
mettre les muscles dans le plus grand  
relâchement possible pour empêcher l'oppression  
ou même l'atrophie musculaire. Rien n'est  
si facile que de mettre les muscles dans le  
relâchement en mettant la jambe dans le  
vacuum seul dont se servent les gens de  
main qui nous paraissent peut-être trop  
simples. mais les gens de main des praticiens  
comp. cela est encore la méthode aux  
dents de se servir est la méthode de l'extension  
des muscles même de l'extension agglutinative  
et de l'extension. Mais pour supprimer  
la contraction des muscles, cela est plus  
difficile et passe à faire que par le moyen  
de la compression et de l'extension, séparées  
on y parvient lorsqu'on agit sur le fragment  
supérieur de l'os, qui est celui qui est  
entraîné. Sans cela on se sert de deux  
de la machine de M. Boyer, et d'un  
bandage qui s'applique sur les os qui  
se trouvent et décrit dans la machine  
des os et qui l'empêche de se  
Le bandage se fait en bandage au-dessus  
21. fracture comminutive, ou plutôt des bandes  
de l'os, des os comminutifs, ou plutôt des  
emplâtres, et même attache et de l'os.  
On se sert en commençant en appliquant  
au bas et du bas de la fracture, des  
bandes fines, placées l'une à l'autre

Le bandage se fait en bandage au-dessus  
21. fracture comminutive, ou plutôt des bandes  
de l'os, des os comminutifs, ou plutôt des  
emplâtres, et même attache et de l'os.  
On se sert en commençant en appliquant  
au bas et du bas de la fracture, des  
bandes fines, placées l'une à l'autre



les deux bandes se correspondent, en retirant  
un peu plus indubitable, tandis que les autres  
sont réunies la troisième placée sur l'opposé  
que les bandes par quelques des deux bandes,  
que sa longueur, tant qu'elle fait avec elle,  
que l'on fait jusqu'à la fracture,  
après avoir ramené les extrémités seules  
toute de bandes, que l'on doit continuer de  
faire pour tirer même encore les extrémités  
des petites bandes, en même temps que l'on  
peut garder de comprimer les téguments  
entre les fragments, et que l'on continue  
également après être bien tendue avec les  
continuant toutes de bandes. On peut  
ajouter même effet, peu de petites compresses  
longuettes que l'on applique de haut et de  
bas en croisant leur extrémité qui passe  
également par les bords de bandes.  
Cela fait, ayant appliqué si l'on peut  
pour empêcher que le membre ne se fléchisse  
une attelle sous la jambe et une partie  
de la cuisse, après avoir rempli les fléchisseurs  
avec des compresses, que l'on continue avec  
des saques; l'on maintient ainsi le membre  
après avoir placé commodément le malade  
pendant l'intervalle de tout qu'il faut pour  
faire racorder la cavité de la  
fracture qui est de 2 1/2 à 30 pièces.  
Une fois consolidée on fait l'attitude  
membre au membre, pour lui enlever  
sans aucun inconvénient.



## Fractures des os de la jambe

Les os qui la composent sont comme les  
 celui qui le tibia et le péron qui est moins exposé  
 est le plus. La fracture qui le tibia à raison de la  
 exposé. Proéminence de ce dernier en devant, qui  
 peut se faire qu'il y ait lieu en même temps  
 et c'est ce qui a servi à exprimer comme  
 les fractures de l'avant bras, en complètes  
 ou incomplètes. Celles de l'avant bras, sont  
 déposées à avoir lieu d'une manière compléte  
 à raison de son gros et de grosseur et d'après  
 la manière dont elles arrivent.

Ces sortes de fractures peuvent avoir  
 deux sortes d'une manière directe, ou bien indirecte,  
 celle où tout que le passage d'une cause de l'os  
 dans la jambe, l'extrémité de plusieurs os  
 ou l'endosse. Quand il s'agit d'une cause  
 d'un la plante du pied pour le tibia,  
 d'un par le renversement du pied en dehors  
 le péron, qui peut être fracture propre  
 ou indirecte inférieure, supérieure, ou  
 bien des os de la jambe. Souvent comme  
 l'os de la jambe est monté par avoir lieu  
 l'action musculaire pour le péron des  
 pour savoir qu'en cas de l'os de la jambe.

Elles peuvent avoir lieu d'une manière  
 oblique, transversale, ou bien avec effort  
 et être accompagnées de déplacement ou

manière  
 la fracture  
 8

la longueur, la direction et l'épaisseur des os,  
est des os ou des teguments paraitre  
porté, sur un ou deux os qui les traversent,  
qui peut être accompagné de signes douloureux,  
de reconnaissance des fractures, par les signes  
généraux du membre. L'importance de  
l'examen, en palpant la partie, en passant  
la main le long de l'os du tibia. On ne  
peut guère obtenir la crépitation des os  
à moins qu'il n'y ait fracture dans les deux  
os en même temps, car lorsqu'il n'y a que le  
tibia cela est difficile.

Examen

Les fractures reconnues, subissent la fracture  
s'il n'en existe qu'une, et fait les réduire, l'un  
en place ou l'accoutumation; pour cela il  
faut de place convenablement le malade  
sur son lit, que l'on a fait exprès dans la  
manière dont il doit être, ensuite on place  
sans interruption fracture, l'appareil convenable,  
qui consiste en un bandage de dentelle ou  
porte attelle qui est placé dessus le bandage,  
des attelles, des lattes, des remplissages et  
une bande pour tenir le pied. On prépare  
auprès par réduire la fracture, en faisant  
bien qu'on ne donne l'attention et l'attention  
attention, qui se fait toujours sur les parties  
du membre correspondantes à cette fracture  
qui est par conséquent la cause, et le pied, l'axe



88 le pied, il ne s'agit seulement que de tirer  
soins la poutrelle au moyen des mains,  
les pouces sont placés contre la plante, &  
que le doigt suivant soit placé sous l'os.  
Si l'on avait de la difficulté à réduire le  
fragment, il faudroit attendre, une peu  
en usant d'un point de levier par les  
tendons ou le contour de l'apophyse  
de callosité osseuse sur la partie  
pourrait se faire quelque fracture de  
l'os tibiaux soit osseux, tel que fût  
rapporté, qui en occasion de l'os  
soit les parties & d'ailleurs pour en faire  
ligature, et si pareil chose arrivoit, il faud  
recommander de la même manière, seigneur  
toujours assez difficile à reconnaître, &  
autait même des doutes sur un pareil  
si pareil chose arrivoit au rapport qu'on  
fait et autan, il ne s'agit seulement que  
cela étoit réelle.

Quoique la fracture d'os tibiaux soit  
il ne sauroit d'ailleurs pas y avoir un  
déplacement lorsque la poutrelle n'est  
qui peut se faire l'os tibiaux & l'os  
Harris 99. qui ne s'agit pas trop de  
la fracture de os, sur quel point  
déplacement, qu'on ne parvient à reconnaître  
qu'on l'ait d'un temps plus ou moins  
en passant le doigt sous la crête de l'os  
Lorsqu'on est parvenu à réduire les

au moyen de la coaptation, on pourroit se  
passer comme l'écrit, certains praticiens du  
Bandage du Soutlet, mais se méfiant  
du soulèvement, par cela même que les fragments  
n'ont point de tendance au déplacement. Il  
est des maladies qui ont marché avec cette  
fracture, sans laisser qu'elle existât.

Pour les fractures du fémur, qui sont <sup>fracture</sup> du fémur  
elles ont lieu empêchant point de marche. <sup>Pi. Péron.</sup>  
malades, que que cet on rapporte point comme  
le tibia dans l'asthénie qu'il ne fait même  
que lacher en dehors, aussi par cela même  
qu'il n'est point assés à la locomotion, <sup>de l'art</sup>  
à l'art, pour en faire l'élément d'une  
une d'une affection, (pièces qui sont même  
exotiques). Il faut par conséquent abandonner  
ces sortes de fractures à elles mêmes, par ce que  
elles ne sont point suivies de la lésion d'habitude  
du Pied, au moyen de l'action des Péronées,  
qui entraînent le pied de côté. Aussi est  
toutes de fractures, exigent-elles, que l'on porte  
le Pied en dedans, au moyen d'une bande, au  
bien d'une attelle.

Pour ces sortes de fractures d'os  
un sort du bandage de Soutlet que nous avons  
dit, après avoir mis le membre dans l'extension.  
que l'on applique, en appliquant chaque bandelle,  
d'une après l'autre des sœurs ou en les  
remplissage, s'écarter les attelles, qui sont  
au milieu de travers, d'une de chaque côté

écarter de  
même jans



84 est une antérieurement, mais qui doit être en  
langue, que l'antérieur antérieur laque, ap-  
prouvé au applique son bande autour du  
pied, que l'on maintient par ce moyen en  
craissant l'os du pied que l'on fixe avec des lig-  
aments de chaque côté de l'os au point attelle. App-  
rouvé de l'os pendant le temps que le l'os  
ne porte point sur un corps dur, ou  
l'osant point en se faisant anciennement  
qui se fait qu'augmenter le douloureux  
tout guère plus de 10, ou 15 jours pour  
prévenir la consolidation de la fracture.

Comme les fractures de la jambe sont  
susceptibles de déplacement, il faut mettre  
le pied dans l'extension, par un peu de l'os  
qui embrassent le genou Supérieurement  
le pied inférieurement et qui se réfléchissent  
sur les extrémités des attelles, que l'on ne  
l'une à l'autre par leur extrémité.

Fracture des os du pied.  
Il n'y a guère qu'un seul os du pied qui  
soit une description particulière que  
à celle des articulations et des os du métacarpe  
ou se rendent comme dans l'os du  
pied des fractures des os du pied.  
Quand il y a du tibia, il faut s'occuper  
que guère les os sont très brisés  
Veuillez dans ce cas l'amputation.



*D. alle*  
*D. Calcutta*

*Dr. Calverton*

de la rupture des linceuls.  
 On n'a pas toujours admis la rupture l'absence  
 du linceul d'adieu, d'une manière complète,  
 dans les premiers temps que l'on a parlé  
 en l'affection, qui arrive par l'absence  
 d'ailleurs, de même que pour le Paganisme,  
 en l'absence et en l'absence c'est à dire  
 qu'il pouvait se faire qu'il en eût  
 l'absence l'absence, tel que c'est la rupture  
 externe d'adieu, mais on ne peut pas trop  
 l'absence l'absence c'est à dire l'absence  
 l'absence que maintenant on n'admet plus  
 que l'absence l'absence l'absence l'absence  
 cette dernière l'absence tel que c'est la rupture  
 en l'absence ou même l'absence aux l'absence  
 d'adieu, à une rupture qui l'absence  
 l'absence l'absence l'absence l'absence  
 et qui l'absence l'absence l'absence l'absence



86 Dans l'indure de l'os de la jambe en un  
temps. et quel rapport. Petit. et  
Celle de platineuse l'os en aussi l'os de la  
fracture en même temps, le.

signes

Toutes les personnes qui l'ont eue  
ont prisent les mêmes signes, qui sont  
l'impossibilité de marcher. Justant en de  
c'est si elle marchent ie n'est en aere  
c'est la chute de la personne qui a  
été à l'instant même de la rupture  
l'intervalle que l'on sent, en regardant  
d'œil sur la l'os affecté, qui diminue  
dans le moment que l'on s'en lève  
la main, au lieu qu'il augmente lorsqu'il  
s'agit au qu'on voudrait l'étendre par  
l'action musculaire. Il pourroit bien  
faire que l'intervalle fut point l'un  
de l'autre, mais cela auroit bien l'air  
de corps d'homme, car on ne peut  
imaginer comment l'action des muscles  
la produiroit, sans le soleil.

On range encore à la rupture de l'os  
celle de la plante de la jambe, qui se fait  
et amène une très vive douleur qui  
malade se sent dans l'instant au cela  
aussi qu'un bruit qui est assez fort  
se fait entendre. C'est des praticiens  
pourrait que cela peut être l'os  
de la jambe, la rupture de l'os de la  
jambe.  
Le traitement de l'indure de l'os est



pro lumen quo pueri in dala pueri  
de Palaeonibus

Quand elle est elle ne peut être  
qu'une fois au dux, qui est tuer  
rapportée par le dux, qui quand elle est  
elle arrive d'un autre en travers, qui  
encore alors par un intervalle de temps  
fragments, mais qui d'un autre côté  
ne peuvent pas de continuer de se tuer  
à cause de l'existence du tuer d'abord  
qui ne fait qu'entraîner la fragilité  
en haut, en les faisant éprouver une  
espèce de balancement.

Mais ayant de d'autre que l'un d'eux  
peut-être en contact les deux parties  
du tuer d'un côté en contact avec la  
et plus difficile pour les fragments du  
Palaeon de ce que la partie est  
toujours entraînée en haut et en arrière  
par l'action du muscle.

Voici la manière dont y parvient on  
étend sur cela l'effet sur la jambe  
de telle manière que les deux parties  
des parties d'un côté soient en contact  
qui se dirigent au même point pour faire  
de la tuerie de d'abord qui se dirigent  
en une tuerie ordinaire à laquelle  
se trouvent attachées postérieurement une  
certaine qui attire le dux à une  
autre, des images de d'abord, qui se



88 Trapezium placé au dessus du genou  
enveloppant la quille au stéril fort  
après sur la jambe. Mais si on  
est abandonné maintenant, on est  
de moyenne les plus simples qui est  
la bande de l'écrou, que l'on fait  
avec des bandes. Deux jumeaux  
fixés à la plante du pied avant  
d'une autre, sur la que au septième  
extrémité qui sont ainsi mainte-  
nés. L'autre extrémité sur la  
partie postérieure de la jambe, et  
la fixer également au moyen de tout  
de bande et la fixer avec des  
bandes dans toute son étendue, et  
dans l'endroit qui pourrait être in-  
commodé par le frottement  
l'action de la jambe, pour empêcher  
le pied de se fléchir, crainte qu'il  
ne se fasse d'écartement entre les  
dix doigts appliqués sur la partie  
du pied, une attelle qui appuie  
le bas de la jambe, après avoir  
ce qu'il faut avec des compresses,  
crainte de blesser les parties molles  
les deux extrémités postérieures, qui  
soutient avec une bande. Et tout  
au bout le malade dans son lit,  
et ne doit point marcher; Il faut

per prius quatuordecim per quatuordecim 89

Capitulum de consuetudinibus

De la Plaine d'Armes à feu <sup>conduite</sup> <sup>indirecte</sup> au douze

Cette dénomination n'est point exacte, d'après  
qu'on entend par plaines de ce genre; puisqu'on  
les définit ord. une solution de continuité des  
par deux parties produites par des corps unis  
par le moyen de la poudre à canon, laquelle  
présente un aspect unifié, que l'on croit être  
produite par la chaleur que ces corps exercent,  
que la poudre et l'action de l'air leur communiquent.  
Mais cela n'est point, puisqu'on  
cela est, la même chose n'est pas la même  
corps mis en mouvement par les instruments  
à feu, qui s'y ils présentent un degré de  
chaleur il est extrêmement froid.

Pour les études nouvelles d'ailleurs  
parce de leur généralités, puis nous parlerons  
de leurs particularités.

Pour étudier leur particularités il faut à l'enquête  
indiquer les différences, l'ordre de choses qui  
pourrait les produire. On peut les rapporter  
à trois, 1.° Il y a les balles qui présentent  
de l'artifice d'après la balance qu'elles présentent de  
2.° Les étincelles qui sont des balles d'acier  
étincelles de différents genres, dans les  
quelles on peut agiter les états de l'air.



30 et tout autres corps qui pourroient être en  
en construction par la poudre à canon,  
les pierres de 50. Les Bouteils. Il est bien  
d'observer que nous ne devons point enlever  
dans une place d'armes à feu, les bûches  
par la raison de la poudre brulée.

Il a remarqué que toutes ces places nient  
que par le moyen de la dissipation de  
parties, par les corps qui les précèdent, qui  
en les entourant, brisant, brisant; l'effet  
d'écarter celles qui se présentent nient lieu que par  
moyen de l'attrition très forte qu'elle est  
élevée, et non par le choc prétendu  
des corps précédents. On a vu précédemment  
opinion. <sup>anciennes</sup> <sup>sur</sup> <sup>elles.</sup> temps qu'elle étoit de mauvais caractère  
cause d'être en de l'espèce d'attrition qu'elle  
continuoit, à l'attrition de l'attrition nient lieu  
anciennement qu'elle étoit en l'attrition  
et communiquoit son caractère à la place  
ce qui est regrettable maintenant, et disant que  
nient pas, qu'il pourroit cependant  
de faire qu'en se fût à l'attrition dans  
circonstances. On explique actuellement les  
qui arrivent par l'espèce de communication que  
et l'attrition. corps et cause, par la raison qu'elle est  
agissant lui communique.  
1<sup>re</sup> <sup>opinion</sup> <sup>sur</sup> <sup>elles.</sup> 1<sup>re</sup> Les Bûches peuvent affecter plusieurs  
une partie, lesquelles peuvent agir sur elle.





3.<sup>e</sup> Les Boudets. Les Boudets produisent de très  
très faibles, lesquels peuvent s'implémenter  
tous les parties, ou ne les faisant que  
au lieu des cantons de la traversée car  
fait être, le bas ventre ou même fessier  
dans ces cas, qui d'abord alors arrivent  
cela qu'implément l'homme et encore l'organe  
devant à la fin de leur course, ou entre  
les parties, et qui quand ils attrapent l'air  
lesquels occasionnent un ébranlement  
dans toute l'innervation et peuvent faire  
sur le choc.

On attribue anciennement la coarctation  
des parties intérieures, car attardées, la  
extrémement. Dans un état de santé  
la suite d'effort des Boudets par la  
que l'air avait éprouvé par les, qui agit  
à son tour sur les, lorsque par les  
téguments passent intérieurement, ce qui  
parce que si cela était produisant  
ou serait le plus de ces cas, ce qui  
arrive lorsque Boudet passe entre  
d'une personne, entre les bras et l'abdomen  
lorsque l'homme est appuyé sur la  
et qu'ils passent dans l'ouverture qu'ils font  
un bief et les lorsqu'ils passent très près  
parties. On explique ceci actuellement  
par le moyen de l'effet des Boudets  
sur les parties, de manière à les faire  
latteralement et agissant sur eux de  
à les comprimer, de même avec les os,

manière que les parties molles se trouvent en état g.  
deur poussement.

D'après ce que nous venons de dire, on peut  
que toutes les plaies. D'après à son poussement  
réduites à trois espèces, aux incisions, aux  
plaies contuses, et aux ablations. Comme  
nous avons présenté de règles bien précises  
pour la solution de toutes les incisions,  
nous les verrons qu'elle présentent.

On reconnaît une plaie d'après à ce que présente  
l'aspect extérieur qu'elle présente, qui est plus ou moins  
au moins marqué, produite par la disorganisation  
des parties, les infirmités sont liées, une  
peu jaunâtre; de qui fait que la plaie présente  
un aspect d'ensemble avec l'aspect qu'elle a dans  
les maladies du foie, qui sont puritres  
ce qu'il se dessine qu'un temps après la  
guérison, puisqu'on remarque qu'un fois après.  
de petites taches grisâtres se font sentir.  
présent, comme les ont accompagnés  
de corps étrangers, à moins qu'il n'y ait de  
plaies considérables d'un côté, parce que  
les plaies sont souvent de deux nature, des  
corps étrangers si rencontrent qu'il est dans  
sur les plaies, on remarque plus  
moins considérables accompagnés de plaies  
de plaies, qui est son nature inflammatoire.  
Parfois les plaies, d'après à son poussement  
susceptibles de remission par formation d'un  
de qu'elle suppurent plus, à cause de la



94 Disorganisation - qui existe. Elles sont d'ordinaire bien caractérisées, tandis qu'au début elles ne le sont point, lorsque même elles sont présentes de certains phénomènes dans la cavité de leur périoste, ou l'épiderme comme qu'il les détermine dans tout les systèmes de circulation.

Second y Dans le simple contact des corps indurcissables mis en mouvement par le moyen d'un agent à canon, il y a simplement adhésion, mais que quand ils agissent d'une manière très forte ils déterminent une plaie cutanée, qui donne lieu à une disorganisation plus ou moins considérable, qui est suivie assez fréquemment de la suppuration, qui couvrent souvent ces parties par la suppuration - qu'ils déterminent, est plus forte chez les personnes qui sont débiles que chez celles qui ne le sont point, et on en a un exemple dans les affections de la cavité des os, qui sont par conséquent dans les parties touchées les plus douloureuses, qui ne peuvent point répondre aux questions qu'on leur fait, qui éprouvent un sentiment de froid très-tout le support du corps, qui est jaillissant qui approche de la chair d'armes à feu des os et des membres.

De celles qui attaquent les membres qui sont de trop près qui après un espace très court, sous les parois de la cavité des os et des membres.



les rapportés à quatre espèces: 1.° simple  
solution de continuité des parties, 2.°  
Celles avec fractures compliquées 3.° avec  
solution des parties 4.° simple lésion des  
parties dures, c'est à dire fracture sans que  
les parties molles soient intéressées.

1.° Les simples solutions de continuité dans 1.° simple  
parties, présentent l'op de facilité dans la solution de  
nature, lesquelles peuvent être accompagnées de continuité de  
la présence de corps étrangers, qui peuvent  
exister sans les ligaments, ou à peu de chose  
près de la superficie du membre, qui s'extraient  
est assez facilement, tandis qu'autrefois ils  
le furent point, que l'on laisse dans les  
cas où ils ne peuvent pas et qu'ils ne peuvent  
puissent causer des accidents, parce qu'ils pourraient  
faire plus de lésions dans les parties profondes  
extérieures qu'ils en existent. Mais dans ces cas où  
ils s'extraient sans peine, lorsqu'ils se  
tiennent dans les profondeurs de la cheville.  
par l'aspice de l'ent de l'os quelle forme.  
Mais il peut se faire que les balle s'engrènent  
dans les parties, qu'elles alors par leur présence  
peuvent déterminer des accidents plus ou  
moins fâcheux, à raison de leur position qui  
peut survenir, c'est à cette fin qu'il est  
des praticiens qui ont dit qu'il fallait dans  
tous les cas s'extraire le corps de la balle,  
tandis que d'autres ont dit que non; car



66 Disant que l'on pouvoit s'en passer dans  
les cas: mais que en plantant regrettant  
une opinion ou tuerie d'autre d'autre,  
autre, il est aisé de réunir les deux ap-  
pêt que l'on doit débiter toutes les  
que la largeur de la plaie est trop petite  
tandis qu'on doit augmenter l'étendue  
car on elle l'est.

On débiter la plaie par le moyen  
histoiri, que l'on fait glisser dans  
laide cannelée, après qu'elle a été glis-  
sée un filot: que l'on a introduit dans  
l'oreille; que il arrive assez souvent  
on l'opère point, à cause de l'extrême  
présentat les parties conduites qui existe  
alors l'on y introduit le bout du dard  
qui pénètre plus facilement, le quel  
est glissé instrument que l'on fait agi-  
dans les directions qui conviennent, q-  
se font en tout les sens, pourvu que  
l'indivision point de l'air ne capable de  
causer une hémorragie, que l'on doit  
d'introduire les plaies qu'il est possible de  
débiter dans les deux extrémités des os  
des cannelés, et l'on remarque que l'on  
sont suffisamment débiter, lorsqu'on  
faire toucher le bout des extrémités des  
indiquent que l'on y introduit et que  
peut en par les plaies pures.  
Quand aux presens - Des plaies de



les uns ont prétendu qu'il falloit dans l'un  
les temps faire l'emploi. De même, tandis  
que d'autres ont dit le contraire, en disant que  
l'un pouvait sans passer dans l'autre, et que  
les plaies pouvaient supposer de telles; les praticiens  
modernes tiennent en joute mille et mille  
deux opinions, ils s'en font usage que toutes  
les fois que les plaies présentent une certaine  
profondeur, une ouverture, qui alors dans ce  
cas pratique mène de contre ouvertures;  
quoiqu'il soit intraduit par un ou plusieurs  
lignes de suppure, qui diminuent petit à petit  
de diamètre, en même temps que l'on a l'air  
de son côté de diminuer également le diamètre  
de largeur, c'est à dire la petite bande. Tout  
au bout, puis l'un finit par un plus grand  
après qu'il en a été aussitôt une compression  
sur la paroi de l'ouverture pour pousser  
en arrière les bords et mettre en contact  
les bords, afin qu'ils contractent adhérence,  
qui se fait avec de la charpie, des compresses  
et des bandes.

Contre les fois qu'on n'a pas point de  
titre, on fait simplement usage de charpie  
sur la plaie et diminue, ce qui diminue  
l'effacement qui peut exister, en même temps que  
la suppure à lieu, ce qui diffère  
de l'écoulement qui avait lieu avant  
Paris, le quel avait été fait avec des



18 qui couraient les parties, lorsque l'hiver  
chaude, au printemps, en même temps  
l'on administrait à l'intérieur des Stines  
châles qui fut abandonné par Paris  
au moment où il était pointé par  
de la contagion, qui ne se répandit que  
l'hiver simplement ordinaire, de laquelle  
vint de forts bons avantages, qui  
ce cas est très-bien connu en médecine,  
est encore employé q. q. fois, mais plus  
communément de cataplasmes.

Second 2.° De Celles avec fracture compliquée  
9 Vindictaire C'est toutes de plaies se présentant dans un  
2.° De celles avec membre détaché de la main qui pour enlever  
fracture compliquée Malades, demandent si l'on doit faire l'amputation  
du membre dans pareille circonstance, ou  
bien si l'on doit tâcher de le conserver, en  
tant les moyens qui courraient en pareil  
si l'on doit en faire 3.° Cela est à la grande sagesse  
importante de la Chirurgie qui doit tout peser de l'un  
particulier l'autre côté, pour voir quel parti il doit  
prendre, qui doit en être celui bien attendu  
qui est préférable pour le malade. L'usage  
se pratique assez fréquemment par les plus  
habiles praticiens, toutes les fois que les  
parties molles se trouvent très-dilatées, et  
qui forment q. q. fois une espèce de tumeur, ou  
l'usage que nous se trouvent réduit en



plusieurs fragments, joint à la route que les  
malades sont obligés de faire, et que lorsqu'ils  
se transportent sur un champ de bataille et qu'ils  
se transportent dans une capitale assez éloignée,  
par exemple à remarquer qu'un pareil circonstance  
lors même qu'on a été parvenu à conserver le  
membre, on a été obligé à l'amputation  
par les accidents qui surviennent bien souvent.

On a encore ignoré pour cela au membre  
affecté, puisqu'on a remarqué, qu'il s'est des  
cas où l'on pouvait s'en conserver plutôt  
les membres supérieurs que les inférieurs.  
Lorsque les plaies les atteignent, il faut  
faire attention à la disposition de la  
fracture. Les malades pour pareille opération,  
puisque à remarquer que lorsqu'ils surviennent  
c'est à dire point de profit, malgré que cette  
opération est bien réelle, qu'elle ne réussit  
pas souvent, tandis que le membre est  
bien pour ceux qui la désirent, en examinant  
l'état.

Lorsqu'on a décidé que l'amputation était d'être  
la partie que l'on devait prendre, l'académie a fait  
de chirurgie a demandé quand est-ce qu'il  
fallait la faire, c'est à dire tout de suite  
avant que les accidents qui causent la plaie  
simplifient, ou bien lorsqu'ils sont trop  
forts pour qu'il fallait attendre qu'ils fussent.



106 disciples, en apportant pour fondement, que  
les accidents qui survennent alors, sont très  
considérables et font souffrir les malades  
et qu'en suite on leur donne le bain au refoulement  
du sang dans la cancrène. Mais on a eu  
cette opinion, en disant que ceux qui sont  
parvenus au point de ceux que cause l'impetigo  
d'un membre; quand on refoulement du sang  
on ne peut point trop l'écarter, puis  
et après cela qu'il ne s'en fait point  
et quand même cela aurait lieu, cela ne  
peut à craindre, puisque si l'on envoie  
les malades, il y a quelquefois plus de deux  
la cancrène et l'on en voit il ne résulte point  
d'accidents sans fort la guérison. D'ailleurs  
en réfléchissant aux effets que produisent  
cause l'engorgement du membre qui sont  
peut de l'ulcère après que la maladie  
en lieu, et qui arrivent assez fréquemment  
telle que la gangrène, on fera cette réflexion  
parce que l'on est point sûr de l'issue  
elle se termine et dont les malades meurent  
en sacculée. Aussi faut-il d'après  
cette considération, ne point se hâter  
d'écarter, au moins toutes fois, que le malade  
ne soit point assez considérable pour

Le sang est  
appelé q. l.  
accident tout  
survenant.

En supposant que l'on soit appelé  
pour une personne dont l'impetigo a été



duo d'ice fait, pour pareille Maladie, mais 101  
que fait de la Sagesse du Chirurgien, elle est  
peut être faite, que faut-il faire? Il faut  
attendre que la gène qui doit survenir,  
par le grand engorgement qui existe soit  
limitée, parce que si l'on la faisait aller,  
il serait à craindre que l'on ne perdît  
tout ce qui usait du stre gène et que l'on  
gène se manifeste de nouveau, après  
qu'on ne s'aperçoit qu'il est bon de faire remarquer  
que quand les plaies empyémiques existent près  
les extrémités des Os, ces Messieurs proches  
les articulations, on est gène obligé de faire  
plus promptement l'amputation du membre. On  
s'est gène passé, en faisant l'entaille  
recession des fréquents.

On est gène de faire le débriement des faibles lorsqu'on  
corde de la pelée, pour extraire les corps étrangers, peut être  
qui se trouvent, telle que Balles, au lieu des corps étrangers  
même des portions de vêtements, en faisant  
remarque que les Balles peuvent changer de  
forme, lorsqu'elles rencontrent des corps durs,  
et devenir plates. Elles peuvent encore se  
trouver entre deux os, d'une manière à ce qu'on  
enquise peut les extraire et qui exige pour  
cela lorsqu'on en se peut point qu'il y a une  
un peu les os, puisqu'elles sont dans ces os  
enclavées, lorsqu'entre les os du Crâne, de  
l'os de la face etc.  
C'est les plaies d'armes à feu, usant

Ce qui fait  
lorsqu'on  
peut être  
des corps étrangers



162. point susceptible de la pénétration de corps  
lorsque même elles ne pénètrent qu'un  
auxiliary, au lieu même lorsqu'elles en  
deux; dans le premier cas, parce que la pénétration  
que les balles n'ont fait au lieu de la pénétration  
portées qu'à la fin de leur course, et que  
la chemise de l'individu qui en est affecté  
n'est point été traversée par elles endosse  
les vêtements elles touchent. J'étais que l'individu  
Boyer a rencontré un individu qui  
dans le cas dont nous parlons et qui trouva la  
balle dans la chambre, après plusieurs perquisitions  
sans le voir. Car que les balles traversent la  
épaisseur du mur. Au reconnaissant les  
ou les autres corps étrangers, on s'aperçoit bien  
de tant côtés, non seulement proche l'individu  
affecté, à celui diamétralement opposé, mais  
même à une étendue p. m. longue, car on  
en a rencontré dans celle qui nous intéresse  
à raison de l'individu ou celles qui l'ont touché.  
ou les vêtements proche la partie affectée,  
dans les vêtements, qui ne dépend que de la  
force qu'ils ont pour pénétrer les vêtements  
sans rencontrer en détail sur les  
instruments inventés pour faire l'abstraction  
des corps étrangers, parce qu'ils ont été  
nombre, tel que ceux dont nous avons eu  
pour constater les pièces osseuses. Or, dans  
cette, dans le cas de fracture, sans dire  
seulement qu'on peut se servir des doigts

et dont on  
est parvenu  
cela



Des pinceaux ordinaires, Du trépan de M. de  
Percut, inséré dans le crâne, qui  
réunit l'avantage de trois instruments à la fois  
puis qu'il fait les fonctions de pince, de trépan,  
et de Curette, au moyen des pinceaux dont il est  
composé, qui est tout d'une pièce et d'un  
communément. Il y a aussi l'instrument de M.  
Tarnapian, qui présente une Curette à son  
extrémité pour extraire les Bâtes et les  
qui va à rendre qui une fois qu'elle y est,  
les maintient très bien et ne permettent  
pas de glisser ce qui est un avantage considérable.  
de M. Percut.

On extrait les corps étrangers de deux manières  
manières, au lieu de pincer les corps étrangers  
qu'ils ont fait, au lieu de les pratiquant à la  
partie opposée, toutes les fois que les corps  
sont, tel que dans leur très gros volume,  
pour cela, il faut mettre les parties dans le  
relâchement et dans la situation où elles  
étaient lorsqu'elles ont été lésées. Avant  
qu'il s'oblige de dilater tout cela, toutes les  
fois, qu'on prévoit qu'ils ne pourraient être  
extraits de cela, ce qui doit être fait avant  
que de tenter à les extraire, lorsqu'on introduit  
les instruments pour les extraire, il faut être  
sur de leur direction qu'ils occupent, et approchant  
la direction du canal qu'ils ont formé, pour  
ne point passer les parties les plus  
possibles. Si l'un se sert du trépan, au lieu



704 fait glisser sur le doigt, parceque si on  
l'a dirigé, il contourne le doigt par la partie  
déchirée. Au même but que lorsque les  
doigts sont pincés, et qu'ils présentent de la solidité  
est que quand elles se trouvent situées dans  
os, ou bien entre deux, qui seige 99. de  
le seu cas, lorsqu'on en veut pas le serai-  
tir, car quand elles sont dans les os  
Prane, qu'on grata les os, afin d'écarter  
les extraire, ou bien d'écarter un peu os.

Le traitement des plaies compliquées d'éc  
10 inflammation Le traitement des plaies compliquées d'éc  
inflammation, diffère peu de celui des plaies simpl  
Le traitement fait commun d'abord par application des  
résolusifs, toutes les fois qu'elles sont accompagnées  
d'inflammation, ce qui doit être fait dans le  
commencement, car par la suite lorsqu'elles  
sont trop considérables et inflammées, il faut  
recourir aux évacués, en même temps qu'on  
fait à la plaie la partie affectée  
un bandage de tulle, et qu'on tient le  
au régime et à la diète.

L'inflammation qui s'empare de ces sortes  
de plaies, peut se terminer de deux manières  
différentes 1.° par suppuration, 2.° par gangrène.  
Quand cette dernière elle peut également se  
terminer de deux sortes, d'abord la gangrène  
peut servir à une seule manière, 1.° de  
telle sorte qu'elle peut invader tout le membre  
en peu de temps, car 1.° pendant l'opération  
d'un jour. Ensuite elle peut se faire qu'elle



se manifeste que petit à petit, de terte à faire 165  
peu de progrès l'un par l'autre, aussi celle-ci  
permette que l'on fasse l'amputation du  
membre tout de suite, tandis qu'on ne la  
peut point faire dans la précédente, parcequ'il  
n'est point de limite. Au est même obligé,  
l'opération, dans la gangrene toute parvenue  
à remarquer que si on la faisait plus, les  
malades pourrissent en fort peu de temps  
qu'on ne peut pas.

Les tumeurs de l'infamie dans les autres  
plages, sont avantageuses d'ailleurs d'arriver à  
peu, toutes les fois qu'elles se terminent par  
suppuration et qu'elles exigent les mêmes moyens.

Les plaies d'armes à feu présentent des accidents  
accidents locaux qu'il se manifestent par  
la suite, telle que l'infamie très considérable,  
qui peut être suivie de la suppuration  
d'hospital, car au bout de 15 ou 20 jours  
qui s'annoncent par la suppression de la suppuration  
par une douleur qui se manifeste dans  
la partie, qui exige alors qu'on la fasse  
amputer et qui devient dans des cas  
si considérable, qu'elle exige qu'on pratique  
l'amputation du membre, par l'opération  
dans le quel tombe le malade. Joint à  
cela, il se manifeste souvent une éruption  
dans les fonctions intérieures, qui donnent  
lieu à la fièvre, à des déjections purulentes



106 Aliment, à des nausées, des vomissements,  
l'on corrige par l'emploi des émou-  
lents et fortifiants.

État fébrile dans la émonction, dans les  
dans les plaies d'armes à feu, à la suite  
à la suppression de la suppuration dans  
plaies, que la plupart des affections ont  
comme résolution purulente, qui d'ap-  
rés, il y auroit absorption, transport de  
matière morbifique dans la émonction, on  
n'est point, presque cela n'est du qu'à un  
dérangement qui existe dans toute la  
ce qui fait qu'elle n'en est que l'effet, q-  
à lui car la suppression de toutes les  
sécrétions, telles que la transpiration, la  
qui n'est de la plus surprenante qu'à en voir  
dans le régime, sans aucunement en-  
cours d'aucune esp. assez souvent dans les  
suppurations la suppuration dans une plaie est  
assez abondante, mais diminue par la  
suite, diminue, la quelle à la  
bord de l'écoulement et se forme plus que  
une petite quantité de pus. Aussi d'ap-  
rés ces considérations, n'est-ce plus assez  
maintenir des émouls irritants sur  
surface de la plaie pour y attirer le  
pus, et le faire absorber, car il y a  
absorption, car on le faisait auparavant

## De la Soudure d'hôpital 407

Elle consiste dans la destruction entière de  
toute une partie en peu de temps, qui arrive  
subitement, lorsque même la suppuration  
hâte, et que les parties sont fort altérées  
disposées à la guérison. Elle n'est pas particulière  
aux plaies d'armes à feu, puisqu'elle arrive  
encore dans les ulcères ulcérés et dans toutes  
les lésions de continuité en peu d'années,  
mais c'est spécialement dans les premières  
qu'elle se manifeste, aussi est-ce pour cela  
que Sabatier se déterminait à percuter plusieurs  
tous les membres, qui étaient affectés de  
plaies anciennes de mauvaise nature, pour  
les remplacer de la sorte par une lésion  
de continuité récente, afin que la guérison  
eût lieu. La Soudure d'hôpital ne s'en  
exécute point, et cela doit être toutes les autres  
opérations qu'il pourrait se dispenser d'faire,  
car l'opération de la Paille, l'empêche bien  
en peu de jours.

Elle se fait quelquefois spécialement dans  
les hôpitaux, quoiqu'il n'est pas étranger  
de la rencontrer dans sa pratique particulière.  
Elle a lieu spécialement dans les guerres, surtout  
par la grande quantité des malades qui  
s'y trouvent, et par le nombre répété  
dans les lésions de mauvaise continuité.



108 qui peut tenir également à la température  
de l'atmosphère, puisqu'on ne remarque le  
démangeaison qu'après les grandes chaleurs, et  
fait par conséquent un grand nombre  
personnes atteintes, puisqu'on a vu même  
l'écaille qui chûe de la personne, c'est d'ap-  
rès la queue la regar de ces éruptions  
contagieuses.

*Exposition* Les phanomes arumeurs qui laissent  
sont le dégoût, la perte d'appétit, les  
causés, les vomissements, une diminution  
la suppuration la mauvaise odeur de  
bords de la plaie qui sont noirs et qui  
ne peut guère être, les quels présentent des  
et des inégalités dans leur position, et  
fait de progrès en peu de temps, et q  
q est insupportable tout le monde; mais on  
croit que les ecchymoses ne paraissent  
plutôt par les taches de la lèvre qui  
liens par la suite, qui devient très doulou-  
reusement.

*Exposition* Son traitement par les plus des  
Hygiène qui fait usage de <sup>une</sup> craye, et  
la gomme, qui sont les anti-épileptiques, et  
réductifs spirituels, pour combattre les  
dans le commencement de la maladie, et  
employant les médicaments et certains  
est le plus grand nombre des







110 arrivait de l'opération du sarocle. On brève  
encore arrivait à la suite des plaies de  
à fumer également lorsqu'elles étoient pointées  
théoriques de coarctation.

où d'arriver. Le tétanos essentiel n'est point aussi fréquent  
la plus dans tous les pays, puisqu'il paraît qu'il  
arrive également dans les chauds, spécialement  
aux enfants nouveau-nés, et au contraire  
aux vieillards, qui selon qu'on s'est de  
la présence du sang, qu'on capulsoit par  
chaleur ambidale avant que d'en faire  
ligature, mais cela ne paraît point être  
la cause, puisqu'on n'y fait nullement  
attention dans les plus grands cas chez les  
et qui cependant ne point lieu. Cela  
dépend selon une pratique de la température  
de l'atmosphère, auxquels ils sont exposés.  
Dans les plaies d'armes à feu, il arrive  
qu'il a été de se joindre d'un même plus, les  
même elles sont de la point de la qu'on  
de point à ce que l'on s'est de l'opération  
de coarctation que la personne à éprouver  
qui ne s'arrête que cette qu'on, mais  
porté à croire que cela ne dépend point  
point de ceci, puisque beaucoup d'autres  
qui se trouvent dans la dépendance, ne  
sont pas dérangés, au contraire que l'on  
a vu de la qu'il se porte sans effet que  
une seule partie, et au contraire dans  
quels cas, et dans certaines circonstances,



c'est à quel le plus grand nombre de Saccodites  
s'accordent.

Il est encore des opinions à sangar, que  
l'une est que l'on a écrit (quoiqu'il n'y ait pas)  
qu'il était la suite de la suppression de la  
transpiration, ce qui n'est point. Ensuite  
suivant M. Laurence chirurgien d'Albion,  
de la présence des vers dans les intestins,  
ce qui la porte à cette opinion, c'est qu'il  
a vu presque toujours traverser de dans, par  
l'ouverture cœcaïque. Quoique la chose est  
vraie que la chose est ainsi, il n'est  
point arrivé qu'il n'ait vu, qu'il n'ait vu  
que cela.

Le tétanos est ord. précédé de quelque phénomenon  
tétanique changeant de caractère dans lequel, ce qui la cause  
la difficulté de parler du Malade, l'absence  
par l'augmentation involontaire de la langue,  
disent grise comme l'écrit le vulgaire,  
et a lieu par la convulsion des muscles  
tant pharyngiens, qu'intestinaux, ce qui fait qu'il  
tient le ventre dans l'immobilité  
vide en même temps; qui est un effet  
est particulier: il en est de même de différents  
suivant les lieux qu'il occupe. Au contraire  
trismus lorsqu'il affecte les mâchoires  
mâchoires, en protractant la langue et l'écarter  
les mâchoires au devant de la langue qu'il tient.  
Epistotismus lorsque ce sont les parties



112 postérieure, ris sardonique pour les uns.  
De la face, priapisme pour le sexe et  
l'organe pour la jalousie. Haut transport  
il y a difficulté de respirer, contractions  
très graves du plexus de l'âme, le visage  
devient sale, animé, s'altère, les yeux se  
rèlent, au centre, une sueur froide couvrent  
toute la surface du corps, il y a pertes  
fonctionnelles intellectuelles.

Traitement. Le traitement qui convient est de deux espèces.  
Il faut pour le premier, c'est à dire pour les  
les premiers le plus qu'il est possible de soustraire  
des corps extérieurs. Dans le second ou le second  
ordre aux maladies tant ce qui pourrait  
occasionner de passions violentes, et  
tant ce qui pourrait aggraver. Dans le temps  
que l'un croit qu'il était produit par la  
suppression de la respiration, au moment  
de l'écoulement de l'augmentation. Mais les  
moyens qui conviennent sont l'usage de  
l'opium, les bains de vapeur chaude et une  
sueur qu'on a fait faire usage  
avant ou même par conséquent qu'on a  
été de bons effets.

3.° de l'ablation. 1.° Des plaies devenues à se, avec  
des parties ablatives de ces parties.

Lorsque des accidents agissent sur nous  
ils les entrent plutôt qu'ils ne les entrent  
le plus ordinairement qui jamais ne le sont uniformément  
mais bien inégalement, qui donne lieu



même temps aux fractures des os qui le  
compromettent, qui s'étendent toujours très haut,  
à une escarre plus ou moins considérable et  
à un hémorrhage, lorsque venant du gras.  
Vaisseaux qui se détachent ouverts.

On a demandé comment qu'il fallait  
conduire dans pareille circonstance, si l'on  
fallait faire l'empyème du membre, ou s'il  
n'y avait la pratique? Il y a eu deux parties  
pour l'un et l'autre question, mais en général  
plus pour la première, mais qu'il n'y a que l'un  
qui disait qu'il ne fallait pas la faire,  
et qui en examinant ce qu'il dit au sein  
très bien qu'il était plutôt plus difficilement  
qu'autrement, de manière que d'après cela il  
faut la pratique.

On pratique l'empyème du membre  
sans le faire. pour prévenir l'infection  
très considérable qui aurait lieu par la suite  
mais encore la grande escarre. D'après  
que celle-ci occasionne, dont les malades  
sont en danger de périr, qui si on abandonne  
la plaie à elle-même, indépendamment des  
accidents ci-dessus, il y aurait une très grande  
suppuration des os qui se ferait très longtemps  
à la suite, qui exigent qu'on en fasse  
la pratique, puis il y a une difficulté  
supérieure du membre, qui pourrait présenter  
très peu de difficulté dans certains cas.



111. Mais d'après le fait, il faut que ce soit l'un  
ou l'autre des parties affectées. Dans le cas  
où os seient fondus jusqu'à dans l'articulation  
du dessus, il faudrait la pratiquer avec  
dilatation, afin que l'os qui est le plus  
important, au risque que l'un soit d'un  
Lépreux qui le le sont point.

Secondus. 1.° fracture des os et lésion des parties  
Vendicaires. 2.° lésion de la partie antérieure sans solution de continuité  
3.° fractures apparentes, produites par l'action des os  
4.° lésion ou l'un de tout autre corps qui entrent  
dans les parties obliquement et produit la maladie, de la  
Vendicaires qui nous avons indiqués.

Signes  
Des os, remués à la partie de mouvement  
du membre et à son défaut de sentiment  
Quand on peut le mouvement indiquer  
sans que les malades n'en sentent rien et  
ce qui peut le faire pressurer, je dis qu'il  
le faire pressurer, parce qu'il n'est point de  
quelque sorte touché par un objet tant  
autre corps. Si on veut de quelque temps, qu'il  
à abandonner les malades, on les touche  
un peu, on remarque que toute l'opération  
prévoient une, moelle, une fluctuation et  
semble cause par les parties molles, de  
manière qu'on ne peut plus en dire, et  
même temps qu'il n'y a pas de mouvement  
et qu'il est tout d'un coup de gangrène, et  
le dilabrement on se trouve le membre  
le plus saignable alors qu'on l'ampute  
et fait alors la faire plutôt qu'il



113  
tard, parce que si elle n'est point guérie, elle  
peut faire le prugon et insinuer tout  
le venin. D'ailleurs, en supposant qu'on  
ne l'ait point, on s'en peut par conséquent  
elle s'étendrait la quelle pourrait faire plus  
les malades; Il est des cas où, du lieu où  
obligé de se point la p. étiquette, c'est lorsque  
le membre se trouve bien proche de la  
parce qu'en sachant point jusqu'où s'étend  
affectables parties, alors on attend avec la  
place de la nature. Sans cela, on la p. étiquette  
luejourn, est pour qu'on la rectifie et la  
de ne jamais l'augmenter qu'on la nature à la  
les lésions des parties saines d'après les morts,  
n'est pas bien exacte et que l'on s'en est en  
pareille circonstance. Il faut que ces lésions  
au-dessus des parties intéressées, pour ne pas  
venir arriver la gangrène ~~arriver~~ à la fin  
d'une opération semblable, car cela s'est  
et qu'on n'aurait point sans cela.

Des Plaies D'armes à feu Suivant  
les parties intéressées.

Talors de celles de la tête; Elles sont 1.° De la tête  
considérées en celles de la crâne et en celles de la face.

Quant à celles de la crâne, elles ne peuvent  
qu'intéresser les ligaments, c'est-à-dire les os de la crâne  
seront produits par des balles ou bien les  
os, des lésions produisant une fracture, au lieu



116 S'agissant, en effet, d'une caselle, au lieu  
dans le Corbeau, et y s'agissant au lieu  
traverser de part en part, de même que  
on du Crane, sans pour cela avoir desinté-  
resser.

Des Legumes 1<sup>o</sup> Quand elles ne font qu'intéresser les  
legumes, cela arrive. Et lorsque les balles  
attrapent la surface du Crane oblique  
de manière qu'elles peuvent y lier sans en  
et alors s'agissant à une distance plus ou  
moins éloignée de l'endroit où elles sont  
entraînées, qui aigrent les os qu'on en fait l'usage  
en pratiquant une ouverture aux legumes  
des mêmes temps qu'elles peuvent avoir  
intéressé les os, en formant une espèce  
dillon, qui peut servir la même chose,  
laquelle il faut en diversifier le usage,  
pour pouvoir l'employer.

Des os 2<sup>o</sup> Elles peuvent intéresser les os, en s'y  
formant un trou, au supplantant un  
filure, au lieu encore s'y trouvant planté  
en manière de point, qui est rare à la  
vérité, au moyen de leur application  
qu'elles peuvent les entraîner, oblige à ce qu'  
pratiquer une ou plusieurs courbes de  
travers, toutes les fois qu'on ne peut les  
faire autrement.

Des Corbeaux 3<sup>o</sup> Les Balles peuvent pénétrer dans le  
Corbeau et s'agissant, lesquelles peuvent  
occuper la superficie entière de la base  
ou ne point pas dans pareils cas, comme



qu'on peut les tirer, à moins qu'ils ne  
sentent que très peu profondément placés,  
qu'on les voyait et que l'on puisse les saisir  
sans qu'ils aient été pris les tentatives  
inutiles, requièrent quelquefois de les  
tirer. Dans le cas où on ne les pourrait saisir  
lentement il ne faudrait pas faire des paroxysmes  
dans le cerveau, par conséquent se méfier de  
de le saisir plus qu'il n'est, et de l'abandonner  
à la nature, puisqu'on a vu des personnes  
survivre avec des ballons dans le cerveau.  
Quoique nous disions qu'il est des personnes  
qui disent avec une telle chose, nous disons  
aussi qu'il est des personnes qui disent qu'il est  
mort, par suite de la compression du  
cerveau; au lieu d'autres tombes sur le

temps après un Epilepsie.

Le cas du crâne peut être traité  
par une balle de plomb ou par une balle de  
le cerveau, sans que le malade en souffre  
chaque fois d'autres cas il y a des personnes qui  
au moyen de la compression du cerveau  
du côté par où la balle est entrée, par  
les esquilles, des os du crâne qui nécessitent  
alors une pratique qui s'appelle l'opération d'un  
cure-crâne de trépan. Pour les personnes dans  
les cas où les malades ne meurent point,  
jamais ils ne jouissent d'une très longue vie.  
Parce les plaies d'armes à feu qui atteignent  
la face sont celles qui sont les plus considérables.



118 au ou moins deffines fragments, les quels  
provenant affectuellement des parties desquelles  
celles qui la sont le plus fréquemment les  
les yeux, les oreilles et la bouche. Sans celle  
du front, elles tombent dans celles qui sont  
dépand parties du crâne, qui peuvent traverser  
toute la base du cerveau. Il y a encore celles  
qui traversent toutes les jointures, et qui sont d'un  
en part, de manière à traverser tout le os  
de machine supérieure, les quels demandent  
un usage dans les moyens généraux, pour  
prévenir les accidents qui arrivent, qui mal  
qu'ils sont d'un très considérable, cependant  
plais qu'ils sont comme d'ordinaire.

Des yeux, des oreilles et de la bouche  
Toutes les plaies d'armes à feu des yeux  
sont constamment mortelles, parce qu'elles affectent  
un moyen des ballles, la base du cerveau.  
C'est ainsi si je ne me trompe pas sur la question  
si en une personne qui n'est pas morte,  
parce que la balle avait gagné la fosse temporelle  
en passant du côté externe de l'œil, et qu'elle  
de même pour celle de l'oreille, malgré  
cependant la balle et résistances qu'elle  
trouve qui la empêchent.  
Quant à celles de la bouche, d'habitude  
d'après l'usage d'armes d'armes à feu, puis  
celles faites par un fer, sont plus fréquentes  
que celles d'un pistolet, parce que le point  
est dirigé du côté du crâne. Pour celle  
cela dépend encore de la manière dont on  
le tient, puis qu'il y a une position telle



il est probable que les balles n'entraient pas  
pas le canon; Il est évident si la  
balle était dirigée du côté du canon, par  
que les balles les traversaient, au quel  
machoirs furent rapprochés l'un de l'autre,  
en tirant le pistolet, puisque sans cela  
et peu qu'il soit libre, les balles iraient  
dans cette ou de l'autre. Il arriva qu'il  
que la mort arriva, sans que pour cela  
les balles entraient dans le canon, seulement  
probablement parce qu'il y avait

On peut avoir encore regard à la manière  
dont la balle était chargée, puisque si elle  
était chargée de la poudre, car si elle  
plus d'un que nous ne le croissions au premier  
abord, soit parce que celui qui avait tiré  
de la balle, l'avait tirée ainsi, au lieu qu'il  
l'avait chargée de la poudre, qui dans  
peu d'instants ne serait qu'une  
explosion dans la chambre, sans que celle  
les tirerait, mais dans le cas contraire à un  
certain point p. m. considérable, qui ne  
fait point d'explosion de la balle dans la  
chambre, mais par une p. m. considérable, au lieu  
lorsque l'effet se développe, que la balle  
détachée qui cause alors une explosion  
considérable, qui nécessite d'autres mesures  
que l'emploi de gargasides immenses  
à la décharge de la balle, dans  
les parties environnantes la chambre, qu'on



ce qui est de nature à les contraindre, et de plus pas faire  
suffisamment de trop forcer, d'ailleurs que de faire de  
général trop grandes recherches, parce qu'elles peuvent  
être mal placées, il vaut mieux les limiter  
à la nature, qui les dirige au mieux  
la suppression qui se forme et qui par là  
fait qu'on les rend par la bouche, au lieu  
d'être poussés dehors par dans les bronches  
qui les rend par les bords. Il n'y a aucun  
danger qu'ils ne tombent dans la  
trachée artère, pendant le sommeil, et  
la suffocation, mais on n'en a jamais vu.  
Dans le cas où les malades ne peuvent  
appréhender le gonflement qui est déterminé  
par la membrane muqueuse, respirent un  
arabes, on pourroit leur introduire une  
sonde de gomme élastique dans l'œsophage  
puis dans le larynx, mais cela se fait très  
rarement.

Leçon du 13 2<sup>e</sup> Des flâmes d'air à plusieurs  
Vendémiaire affecter le Col.

2<sup>e</sup> Du Col. Rarement, il n'est affecté, tant par le  
gonflement, qu'il est à l'air. Des différents  
gonflements; que parce qu'il a très peu  
de graisse. Et d'ailleurs elles arrivent qu'il  
les qu'il ne peut alors attaquer les artères  
carotides, les voies respiratoires et l'œsophage  
lorsque ce sont les artères qui se trouvent  
elles sont constamment mortelles; d'où il résulte  
de sang qui à lieu aussitôt. On ne peut  
dire, tant de deux autres parties, à savoir



quelles le bœuf se parient et encore qu'en 121  
place dedans un conduit une sorte de gomme  
il est que tant pour permettre le passage  
de l'air que pour introduire des aliments  
dans l'estomac du cheval pour le soutenir.  
Il est arrivé dans ces cas au des corps linceux  
par la poudre à canon sont restés dans  
l'œsophage, qui se trouvent rapportés dans  
un conduit de Mr Percit sur les plaies  
Darmes à feu, qui exigent alors qu'on en  
fit l'extirpation.

3. Des Plaies Darmes à feu de la poitrine 3. De la poitrine  
Ils peuvent pénétrer dans la partie  
postérieure, sur les côtes, ou bien en passant  
1. Laquelle affectent la Colonne épinière, de celle de la  
il peut se faire simplement qu'il n'y ait aucune épinière  
que les téguments et les autres parties molles  
d'affectées, à cause de la résistance qu'opposent  
les apophyses de cette partie, qui se trouvent  
inattaquées grande quantité; Mais épinière  
des cas où la Colonne épinière est lésée,  
et que les Vertèbres soient fracturées, qu'on  
produisent dans certains cas pas plus d'effet  
que quand les balles se trouvent logées dans  
les parties molles, exigent l'une et l'autre qu'on  
les retire Mais d'autres fois la mort s'en  
suit, soit à cause d'un épanchement qui  
se forme dans le canal épinière, ou bien  
par la secousse qu'il a éprouvée, qui lui cause



Des Parois

20. Les Balles peuvent insister ininterrompues sur les parois de la poitrine, qui peuvent pénétrer au lieu ne point le faire. Celles qui ne peuvent pénétrer s'implantent qu'interrompues les parois. Elles se rompent contre les côtes, et encore causent la fracture d'une côte, l'une glisse sur elle et elle se montre à une distance plusieurs mains éloignée d'autre où elle s'est enfoncée, qui méritent punition comme, que l'on parle des parois de la poitrine qui reconnaît le fait fait l'attraction de même que quand elle se traverse par les espaces intercostaux, où elle peut résister qui est rare à la vérité, et pénétrant plusieurs fois dans la poitrine avec les saignées.

Interrompues

30. Ensuite il peut se faire qu'elle s'interrompue, et qu'elle s'écartere plusieurs fois de son point d'implantation, qu'il pénétre

Quand aux plaies d'armes à feu dans la poitrine, les Balles qui les font pénétrer peuvent traverser la poitrine, ou s'arrêter au point d'entrée, ou s'arrêter au point de sortie. Dans le premier cas on a des exemples très fréquents où elles ne causent point de danger, et où elles s'écarterent avec un accident, tandis que d'autres fois elles produisent la mort cause par la division de gros vaisseaux, ou de ceux du péricard, ou bien l'attraction lorsqu'elles s'implantent, elles peuvent également être très dangereuses, toutes les fois qu'elles

en y a rien d'interessant. De l'avis, et au contraire 123  
produire la mort s'il y en a. On a également  
des exemples où les balles sont restées dans la  
poitrine, sans avoir de suites fâcheuses.  
C'est en rapportant des exemples, j'en citai  
un où il y a eu un homme que j'envisageais  
lequel avait la balle qui avait traversé  
des changements de place, toutes les fois qu'il  
se remuait, qui avait son siège sur le Diaphragme,  
de même que pour les exemples ci-dessus.  
Mais un temps où on ne voulait point faire  
l'abstraction des balles dans la poitrine,  
mais il faut maintenant qu'on est plus  
hardie, qu'autrefois, les extraire, tantôt par  
que l'ouverture de la Plie l'écarter, parce  
certaines circonstances ne sont pas si faciles qui  
permettent l'opération, que dans d'autres cas.  
D'ailleurs moyen d'en préserver.

4°. De Celles qui affectent le bas ventre.  
Quand à ces sortes de plaies, elles sont de 4°. D'après  
moins que pour la poitrine, par conséquent  
moins dangereuses, sans cela, elles exigent  
d'autres moyens que ceux indiqués ci-dessus.  
sont plus ou moins faciles selon les  
parties lésées. Surtout lorsque c'est la partie qui  
est, il faut faire qu'il se forme une cicatrice  
dans cet organe, qui si la plaie est à la  
partie supérieure et antérieure, soit au-dessus  
(les balles) avec la suppuration. Effectivement,  
les balles peuvent y séjourner pendant que  
longtemps, sans sortir au dehors par le canal



observation. Au rapportera à cet effet, une abstrac-  
 tion de l'ordonnance, par laquelle il est ordonné de  
 faire une portion de l'ordonnance de l'ordonnance, qui est  
 en l'ordonnance une portion de l'ordonnance, au moyen  
 d'ingestion préventive de l'ordonnance, mais il  
 faut en outre les concepts de l'ordonnance, car il y a  
 cela n'est point, puisque suivant les ordres, on  
 le corps en question dans la suite, lorsque  
 l'ordonnance de l'ordonnance de l'ordonnance, qui  
 mourut par le temps après. D'ailleurs  
 pour le prévoir, il faut voir que la suite  
 de l'ordonnance avec les connaissances chimiques  
 actuelles, ce qui n'est point. Au reste ce fait  
 parce que ceux qui l'ordonnent ont embrassé l'ordonnance  
 prétendait qu'il n'y avait de l'ordonnance de l'ordonnance  
 de l'ordonnance, ce qui ne peut point être  
 quand on veut plaindre de l'ordonnance, il  
 faut se borner aux principes généraux, et  
 en outre ceux-ci.

5.° Des parties 29.° Plais d'armes à feu destinés à se porter  
 gémilats. gémilats.  
 Elles indiquent qu'il faut d'autres traitements,  
 que pour les autres parties du corps.

recomendat

strangers. I was not parties.

oculaire.

2. Les corps étrangers  
à l'œuf mûr, cela peut y déterminer.



196 Caus qui peuvent y entrer sans estre  
cette espèce petits insectes, avec Manchoune, - ou tout  
autre corps étranger, tel que Strepelles  
effilées grains de sable de la terre  
infinité d'autres corps. Une fois qu'ils y  
sont, ils déterminent une irritation attée  
dans la partie, qui dure même qq temps  
une fois qu'ils sont extraits, joint à la  
sédation Des larmes qu'ils déterminent.

Comment y venir Les Moyens avec les quels on fait la  
les extraits de ces corps étrangers, - varient suivant la  
espèce, le genre, ou selon qu'il est  
fillet, de morveau de Papier, Raulin, de  
tête d'un iugle, et autres corps. Mais  
personnes qui se servent d'une pince de métal  
tel qu'un liard, un d'ensemblé, qui sont  
même étrangers à l'art - lesquelles réussissent  
très bien. Ces corps diffèrent peu des autres  
quand ils sont extraits. Les corps étrangers  
Il arrive des cas où ils se trouvent implorés  
dans la conjonctive, autour de la cornée  
transparente, - qui saignent qq. dans le 1.  
cas qu'on lui pratique une légère incision,  
(la conjonctive) au moyen d'une lancette  
pour y parvenir les extraits. Dans le cas  
on ne pourroit pas par ce moyen, on doit  
de même que dans le second, le abandonner  
à la nature, qui les extraits elle même  
par la suite, au moyen de la légère suppuration  
qui se forme dans l'endroit qu'ils occupent.

En supposant que ce soient des parcelles 127  
métalliques qui se trouvent ainsi implantées  
et qu'on ne puisse point les avoir, il faudrait  
si l'on vouloit faire comme le sage la fait  
de s'approcher à la femme de Phéculienne, et  
se voir d'une pièce d'argent qu'on approcherait  
de ces corps métalliques, qui par l'attraction  
qu'elle leur imprime, donnerait lieu  
à requies le déplantant. C'est à cet effet  
qu'un Oculiste à propos le service d'un  
d'un bâton de Cien Espagne, qui produisant  
la même chose lorsqu'il est près et approche  
des corps.

20. Des Corps étrangers dans les  
~~fausses~~ l'oreille l'oreille.

Rarement on en remarque, cependant on en  
se rencontre qq. ce qui arrive qq. chez les  
enfants qui en ramenant y en introduisant.  
Quand tache alors de les extraire, après avoir  
fait expirer fortement les narines, est lorsqu'on  
a qq. des l'oreille de l'air, si malgré cela  
ils ne sortent point alors on tâche de les  
tirer avec un l'oreille de l'oreille, ou bien  
de les pousser derrière elles, soit avec un l'oreille,  
ou bien avec un l'oreille de l'oreille, ou bien avec un  
corps facile pour cet objet.

30. Présence des corps étrangers dans  
les oreilles.

Il peut s'introduire également des corps  
étrangers dans les oreilles, soit naturellement  
comme le font les enfants, ou bien accidentellement



128 cas Vg. en dormant qu'il nous entre de  
Purpures, qui par leur prise, suit par  
L'urapées... touchant de la sortie et qu'il les en la prise  
à cause de la Corinne qu'il en enlève  
qui n'est jamais sèches, parce qu'il est  
peu de les extraire. Quand on a les autres  
qui peuvent se introduire les uns ont un  
Volume et d'autres proportionnellement sont  
qui sont plus ou moins difficiles à extraire.  
Il le déprimant encore faisant qu'ils ont  
faculté d'augmenter une fois qu'ils sont  
autres, au moyen de l'humidité qui se  
trouve dans les oreilles, les sont les cas.  
en est d'autres qui sont solides, car les cas  
de Corinne, les petites bœufes de vers de  
reconnait ord. très bien ces corps, qu'il  
y en est qui se sont séparés en impris et  
n'ont crû qu'ils n'avaient fait qu'y toucher.

Moyens avec lesquels on ne peut pas attendre trop longtemps  
lesquels on ne peut pas attendre trop longtemps  
contraints. Pendant qu'on est qui sont susceptibles de  
de Volume, parce qu'ils se contractent plus difficilement  
en se sort pour cela de plus ord. D'une  
que lui fait traduire les plus d'augmentation  
à la quelle on imprime après avoir été  
petit mouvement lorsque l'on se voit qu'il n'est  
une peu d'huile, que cela ne soit pas mauvais  
acheinement on veut pour les extraire,  
mettre les personnes couchées sur une table  
toutes allongées après qu'on en la bête  
toute, afin de donner une secousse à

tête et par là aux corps étrangers, mais ce 129  
image est mauvais. Il est des circonstances  
où ils peuvent sortir des mêmes, tel est le  
cas où leur présence à déterminer une irritation  
à la membrane muqueuse, qui donne lieu à  
une suppuration, qui bouchant la tête de sorte  
ils tombent, en même temps qu'il sort du  
pus, ou une espèce de fluide gras semblable  
à du Miel.

Des circonstances survenues, que l'on se voit  
qu'il peut venir les entrées d'une espèce de l'infant,  
toutes les fois que le corps présente  
une résistance capable de lui résister.

4<sup>e</sup> Présence des corps étrangers  
dans la Bouche et les cavités qui s'ouvrent.

Ces Corps peuvent y entrer naturellement,  
car quand on met le doigt en l'air, pour les  
recueillir au lieu qu'ils peuvent y entrer  
siège dans le larynx, le Pharynx et  
l'œsophage.

Des corps assez multipliés peuvent entrer dans le larynx  
dans le larynx, lorsqu'ils sont en mouvement, c'est-à-  
dire que l'épiglotte s'élève lorsque nous avalons  
d'une ressemblance une toux convulsive, difficile  
de respirer, sentiment de gêne qui tient à  
la présence du corps étranger sur la membrane  
muqueuse du larynx, que la toux est irritée  
et qui ne s'ôte point d'ordinaire.

Les substances qui peuvent y introduire Corps q. peuvent  
des portions d'aliments, des os, des arêtes y entrer.



130 Des fibres de muscles, mais il est à remarquer  
que pour ces derniers muscles il ne se trouve  
à son entrée dans par ces artères, Des fibres  
des fibres os, même des fibres élastiques, ainsi  
cette éponge d'un fœtus, qui est Gilber  
le quel se trouve dans le moment de folie  
clif de son secrétaire au titoussant plus  
l'apprise essentiel, de la quelle il mourut  
de temps après, malgré qu'il disait  
qu'il était dans le col, mais qu'il s'en  
point; que les fibres de folie, que l'on  
de son cadavre montent, effectivement qu'il  
en avait une, dont une partie tombait  
dans le thorax, tandis que l'autre était  
le larynx. Il est qui peuvent occuper  
les muscles du larynx et qui malgré  
cela empêchent la respiration, tels  
des grains de blé, ou autres semences.

Il est à remarquer que tout les corps  
étrangers qui tombent dans la trachée  
ne vont point se fixer sur les branches,  
qu'ils se fixent à l'entrée, à cause de la  
de l'air qui les entraîne du côté du larynx  
qui se trouvent libres au lieu de se  
parais. Ils se trouvent entrainés du haut  
les infusements de spirations, ce sont  
qu'ils s'inspirent à cause de l'air qui  
traverse même d'altère à passer, aussi  
l'expiration de la laryngotomie, sans quoi  
l'air peut avoir accès au dehors, les corps

étrangers y passent avec grande énergie, car / 31.  
est interdit à recevoir quelque chose d'étranger.

De cette opération, on remarque avec une  
présence par le sentiment pénible qu'on  
éprouve indigne d'être dans cette partie.

A l'instant que les corps étrangers sont - Le second  
introduits dans la trache artère, ils ont un 6<sup>e</sup> mouvement  
plus volumineux, ils passent par leur présence.

danse bien à la suffocation du malade, par l'effet  
l'interception de l'air dans les poumons, l'effet

est de même pour ceux qui se trouvent  
dans la trache artère, qui fait suite au larynx,

qui s'arrête dans ces parties, par les  
pièces de la trache artère, qui s'arrête par  
la difficulté de respirer, par une toux convulsive

et qui cause même g<sup>g</sup> la mort. On a vu

exemples dans certains cas de ces violentes toux.

Dans le cas où il pénètre des quilles de bois,

ou bien g<sup>g</sup> parties d'instruments dans la larynx

qui est aussitôt suivie d'une suffocation, d'une

manière très forte. La mort qui survient

dans pareil circonstance peut tenir à deux causes,

ou bien à la toux trop forte, qui est convulsive,

la quelle peut donner lieu à l'apoplexie larynx,

ou bien à l'excitation trop forte qui détermine  
les poumons.

Il arrive g<sup>g</sup> que l'on se méprenne sur la  
présence des corps étrangers dans la larynx,  
cela d'arrive par g<sup>g</sup> l'excitation, puisque l'excitation



130 Cuius nomen est très rare, cependant cela a été  
mon, l'observation que je suis appelé à en  
dernier pour en faire qui m'a été par  
présenter d'une façon de l'histoire dans le d'après  
le quel corps fut reconnu par un praticien  
illustre, lequel dit avoir obtenu qu'il fallait  
qu'un praticien expérimenté d'après, mais  
seul est encore en attente à un autre, non  
moins recommandable, solution d'autant  
plus de sa présence l'enfant vivait et  
l'endemain avec le prédit le premier, pour  
d'ailleurs l'opération par les accidents qui ont  
été dans l'histoire cadavérique sur l'issue  
la réalité de la chose. Cette observation  
se lie avec celles des auteurs qui en ont  
des exemples.

Il est difficile de se méprendre sur la  
présence des corps étrangers dans le d'après  
toutes les fois qu'on est appelé à l'enquête  
par le fait que vous fait le malade et la  
mort et par les personnes environnantes  
qui ont assisté à la mort, la réalité  
devient rare, à moins. Il est des cas  
où l'on peut se méprendre pour en qui  
seraient restés dans le thorax, parce que  
des effets sont analogues, par la compression  
qu'ils exercent sur la trachée artère, l'on  
ne peut avoir de doute, un praticien  
il se peut dans le thorax qui s'élève  
à, au lieu de cette manière.

Certainnement on préférerait la trachéotomie 183  
à la laryngotomie, parcequ'on la croyait  
plus facile, mais maintenant on préfère  
celle-ci, parcequ'on a vu qu'à l'issue de la  
nombreuse trachéotomie, un homme  
mourut s'il le faut, dans le cas où l'on  
corps étranger dans la trachée et  
larynx alors on fait un long de cartilage  
thyroïde; Il vient dans ces dernières langes  
qui ont admis la possibilité de faire  
le trachéotomie et l'opération au deuxième anneau  
de la trachée postérieure, dans le cas de corps  
étrangers dans la trachée artère.

Parvenir des corps étrangers s'est fait. Corps étrangers  
dans l'œsophage, c'est toujours le plus ord.  
dans le pharynx, à raison de la contraction  
de celui-ci, qui s'avance très loin différenciant  
ils peuvent s'y enfoncer, d'abord il peut se faire  
qu'ils occupent la partie la plus supérieure,  
2°. dans l'endroit qui correspond à peu de chose  
pres l'ouverture du larynx au dessus du  
cartilage épiglottique 3°. Enfin ils peuvent  
occuper la partie inférieure.  
Quand à ceux qui occupent la partie  
la plus élevée, qu'on ord. s'en faire par la trachéotomie  
et s'en faire par la trachéotomie, on les extrait par la trachéotomie  
dans le larynx, on les extrait par la trachéotomie  
le larynx par la trachéotomie, en le tirant vers par



134 a l'anche, au lieu par l'anche des fosses  
nasales, au lieu par l'anche dans l'estomac

Ces différents corps sont fig. des crânes  
de crânes, des épiques, de l'épithème. Les  
peuvent insérer y séjourner, les quels par  
avoir une direction verticale, et par  
de haut en bas, au lieu de bas en haut  
ils peuvent <sup>insérer</sup> avoir une direction horizontale  
et par arriver les quels ont un volume  
considérable, qu'ils compriment l'artère  
arterielle, et déterminent par là, la mesure  
de pratiquer l'expiration de la trachéotomie  
par la raison qu'ils peuvent s'implanter en bas  
tirant de haut dans certains cas, duit-ent  
les fait qu'on les extrait avec une pince  
les pince un peu primitivement en bas.

On croiroit que dans certains cas, il seroit  
si, l'on pourroit de penser les corps étrangers  
certaines, mais cela n'est point, puisqu'ils  
s'y étoient introduit déterminent des suites  
du visage de l'excitation qu'ils y déterminent  
au lieu même quand ils parcourent toute  
Voies intestinales produisent des fistules  
par le qu'on l'égare dans cette partie  
est des circonstances au lieu par l'anche  
l'anche de corps étrangers, les pince dans  
l'estomac, au lieu de retirer l'apert  
épithème, mais il faut mieux dans les  
cas toujours le retirer qu'on le applique

lorsqu'on pourroit en les retirer en le <sup>108</sup>  
pousser, il faudroit alors faire l'opération  
de la pharyngotomie, au lieu de l'asphygotomie.  
On se sert de moyens différents suivant  
qu'on veut le pincer à une distance, ou bien  
qu'on veut le saisir dans le Pénis en  
un resort ordinaire tendu de gomme élastique  
d'une certaine longueur, au lieu d'un fil  
qu'on enroit auparavant d'huile. Quand on  
en fait le service d'un morceau de lanière  
à l'extrémité de laquelle se trouve attaché  
de brins de fil, au lieu d'éponge, qui pourroit  
être également attachée au bout d'une bande de  
gomme élastique. On tient autres moyens,  
une d'éponge au bout de brins de fil,  
au lieu de l'instrument appelé petit Sargat,  
qu'on introduit dans l'asphygotomie et qu'on  
déploie lorsqu'il a passé l'isthme, qu'on  
enlève en même temps; dola bande de  
gomme élastique, dans laquelle on a introduit  
de l'éponge, qui se trouve à son extrémité  
dans le canal qu'elle présente, qui se trouve  
occupé dans le droit, plutôt qu'on ne présente  
de l'éponge, qui aura fait qu'elle a passé le corps  
de la petite éponge avec le ressort en la  
qu'elle est restée attachée avec un fil,  
et qui de suite retire.

Après tout  
lorsqu'on a observé il faut faire l'opération  
de la pharyngotomie, au lieu de l'asphygotomie.



136 On doit toujours faire la pare parce qu'elle  
est plus facile à faire et qu'elle en vaut  
pour le plus commun au point de la faire  
sans qu'il en résulte des accidents, à cause de  
l'usage qui l'a conservée. Lorsqu'on la  
pratiquait l'opération, il faut la faire  
la faire comme l'indiquant les modernes  
et du moins la manière dont ils l'ont  
qu'elle pourrait être faite, puisqu'elle  
la peut encore être. Elle l'a bien été  
fois comme l'indiquant Gatacre, et  
on n'a pas qu'elle ait la manière dont  
est faite, puisqu'elle n'a nullement été  
si on n'est qu'en la faire comme l'indiquant  
qui est le 136 qui l'a décrite, mais ne  
point de grand avantage, une opération  
présentant l'endroit au il convient de  
pratiquer, n'y qu'il n'est pas qu'il faut  
introduire primitivement quelque chose de  
le Pharynx, ce qu'on l'a de ces raisons  
Savoir même qu'ils la pratiquent, on  
on introduit dans le Pharynx une sonde  
munit d'un doigt avec le quel on vient  
inventer pour l'opération de la Caille  
haut apparaît, avec la quelle on soulève  
un peu les parties latérales, qui indiquent  
l'endroit où on doit la pratiquer. Cela  
indivision d'abord les ligaments, de la

lisse cellulaire, l'annule en aplatissement [B]  
qui se trouvent dans les parties latérales  
du col, les quels étant, au pousse la  
dort qui se trouve dans la lèvre, en pressant  
garde l'intérieur le vaisseau qui le contient  
le quel une fois sorti se introduit dans  
la rainure qu'il présente la pointe d'un  
bistouri droit, avec lequel on dévise  
l'empêchement en peu de bas, au bien autant  
qu'il est possible dans le cas que l'obstacle  
est que se trouve le corps étranger par  
qu'un on dévise point les artères. Dans le cas  
qu'il est de haut qu'il se trouve, on y  
introduit une sonde cannelée après qu'on  
a balancé et la sonde, et formée d'épave  
de même avec le bistouri, puis l'on  
procède à l'extirpation du corps étranger.  
Cela fait on réunit les bords de l'aplan  
avec les moyens convenables après avoir  
fait la ligation des artères s'il se trouve  
d'importance l'on fait mettre le malade  
convenablement dans son lit.

### §. Des Corps étrangers dans l'Estomac.

Ces Corps peuvent être introduits volontairement  
ou bien involontairement, qui une fois qu'ils y  
sont peuvent produire une effet à propre  
analogie à celui que détermine le Malade  
et même qu'on galle, les quels produisent



13899. une vive irritation qui est suivie de  
fièvres facheuses. Ces derniers sont en raison  
de leur espèce, tels que du Nert, des esquis  
d'os plus ou moins pointus. Co. Parotid. ces  
corps s'engouffrent dans l'estomac sans y pénétrer  
S'ils y restent en partie, tandis que d'autres y sont  
totalement et parcourent tout le conduit intestinal et par  
viennent dans l'intestin rectum où ils enfoncent  
au lieu de percer les parois et grand dard  
parties qui s'élèvent où ils déterminent  
des abcès. Il est des cas où ils ne traversent  
pas tout le conduit intestinal, qu'ils le percent  
et restent près d'une distance plus ou  
moins éloignée de l'endroit où ils sont sortis, qu'ils  
déterminent quelquefois lorsqu'on les recon  
naît les retirent. On a vu dans des cas  
se retirer dans la fosse, dont les uns ont  
qu'ils s'éloignent par le conduit, et  
quand ils sont dans tout autre endroit,  
par le moyen de la circulation, mais on  
peut guérir l'admission.

On a vu à retarder trois fois de l'admission  
de l'air de l'estomac ont vu des fluxus; On a  
vu l'estomac lorsqu'il s'agit de pratiquer une opé  
ration de retarder, de la faire dans un  
ou il est entre une distension comme d'air  
produit par les aliments, et de l'air  
si l'air la pratiquait - lorsqu'il est vu

il faudroit aller le long par la rive 439  
ensuite s'il qu'on ne pourroit que la  
pratiquer à la petite cunabule. En suite  
c'étoit dans un moment de la dissection on  
se pressoit à diviser les vaisseaux de la gèle  
cunabule. On la fait par une cunabule  
des points de l'entree, d'ici, des aiguilles, des  
épingles.

6. Des Corps étrangers dans  
l'intestin Rectum.

Ces corps qui sont retirés de cet intestin, sont  
ceux qui ont pénétré tout le conduit  
intestinal et qui s'y sont leur refuge, qui  
peuvent s'y transporter sans pénétrer les parois, on  
bien qui les pénétre. On les reconnaît par  
introduisant le doigt, ou bien par l'application  
de la plume à des incisions. On les retire  
au moyen des pinces, et de tout autre  
instrument qui puissent produire le même  
effet.

On a l'exemple de deux personnes, dont  
l'une s'étoit introduit une petite balle  
de fer et une plume, qu'on en ôta  
peine à retirer, parce que la plume glissoit  
sans les pinces; Une autre une cunabule de bois,  
dont les parois étoient coupées à quelque distance,  
qui aient été introduite par le gros bout,  
qui causa trop de douleur à la personne,



140 parce qu'à mesure qu'on va voit l'altération  
les faits s'introduisent dans les cavités  
de l'intérieur de l'Organisme, ne paraissent  
qu'un moyen d'un nouveau de l'orga-  
nisme dans lequel on introduit la  
que l'on avait attaché primitivement  
à son lieu.

7.° Des Corps étrangers dans  
organes de la génération.

Quand aux corps étrangers qui regardent  
de l'homme les organes de l'homme, les uns peuvent  
être appliqués à leur surface tandis que  
d'autres sont introduits à l'intérieur  
le moyen du canal de l'urètre, sans  
qui se trouvent à l'intérieur, les uns qui  
seulement y avoir été introduit, comme  
de pierres etc. les autres y forment des  
les pierres, et sans ne parlerons point de leur  
traction, tant de ceux qui peuvent se  
dans l'urètre, que pour ceux de la vessie  
même que pour ceux qui peuvent se  
dans la Matrice chez la femme et pour  
les autres cavités qui leur sont liés, nous  
en traiterons en parlant de ces organes  
l'ordre des fonctions.

Pour ceux qui se trouvent appliqués  
à leur surface, nous en avons un à  
exemple un brisquet, un Virate, etc.  
qui présente l'altération d'une élévation  
qui est exigé qu'on les lève, pour

les cotisations exigentales on ne peut guère  
proscrire les moyens qui chasseroient cela  
est insaisissable du corps, de sorte que c'est à  
la sagacité du Chirurgien à deviner quel est  
le moyen qui convient.

Pour prévenir l'introduction <sup>dans</sup> des corps  
étrangers qui sont introduits dans le canal  
de l'urètre, plutôt qu'ils sortent, souvent ils  
entrent dans la vessie et sont la cause  
d'inconveniences.

Il y a presque autant de corps étrangers De la femme  
introduits dans le canal de l'urètre de la femme  
que dans celui de l'homme, lesquels sont  
également dans la vessie. L'un ou l'autre qui sont  
étrangers dans le Vagin, reçoivent les personnes  
de l'art sont appelés par ce titre, à cause de  
la honte qu'en la plupart des femmes, d'admettre  
pareille chose, qui ne les empêchent que la coquetterie  
n'ait pu parvenir à les extraire,  
par les points qu'ils y ont mis. Cependant  
il fautrait se faire qu'on le fût, et que  
l'on extrairait des morceaux de suscaires,  
mais qui arrivait si plus fréquemment  
anciennement à cause de la turbulence d'urine  
ou les composant. Dans ce cas on extrairait  
le corps avec la bonté des doigts, ou  
bien avec tout autres moyens.



Leçon du 17<sup>me</sup> 2<sup>e</sup> Edition  
Quidonaire

## Des Différents Déplacements

On entend par là le changement de rapport  
de nos parties, qui constitue une maladie  
essentielle, qui se caractérise par un point  
de malade.

On y range ceux des os, qui forment  
ce qu'on nomme l'apathie; ceux des  
des ossements et des muscles qui constituent  
les articulations. Cette dernière ne peut être  
de tout temps, c'est l'articulation qui en fait  
le premier, et qui fait connaître dans le  
par le fait, mais que l'on a admis depuis  
cette époque.

## Des Luxations.

Il suffirait presque pour dire de cette  
maladie, que l'on dit qu'elle est  
puisque l'on entend assez bien cela; mais  
il faut faire voir la cause de  
qu'on en donne, en disant qu'il y a  
lorsqu'il y a sortie de la tête d'un os  
de la cavité, ou au-delà de la tête  
d'un os avec le Périoste.

On en donne souvent d'autres une meilleure  
définition - des luxations, en disant que  
c'est une lésion, toutes les fois qu'il y a un  
de rapport substitué de deux surfaces  
l'une avec l'autre; puis que d'après cela  
y range les os de maladies qu'on y  
point de l'entente, tels que le déplacement

Dents avec leurs alvéoles qui sont  
irritables ligamentaires; En évaluant d'autres  
maladies qui n'y ont point rapport, tels  
que les ligaments spontanés. Du fémur, de  
la première vertèbre avec la seconde, presque  
sans il n'y a point changement de rapport  
entre les parties.

On pourrait admettre si l'on voulait  
grand exemple de luxation spontanée, celle  
qui a lieu au pied avec la jambe, qui est  
la seule qui a lieu de cette manière, qui  
arrive comme avec les autres dit par la  
contraction des muscles péroniers sans que  
puisse cela il y ait affection des cartilages.

Les luxations présentent l'op de la rigidité  
dans une espèce et l'autre qu'on appelle. Sans  
les divisions d'après la genre d'articulation.  
quelles os présentent, principalement est qu'on appelle  
voies de la ressemblance entre elles, cependant comment  
en différenciant d'après le mode d'articulation, qu'on appelle  
en allant du plus simple au plus compliqué,  
c'est à dire des immobiles aux mobiles.

Sans divisions les articulations d'après différences  
la manière dont les os sont articulés, ou  
immobiles et mobiles, qui forment les os, la articulation  
les os se subdivisent encore chacune en  
surface par juxtaposition, l'engrenage, et  
implantées pour les immobiles. Et les os  
contigus et continus pour les mobiles, qui  
composent l'os; Celles en cinq genres,



144 La première comprend les articulations au  
sans surfaces  
Contiguës. La centième l'opposition d'axe, la circumduction  
et la rotation, qui est remarquable par le  
et le nombre des mouvements, et par  
rangées les articulations Scapulo-humérales  
ilio-femorales.

La Deuxième diffère de la première par  
du mouvement de rotation, l'opposition  
circumduction et rencontre d'axes. On a  
trouvé des exemples dans les articulations  
temporo-mandibulaire, Sternoclaviculaire,  
Radio-carpienne, Metacarpo-phalangienne  
Carpometacarpienne du Doigt, &c.

La Troisième a de même que la précédente  
l'opposition en plus ou en moins, et la cir-  
qui suppose toujours une opposition d'axe.  
Soit cette opposition est toujours formée  
sans unique, à celui de la flexion et de l'extension  
ou la rencontre spécialement dans les  
dentures, soit au Coudé ou au Genou,  
Doigt dans les articulations des phalan-  
ges.

Dans le quatrième toute espèce de cir-  
et d'opposition disparaît dans ce genre,  
nous offre plus que la rotation isolée,  
qui se voit dans les articulations Cubito-  
radio-carpienne.

Dans le Cinquième, toute espèce de  
d'opposition, et de circumduction est nulle  
ce genre, qui est le plus nombreux et  
renferme les articulations du carpe dans  
du carpe et du cubito-carpe, des vertèbres  
entre elles par leurs apophyses articu-





146. Mais qu'il est bien prouvé  
à un grand nombre d'opérations  
on voudrait plus admettre que celle prod.  
de cette manière, puis on voit  
qu'il ne faut pas être porté en trop  
côté, en trop de l'autre, nous voyons  
un juste milieu, en disant que tout  
il peut se faire de location par l'action  
des corps extérieurs, d'autrefois par l'action  
musculaire, soit surtout celle de la main  
qui a lieu de cette manière. Mais aussi  
que dans d'autres circonstances l'action est  
de même à celle des corps extérieurs par  
les premières c'est ce qu'on voit par ex.  
celles du fémur et de l'humérus; dans celle  
dernière supprimons le bras osseux du bras  
que nous tenons dressé, la tête de l'os  
hors de la cavité, la quelle plutôt d'être  
en haut par le deltoïde est en bas par le  
sous-scapulaire.

D'après le changement d'appui qui  
arrive au bras, dans les locations, on a  
des différences en compette et en insu-  
ette de dénomination est assez exacte, et  
à pour exemple d'appui, celle qui  
arrive fig. à l'humérus avec la cavité  
glenoïdale de l'omoplate, puis celle du fémur  
avec la cavité glenoïdale coxaloïde de l'os  
ilios. Pour le deuxième, dans les actions  
glenoïdales, c'est l'articulation du bras  
à l'omoplate.

Quand on parle d'un os, on dit qu'il est <sup>47</sup>  
léger, on devrait parler de celui qui l'est,  
cependant on ne ledit point toujours, puisque  
l'on veut au contraire celui qui ne l'est point,  
Vg. en parlant de la légation du Subitus avec  
Humerus, on dit légation du Subitus, ce qui  
n'est point, parce qu'il n'est point lui qui l'est,  
mais bien Humerus, puisqu'il est de la  
cavité que lui présente le premier os  
est de même du Saphoide avec l'astragale,  
on dit légation du Saphoide, tandis que  
c'est l'astragale qui l'est. D'après cela, on peut  
que l'on s'est extrêmement contredit, c'est par  
ce Sattache en général au plus mobile. Secundu  
19' Vindicta

Si un os qui se lève ne pourrait se porter  
que dans tel sens, et qu'il fût d'usage de  
l'endroit dans lequel il peut se porter, on  
pourrait se dispenser de donner un nom  
à une légation, mais comme il y en a qui  
peuvent se porter dans différents endroits,  
on est obligé de dire tel os est dans tel  
lieu, c'est ce qui a obligé les anciens à <sup>68</sup>  
spécifier, tel que pour la légation du <sup>70</sup>  
pédon, qu'ils disaient qu'il pouvait se lève <sup>71</sup>  
en haut, en bas, en dedans et en dehors, <sup>72</sup>  
dénominations infiniment vaines, qui  
à entretenir dans de grandes difficultés,



ce que j'aurais pu ne pas dire, ce qui n'aurait point eu lieu. Si on  
 l'aurait donné des noms tirés des os  
 on les trouverait au sacro-coccygienne  
 pour dire la luxation iliaque, quand on  
 quand la tête du fémur et contre la par  
 itiaque de l'os des iles, ainsi de suite, pour  
 la luxation pubienne quand elle est vers le pubis  
 sans pubienne, vers le trou sans pubien, et  
 l'ischiatique vers la tubérosité ischiatique. Il y  
 est de même pour le humerus, en disant  
 luxation axillaire, statot que luxation  
 bras, sous scapulaire, lorsqu'il se trouve entre  
 la clavicule sans scapulaire, sans épineuse  
 lorsqu'il est sous l'épine de l'omoplate. Il y  
 a tant de variantes articulaires, avec tant  
 de noms différents des os tirés d'appareils  
 les os sont, il faut composer les dénominations.

Signes des  
 Luxations

Il est difficile de donner une liste  
 des signes des luxations, il y en a  
 généralement quatre en parlant de chaque  
 luxation en particulier et c'est ce que nous  
 ferons.

Leur traitement

Leur traitement consiste à faire passer  
 à l'os déplacé, un chemin opposé à celui  
 qu'il est parti, qui pour cela exige qu'on  
 emploie des moyens analogues à ceux  
 fracture, qui sont l'extension, la contre extension  
 et la rétraction, ainsi il y a cette différence

Dans les fractures, c'est qu'on peut employer  
une force en raison de la résistance qu'on  
éprouve à réduire les, on ne craignant point  
de lacer les parties par les moyens employés  
comme on pourroit le faire dans ces cas.  
Si on ne continue pas plus longtemps dans  
certains cas, ce n'est point qu'on craint de  
blesser les parties, puisque les forces sont  
dirigées qu'on raison de la contraction, mais  
bien crainte de fatiguer trop le malade,  
car il n'y auroit aucun danger à le faire.

Il y a encore cette différence entre les  
c'est qu'on éprouve le de difficulté à réduire  
une luxation, tandis qu'on réduit facilement  
fracture; mais aussi on fait qu'elle est réduite  
les se tient dans la situation où il doit être,  
ce qui est différent des fractures qu'on réduit  
bien et même la plus sûrement facilement,  
mais qui exigent que le malade soit toujours  
dans une position immobilisée à son appareil,  
tandis qu'on emploie souvent pas grand chose  
pour une luxation, si ce n'est qu'il y a une  
peu de repos, des cataplasmes et l'usage d'un  
bandage, mais de peu de durée plus souvent.

Les causes qui s'opposent à ce qu'on réduise les fractures qui  
peuvent réduire les luxations sont de trois espèces s'opposent à  
1<sup>re</sup> le rapport entre nature des parties déplacées qui ne  
qui une fois qu'elles le sont, exigent qu'il y ait une réduction  
puissantes pour qu'on puisse les remettre dans la situation



150

leur rapport naturel, par celui qu'on a vu  
entre elle les parties.

2<sup>e</sup>. Ensuite par la grande contraction on  
trouve les osselets, dont les uns sont tirés  
par le contact de la tête de l'os sur eux, qui  
les irritent un peu; Il est même à remarquer  
que ceux qui se trouvent dans le relâchement  
ont également une tendance à se contracter  
par la disposition où se trouvent les fibres  
musculaires.

3<sup>e</sup>. Par le rapprochement des osselets même  
des parties qui ont donné passage à l'os et  
une fois qu'il a passé, l'os et la capsule  
fibreuse) de la même manière que le fémur  
l'anneau vaginal, qui perce l'anneau  
sortie; Dedans en dehors, et non l'inverse  
Opinion qui n'est point admise de tous les  
Pathologistes, qui avancent par Desaut qu'il  
s'agit d'un de ses jours.

Si on ne pousse point à replacer l'os  
dans l'os situation naturelle, ils restent alors  
où ils se trouvent et il se forme une luxation  
contre nature dans cet endroit.

Examen des Luxations, d'après la  
distinction des os, en allant des os immo-  
biles aux os mobiles. Des Luxations des os

Luxations des os du crâne  
1<sup>re</sup> par l'engorgement de la capsule, de même qu'on le voit  
par l'occipital ne sont point susceptibles de  
déplacements, malgré que Aiston l'admette.

en occ. dans les Maladies Dentes, comme il fait 153  
pour le bon enfoncement, et dans Dents qui les  
espaces cartilagineux qui se trouvent entre eux  
empêchent qu'ils ne se fracturent le plus souvent  
à raison d. ce qu'ils augmentent les dents.  
2. On admettrait plutôt celle des Sacristans posée juste  
avec les temporales, dans le finement de cette position  
portés sur les 1. et 2. qui tendent à écarter les  
Dentures, mais elle se traduit trop bien  
articulée avec les os de la Voûte et occipital,  
pour pouvoir l'admettre, quand à ceux de la  
base du Crâne et de la face ne peuvent point  
en être plus assés. Il faut cependant faire  
exception à ce qui arrive aux os Malacrés  
supérieurs, lorsque de la Maladie appelée  
Bec de lièvre, qui tient alors à la dernière  
Dol. admet bien la lésation des osseux  
du nez entre eux, mais il n'appartient pas  
d'accepter aucun exemple, on ne peut pas en  
plus l'admettre.

3. Quand aux os par implantation qui sont 3. Sac-  
les Dents, elles peuvent être par l'action d'implantation.  
cette, de dents sur elles fracturées, ou  
bien lésées, lorsqu'elles sont fracturées, ou  
ne peut guère en provoquer la consolidation,  
il est même probable que quand même on  
taillerait de en provoquer la consolidation et  
qu'on ne fait point, les portions fracturées  
ne se réunissent pas, parcequ'ils ne serment  
point unies de Dents qui pourraient



1. Les ossements. Lesquelles sont les os, et se  
se faire qu'elles se trouvent encore dans le  
absolues, ou bien qu'elles en soient sorties.  
Lesquelles y sont encore, ou par tache  
de les replacer comme elles étoient, puis  
l'expérience prouve qu'il y en aroit qui  
disseroient 99. aussi solides qu'ils étoient  
avant. Des autres d'autres personnes même  
que celles qui les ont, telles que celles qui ont  
immédiat de Bellus, que l'on a pris de  
mes personnes, dans le moment qu'on a  
les autres et qu'on replace en place. On  
les maintient dans cette position qui leur

+  
Des luxations  
à l'usage  
certaines

Quoique pareille circonstance à arri-  
à ne pas oublier des autres disons, d'après  
le grand nombre de personnes qui en ont  
des exemples, le plus ord. elles sont fixées  
immobiles. ~~Il y a des~~ des os mobiles. +

Second  
10. Secondaire

Le Coccyx qui s'articule avec le Sacrum,  
est susceptible dans certains cas de l'usage, par  
un court, une autre partie à la partie post.  
Du Coccyx ce qui fait qu'il est en arrière, et  
il n'y a pas lieu du temps à cause  
la contraction des muscles relâchés de l'anus  
qui le ramène à sa position naturelle. Il  
peut être encore dans le moment de l'usage  
mais alors il se fait en arrière dans

cas, elles ne sont néanmoins jamais aussi faibles, 3  
 que celles par continuité, par ce qu'il faut se  
 faire qu'elle détermine la Parie, de même qu'un  
 Sacrum, comme nous l'avons dit ailleurs. Dans  
 les os on il se trouve affecté par la Parie, ils  
 se trouvent certains en direction par l'action de la  
 colonne q. s'y implantent et q. agissent d. c. direct. mais  
 il est évident q. la direction n'est pas la même pour  
 les ligaments de l'union du Sacrum avec les  
 os des ilia, les ligaments qui les maintiennent de los sacrum  
 ne sont susceptibles que d'une distension, qui est iliaque.  
 arrive l'q. dans la chute du corps, l'un  
 la plante des pieds, parce que dans ce cas,  
 les articulations inférieures tendent à porter les  
 os des ilia en haut, tandis que d'une autre  
 part le poids du tronc tend à ramener en-  
 bas le Sacrum, par conséquent à écarter les  
 os. Subis entre eux par le moyen de la corde  
 qu'il représente, ce qui donne lieu à une  
 distension des ligaments qui les maintiennent  
 réunis l'un à l'autre. Quand au relâchement  
 de ceux de la symphyse Pubienne, nous en  
 parlerons ailleurs.

Des Luxations des articulations  
 mobiles.  
 1. De celles à surfaces continues, qui  
 comprennent celles de la colonne épinière. De celles à  
 surfaces continues la colonne épinière  
 sont les luxations des Vertèbres, nous en avons  
 très peu de chose à dire, d'après la manière  
 dont elles sont articulées, qui s'y elles peuvent  
 le luxer n'est que la première Vertèbre



1. ~~De~~ la seconde.

Je suis toujours persuadé que les Vertèbres  
Lombaires et Dorsales ne pouvaient de leur propre  
leur mode d'articulation, en ce que d'un pas  
leur corps présente une large surface pour  
s'articuler l'une avec l'autre. De l'autre l'extrémité  
de leur apophyses articulaires et les ligaments  
qui les unissent en devant et en arrière et en  
côté. Mais il n'en a point été de même  
pour les Cervicales, que l'on a vu qu'elles  
pouvaient se luxer, ce qui n'est point qu'on  
présentait une plus grande mobilité dans  
leur articulation. Elles ne sont pas moins  
pour cela solides, car d'un pas elles se  
tiennent comme unies l'une avec l'autre,  
au moyen de leur corps, puisque celle  
du Dorsal pour redonner une sautoire qui  
est extérieurement latéralement opposée  
que celle qui se trouve en devant, qui se trouve  
dans une sorte d'anneau qui les joint  
au moyen de deux petits éminences qui  
surmontent leur corps latéralement. De là  
il faut voir que leur apophyses articulaires  
s'approchent une espèce de base. Les unes  
sont les autres ce qui n'est point. Ensuite elles  
sont fortement articulées au moyen de  
ligaments qui les entourent. Cependant  
malgré tout cela, on voyait les luxations  
des Vertèbres Cervicales, mais le fait est  
savoir si on ne s'en est pas tant aperçu.

par celles de la première sur la seconde, il est  
facile de prouver la réalité.

D'abord, chez les personnes qui sont mortes  
subitement de lésations des Ventricules Corvaires,  
il faut nécessairement que ce soit au moyen  
de la compression de la membrane  
des Ventricules des Ventricules Diaphragmatiques,  
car sans cela la expiration n'aurait pas été  
tant de suite interrompue, vu que le  
Diaphragme recouvrant toujours sabbat  
de contractilité par ses Ventricules, si elles avaient  
eu lieu au dessous de la première avec la seconde.  
D'ailleurs en examinant bien ce qui arrive aux  
personnes qui en meurent lorsque c'est la  
tête ou le tronc qui est fixé, on voit très  
bien que c'est dans l'articulation alvéolaire  
que se passe le mouvement de rotation, ce  
qu'on voit très bien chez les enfants qui sont  
morts d'apoplexie, ainsi l'on voit faire voir de  
leurs yeux fermés, ce qui est infirmement  
malade, nous y reviendrons en parlant des  
mouvements de rotation.

Soit 2<sup>e</sup>. de la luxation des os à surface convexe,  
la luxation est dite en haut ou en bas  
selon qu'elle est de haut ou de bas.

10. Pour la luxation des os qui composent de cette  
ce genre d'articulations, il n'y a que ce que l'articulation  
est dite scapulaire de la clavicule qui est la clavicule  
luxe le plus fréquemment, la luxation  
luxe en haut et en bas.



136 Sans cesse il y a que pendant tout  
qui en a parlé, qui de puis lui en a  
parlé en lui de la remède.  
opinion.  
raisons. Saqui ont été différemment expliquées. D'abord  
la manière d'un physicien qui l'on avait une grande  
attente, d'après ce de tout les expérimentes,  
mais on se trouvait encore les ligaments  
fixant la clavicle à l'omoplate, comme  
l'idée suivante, mais il faut observer avant  
comme il avait gardé la pièce pendant  
quelques temps sans l'examiner les ligaments  
se trouvaient détachés. Lorsqu'il l'examinait,  
il prétendait que la clavicle, ou l'os omoplate  
car on pourrait le dire aussi bien et en quel  
sorte mieux, que la 12. Dorsale se ligait au  
moyen de l'articulation sterno-claviculaire, c'est à dire  
du grand pectoral, qui agissait sur l'acromion  
en manière de levier du premier genre,  
dont la point d'appui est sur l'acromion  
l'épiphysse acromion, la résistance dans  
son articulation avec l'os coracoïde et la partie  
l'articulation sterno-claviculaire du 2. Pectoral, lequel  
agit sur elle au moyen des fibres qui  
s'y fixent, lesquels se prendent sur  
point fixe sur le bras. Mais cette opinion  
est rejetée, en ce que d'une part le ligament  
par lequel résistance s'y oppose, les quels pour  
cela faudrait qu'ils fussent détachés, ensuite  
est que le muscle à trop peu de prise sur

est os.

On a ensuite dit que cela venoit d'un peu  
la contraction des fibres du muscle trapèze,  
qui agissoient sur la Clavicule, dans le moment  
que nous faisons une chute sur l'épaule, en  
prenant l'impulsion sur le cou et la tête,  
lesquelles élèvent en haut.

Pour nous, il nous paroit plus probable  
de penser, que cela se fait au moyen du cou  
imprimé à l'omoplate, qui tend à ce qu'elle  
se porte en dedans et par conséquent à ce qu'elle  
clavicule se porte en dehors. On pourroit  
dire à cela, que ce ne peut être, à cause des  
ligaments, tendons, et Couvres qui s'y  
appuyent, mais ils sont susceptibles  
d'être vaincus par la distension, ou bien de  
rompre, de manière que d'après cela il peut  
y avoir simplement une prédominance de  
l'élasticité de la clavicule, ou bien être  
sortie de sa cavité, c'est à dire admettre  
de la distension ou complète (salvatoire)  
et incomplète.

On la reconnoît à la douleur que la ligne  
allant de l'épaule à l'omoplate dans cette  
partie, à la saillie contre nature de l'articulation  
de la Clavicule, et à la possibilité qu'on a  
de la faire disparaître en portant l'épaule  
en dehors, et en imprimant un point de  
compression sur l'extrémité de la clavicule,  
de l'élever en dedans.  
On y remédie en portant l'épaule en  
dedans, au moyen du bras, que l'on soutient.

Pratiquement



18 par une lanière sans saccote, qui  
sautent au milieu de bande en même  
temps complètes gradées que l'on a pu  
leur l'attribuer. Si la classique, pour y avoir  
une coopération de dehors en dedans, qui  
maintient dans cette situation tant que la  
consolidation n'est point faite.

Second 20 De la lésion des os du Carpe

Vendredi Les os du Carpe ne peuvent guère se lésionner  
d'abord la 1<sup>re</sup> rangée avec le Cubitus, y  
avec la 2<sup>e</sup>, de même que ceux-ci avec  
une fraction des os du métacarpe et ceux-ci entre eux  
ou ne remarque guère que celle du 1<sup>er</sup> os  
du Carpe à une tête assez considérable, pour  
les os de cette partie, supportés par un isthme  
et recue dans une cavité qui lui forme  
le scaphoïde et le cuboïde.

Causés

Ils arrivent dans une chute de plusieurs  
fois fait par les chutes, qui sont les  
motifs de ces lésions, et les os du Carpe  
en sont lésés. Il y a certains individus  
qui y sont plus disposés que d'autres, ce qui  
peut dépendre de la faiblesse des ligaments  
ou la remarque d'abord de l'autre plus ou  
moins une personne.

Lignes

On l'attribue à la proximité que  
forme la tête de la 1<sup>re</sup> rangée, en devant,  
qui disparaît qd lorsqu'on lui imprime  
un mouvement de compression, et s'adapte  
certainement à la lésion de la 1<sup>re</sup> rangée.

Certainement y en a qui s'indie en mettant le parties dans

l'attention, au moyen de la char et de la soie  
bras, qui une fois qu'il y ait un imprimement  
petit mouvement de compression sur la tête de  
l'os. Une fois réduite, on applique dessus  
des compresses et des bandes de bandes, etc.  
réduit un peu et assez facilement.

### 30 De la luxation des os Péronés.

Les Péronés sont tellement articulés avec les  
Tibiaux qu'on ne croit pas trop <sup>commune</sup> un état  
porté sur eux puisse les briser, mais les ligaments <sup>qui</sup> les  
tiennent et du bas qui les retiennent, surtout les  
ligaments fibreux très forts qui se trouvent  
provenant des extrémités inférieures, d'un  
de la tibiaux. Si l'un survient un état etc,  
cela ne peut guère arriver bien que dans la  
renversement du pied en dehors, qui au moyen  
de l'astragale et du Calcaneum appuient sur  
eux, empêche l'effet en haut. M. B. Boyer  
la observe une fois. Les compresses résistent  
appliquées dessus suffisent. L'opération se fait  
plus souvent que dans la luxation.

### 40 Luxations des os du carpe.

On ne croit guère que celle de l'astragale  
sur le scaphoïde, qui est généralement  
ép. d'accidents, qui l'on est 70. fl. ligé  
l'extrémité, car elle se trouve le plus souvent  
liée à celles du pied avec les autres, nous  
en parlerons en traitant de cette dernière.  
On observe point les luxations des os du



Soct. 2<sup>e</sup> Des lésions des os qui  
jacent d'un mouvement de Rotation.

1<sup>o</sup> De celle de la 1<sup>re</sup> vertèbre cervicale.

Cause

Elle arrive quand on dirait, en l'observant  
tête est fixée et le tronc imprimant des  
mouvements de Rotation, tel que q<sup>d</sup> on dit  
un enfant: on le prenant par la tête, on  
vous l'avait dit et qu'on veut le faire  
voir à un grand père. Arrive lorsqu'on  
trouve la tête fixée et que l'enfant tourne  
tête d'un côté ou de l'autre d'une manière  
brusque, pour voir q<sup>d</sup> on a des causes  
de l'un et l'autre exemple. Pour la 1<sup>re</sup> cause  
par j. L. Petit qui dit qu'un puer d'âge  
matureux souffrant de cette manière, il perit  
tout de suite; le père de l'enfant irrité  
de la mort de son fils, fit mourir celle  
à peu près de la même manière, par un  
instrument pointu qu'il lui porta au-dessus  
du col. Pour la 2<sup>e</sup> d'un homme qui mouva  
aussi pour avoir tourné la tête trop vite,  
pour voir q<sup>d</sup> on a.

Voici ce qui arrive dans ce cas, il faut  
se faire que les surfaces articulaires de la  
première vertèbre avec la seconde, ne  
seulement de se correspondre, en passant  
l'une de devant l'autre, on leur impose  
la tête de l'adolescent ne peut pas  
arrêter le ligament transversaire de l'Atlas,

et ne peut produire la mort, tandis que 169  
toutes les fois qu'elle le passe, elle la produit.  
en même temps qu'il faut pour cela qu'il y  
en rupture des ligaments dont certains qui  
sont insérés à l'occipital, qui sans cela  
ne pourraient pas avoir lieu. La mort arrive  
alors par la compression de la moelle épinière.

On peut être certain de la lésion de la  
première vertèbre par la seconde, par les signes  
qui s'y trouvent, par la fixation de la tête de  
ce côté. La difficulté de la ramener à la situation  
naturelle, le défaut de rapport des apophyses  
articulaires, ou plutôt transverses, ce qui est  
point toujours facile à reconnaître, ce qui  
peut y avoir paralyse d'un des muscles  
sternomastoïdiens. De la paralysie et par conséquent  
la tête portée de côté l'oppose.

Si d'après toutes ces considérations, on est sûr d'être certain  
de cette lésion, il faudrait avoir par  
dessus tout un sentiment particulier pour la  
manière de la réduire, puis que l'on a vu  
dit bien, qu'il y aient des praticiens qui  
n'admettent que celle des Vertèbres moyennes,  
et bien même en supposant que cela soit,  
il ne faudrait point craindre de la réduire,  
pourvu qu'on dise qu'on en reconnaît une de la 10<sup>ème</sup>,  
ce qu'on peut en tenter la réduction,  
avant que d'y parvenir le patient, même  
disent que l'enfant mourrait si on tentait  
de le vaincre, parcequ'ils en ont fait l'expérience.



162 *qu'importe en la réduisant à l'état naturel de*  
*Canal thoracique. Si on sembleroit le faire,*  
*faudroit d'abord un peu la tête d'abord presser*  
*en la tirant un peu en haut, puis on la*  
*ramèneroit petit à petit à la situation natu-*  
*relle. Il pourroit se faire que la luxation eût*  
*eu quelquefois le premier cas, c'est à dire q*  
*ue le passage eût eu au-dessus de la*  
*surface articulaire, & que la tête eût*  
*été petit à petit à son état naturel; j'ai fait cette*  
*observation, parce que je voyois il y a deux*  
*ans, une jeune Demoiselle qui sembleroit*  
*avoir tous les signes de cette luxation, mais*  
*son père qui étoit chirurgien, ne voulut*  
*qu'on lui fit rien, et au bout d'un mois,*  
*semaines, la tête à repris sa situation ord.*

90 *De la luxation des os de la main*  
*du Radius et le Cubitus qui composent*  
*l'os de l'avant-bras, sont susceptibles de la*  
*luxer l'un sur l'autre, le Radius en haut,*  
*et le Cubitus en bas. Il est à remarquer que*  
*dans tous les mouvements de flexion et*  
*de supination le Cubitus reste à peu près*  
*toujours sur la même ligne, tandis que*  
*le Radius dans la supination à la tête en*  
*dehors, <sup>est</sup> tandis que son extrémité inférieure*  
*se trouve en dedans. Il est rare qu'il s'élève*  
*jusqu'au-dessus du Radius en haut, à cause*  
*du rebord que lui forme la cavité glénoïde;*  
*son extrémité inférieure va jusqu'au*

basement les temps que l'attribution de l'attribution  
est indolore. Dans la supination le mouvement  
existe. Il a remarqué que la rotation de  
l'attribution supérieure du Radius, lorsque  
le plus en dedans qu'en dehors, malgré que  
Darnay n'en cite qu'un exemple, dans la  
maladie des os et dans l'indolore.

Il a remarqué que ce sort de l'attribution <sup>cause</sup>  
ont presque toujours touchés les personnes qui  
touchent le linge, qui ont toujours le  
Radius de l'un et l'autre bras, inclinés dans  
un sens inverse; jamais elle n'est bien  
que par la proximité de dehors, qui tiennent  
toujours les bras fléchis. <sup>Je n'en ai  
pas</sup>

On les reconnaît aux symptômes de douleurs  
que les malades éprouvent, à la difficulté de  
qu'ils ont de porter le bras dans la  
rotation de la supination, suivant la cause  
ou le trouble de la maladie, à la main  
tourne de côté, à la proximité de la tête  
de Radius en devant ou en arrière, <sup>si</sup>  
n'est point bien naturellement.

On redoit la rotation du Radius <sup>en haut</sup> <sup>continuant</sup>  
en devant ou en arrière, suffisamment parvenue  
à son état un chemin différent de celui  
qu'elle a parcouru, en lui imprimant un  
peu de compression, et en l'éloignant si l'on  
peut en même temps de l'attribution <sup>en haut</sup>  
à luit, que l'impulsion de son autre main, pendant



2076 Il qu'on fait mettre les parties dans l'extension  
Il est nécessaire.

Leçon du 28 Les Luxations des Os de l'avant bras en  
l'indennitaire. Les os sont moins fréquents que celles en  
haut, quoique moins de ligaments les assujettissent.  
De celles en elles diffèrent peu de celles lesquelles existent.  
Les os des Pathologistes qui sont incertains sur  
le nom qu'ils doivent leur donner, à raison  
qu'ils ne savent lequel des deux os de l'avant  
on peut prendre l'un ou l'autre indistinctement  
mais nous pouvons pour dire que c'est le Cubitus  
qui se luxa sur le Radius. Ces luxations  
peuvent se faire soit en devant ou en arrière.

Signes

On les reconnaît par la saillie qui forme  
l'extrémité du Cubitus, soit en devant soit  
en arrière, par la pronation ou la supination  
de la main, en outre l'os de l'avant bras  
existent, que l'on pourroit cependant méprendre  
dans certains cas pour celle en arrière, à cause  
de la prééminence de l'Elle os de l'avant bras.

Traitement

Au lieu d'écarter les os de l'avant  
bras l'un de l'autre, en saisissant le Radius que  
l'un d'eux saisit en même temps qu'on pour  
le Cubitus et que l'on exerce sur l'os de l'avant bras  
un point de compression, finit à l'étendue  
de la main. Les os réduits on fait mettre  
l'avant bras dans l'immobilité en descendant le  
malade sur le bras de sa main surant  
quelques temps, et l'on termine en gâtant  
un linge, dissipe avec les charges répétées  
et les malades. Dans les luxations de l'avant bras

passer au point recommandé au chapitre 163  
De faire d'opres mouvements de supination & de  
pronation empêcher les parties de s'élèver dans  
une rigidité qui empêcherait facilement leurs  
fonctions.

Seet. 3. Luxations des articulations  
qui joignent des mouvements de distraction & d'adduction

les uns, qui compriment les apophyses  
longueurs faciales, à cause de la grande  
quantité de ligaments qui les unissent et qui  
sont composés d'autres tendons.

1. De Celles huméro-cubitales.

Les luxations qui y arrivent sont toujours  
prises comme dépendant de la flexion du  
bras de devant vers l'arrière, ce qui n'est  
pas comme nous l'avons fait présenter ailleurs,  
néanmoins nous ne changerons pas cette usage,  
puisque cela ne fait rien au traitement, puis-  
qu'on sent le bras.

Celles qui y arrivent se font dans trois positions  
l'une, en arrière & sur le côté, pour que celles qui se  
font en devant soient bien, il faut que  
y en rupture de l'apophyse iléale, ce qui  
n'est point été observé jusqu'à présent.

1. Celles en arrière sont les plus fréquentes,  
puisque pour qu'elles aient lieu sur le côté  
il ne faut rien que y ait tous les ligaments  
qui maintiennent les os réunis ensemble,  
laquelle arrive cela ne lui qu'en manière  
de l'écarter du premier genre, dont la plus commune



166 Le bras sur l'articulation supérieure de l'humérus  
déterminée par le point du corps de l'os, de sorte  
et que dans une chute, l'os se peut briser  
Cause et briser dans l'articulation, au moyen de la  
cavité glénoïde du Cubitus, où se trouve appu-  
l'articulation de l'humérus, et la proximité  
représentée par les ligaments antérieurs de  
l'articulation qui se trouvent le plus souvent  
de briser, en même temps que les fibres antérieures  
du Muscle brachial se trouvent comprimés,  
de même que celles du Biceps, qui en se contractant  
par cette cause, tendent à ramener le bras  
bras dans la même flexion, après que l'os  
surface de l'articulation inférieure de l'humérus  
a glissé sur l'apophyse coronoïde du Cubitus.

Signes

On la reconnaît par ce qui est arrivé au  
Malade, par le défaut de rapport de l'apophyse  
olécrane et des tubérosités de l'humérus qui  
se trouvent dans un sautoir à peu près égal,  
par la présence de l'articulation de l'humérus  
devant l'apophyse coronoïde du Cubitus,  
l'apophyse olécrane de derrière en arrière de  
celle-ci, qui est très plus élevée dans l'état ordi-  
naire, qui peuvent être confondues jusqu'à un  
certain point pour la fracture, mais qui  
ne méritent ce point, en sachant qu'on peut  
fléchir le bras lorsque cette épine  
qu'elle présente lorsque l'os est en intercal  
dans la cavité et une cavité au-dessus  
d'elle, qui n'a point lieu l'étant.  
Lorsque l'apophyse olécrane de l'os de l'avant bras

sur le bras sont examinées en arrière; et l'on y  
les verra, Il y a en principe plusieurs  
moyens, d'abord l'opérateur se tient d'abord  
de l'un des côtés, qu'il place dans le bras  
du bras du malade, l'autre y étant, il  
s'assure la main correspondante au bras  
malade, au moyen de l'autre main  
appuyée à celle dont le coudé repose sur le bras  
d'assistance de l'un des doigts qu'il fixent sur  
cette du malade, mais cette manière est  
abandonnée maintenant on est insister  
sur le corps cylindrique que l'on place  
dans le bras du malade, tel qu'un  
morceau de bois rond, qui est également  
abandonnée, à cause de la manière d'un  
humérus se trouve quelquefois par l'opérateur  
Coronarius de Calulis. Maintenant on fait  
paro cela, la contre extension que l'on exerce  
sur le bras, l'extension sur le bras, que l'on  
donne à faire des aides, en même temps  
que le chirurgien tâche de produire la  
capitation en éloignant les os qu'il tient  
possible les deux os, en exerçant une pression  
sur l'opérateur oblique, ainsi qu'un  
l'extrémité de l'humérus en des contraires,  
est à dire de haut en bas.  
2. ~~Extension~~ l'extension. Les causes de l'extension? en dedans  
ne peuvent venir être reconnues, par la et en dehors  
proximité, quelques os de la main bras d'un ligament  
côté et l'humérus de l'autre, qui se font



166 Au moyen du détachement de l'articulation  
appelée au existentielle la partie, les quilles sont  
toujours incomplètes lorsqu'elles ont lieu. Dans  
quelques cas qu'elles se fassent il y a toujours rupture  
Des ligaments latéraux.

Pratiquement lorsqu'on est sûr qu'elles existent, il faut  
les réduire, ce qu'on fait en mettant les  
parties dans l'extension au moyen d'un bandage  
qui sert à faire l'extension puis du bras  
sur le quel on fait la contre extension, on  
tient même, en passant une lague sous l'aisselle  
du côté des os, que les parties sont  
dans l'extension. Le chirurgien fait parevenir  
aux os, un chemin contraire à ceux qu'il veut  
parevenir, au moyen d'une pression qu'il exerce  
sur eux en sens contraire. Il surpasse  
un gonflement par la suite, antiche de la  
diffusion au moyen des répercussions et inévitables  
joint au repos. Il faut toujours lacher  
les réduire le plus possible, parce que plus  
on est sans les réduire, malus elles sont faites  
par la suite.

Secum du 25  
Vendredi

2<sup>e</sup> De Colles de la suture osseuse

Cette articulation résulte de la réunion de  
l'extrémité inférieure du fémur avec le tibia  
et de la rotule.

De celles de la Rotule.

Il est d'usage qu'on peut se lever de deux manières, premièrement  
sans cause apparente, et l'autre produit par  
l'action des corps extérieurs.

On a vu certains individus chez qui la rotule 169  
se lève aussitôt que la personne se lève  
quelques mouvements plus forts que d'ordinaire, ce  
qui peut dépendre d'un relâchement du ligament  
à l'état, qui lorsque cela a lieu elle arrive  
subitement. On y remédie bien en employant  
des moyens qui conviennent, mais elle reprend  
aussitôt la forme vicieuse lorsque le malade  
étend la jambe, d'autant que les efforts qu'on  
fait pour y remédier sont insuffisants, et  
cependant la personne que j'ai vu faisait  
garder le repos au malade dans son lit pendant  
des semaines ou deux mois, que j'ai vu avec  
compression de chaque côté de la rotule, également  
de côté ou de l'autre à la fois, qu'on s'y oppose.  
C'est Boyer je crois très fort, qui m'a  
dit à la clinique, qu'un malade du genre  
de cette maladie, s'est très bien trouvé d'une  
enveloppe qu'il lui avait ordonné, qui tenait  
fixe la rotule).

Mais elle peut aussi être lue par un  
cancer porté sur les parties latérales, qui suivent  
la cote sur laquelle il agit, produisant une  
luxation en dehors ou en dedans, qui est toujours  
opposée à celui sur lequel il a été appliqué. Les causes  
on a remarqué, qu'elles arrivent plus d'un  
en dehors qu'en dedans, d'autant que l'on  
peut trop la cause, qui peut être tirée  
la manière. On a vu sur lequel ont frappé  
les corps qui se produisent. Lorsqu'il y a  
lieu la rotule ne peut guère affecter qu'une



170 Direction oblique, c'est à dire ne présentant que  
partie de sa face postérieure, soit en dedans  
ou en dehors, suivant le côté de la luxation,  
et non l'avant en devant, tandis que la face  
antérieure serait en arrière, comme s'il s'agissait  
d'un membre

Lignes On reconnaît la luxation en question par  
le moyen de la douleur que le malade à  
l'épave de son et dans le sens duquel il a le  
pote son legume, puis enfin à la compres-  
sion du genou, qui a la rotule inclinée d'un  
côté à l'autre côté.

Traitement Au lieu de la phatule dans la position  
naturelle, on la fait passer par le bras, en la  
différent de celui qu'elle a parvenue, celui  
imprimant un mouvement de compression  
qui une fois qu'elle est au lieu maintient  
en tenant la jambe dans l'extension, on fait  
garder au malade le lit et applique des  
résultats sur le genou dans le cas d'épanche-  
ment sanguin ou d'engorgement.

De celles du Tibia mobile.  
Les luxations qui se font au tibia mobile  
sont moins fréquentes que celles  
de l'avant bras. Le bras est rare  
tant par rapport à la largeur des surfaces  
articulaires, que par les ligaments nombreux  
qui affermissent ces os. Elles peuvent aussi  
arriver bien au devant ou en arrière.

car pour cela il faudrait qu'il y eût un déchirement 173  
des ligaments croisés et des latéraux pour  
celle en devant, ce qui ne pourroit se faire  
sans qu'il y eût un grand déplacement d'anté-  
postériorité et une extension excessive des  
muscles poplités, de même que J. S. Vaishan.  
Ils ne pourroient point non plus se faire en devant,  
non seulement pour la plupart des causes citées,  
mais encore pour cela, il faudrait que les  
surfaces articulaires du fémur glissent en arrière,  
qui ne peut se faire à cause du contact du  
tibia contre le fémur du côté opposé, qui  
supposerait que la fémur ne se fléchit trop.

Même si on suppose que latéralement, qui  
pour avoir lieu il faut qu'il y ait rupture  
des ligaments latéraux, qui auroit été vu que l'absence  
des autres fais, les quels recannoissent  
toujours pour cause, l'action des corps cœlés.

Si elles existaient, il seroit facile de les  
reconnaître par la proximité d'un des ligaments  
au-delà du fémur d'un côté ou de l'autre, ce  
qui indiqueroit le sens dans lequel se trouvoit  
la lésion.

On a demandé lorsqu'on croit qu'il y a un  
faux anévrysme ou bien les réduire. Il en  
est qui ont dit qu'il valloit mieux amputer  
sur le champ, pour prévenir les accidents qui  
en résultent. Mais l'opération à confirmer  
qu'il faudroit mieux les réduire au lieu qu'il



De pareille maladie, sans pouvoir en être en-  
amputé, ce qui se fait également par la  
suite de l'infirmité, l'indolence qui est  
trop considérable et qui cause l'aggrava-  
tion de tout le membre, que l'on tâche de  
dissiper avec des moyens couronnés. On  
réduirait les luxations en faisant passer le  
bras, sur un chemin différent de celui qui est parvenu  
après qu'on a forcé le bras le membre dans  
l'immobilité joint à l'emploi des stupéfiques  
couronnés.

Scol. 4. Des Luxations des  
articulations qui ne jouissent que des mouvements  
de circumduction et d'opposition.

1. Des Luxations de la mâchoire  
inférieure.  
Elles ne peuvent se faire qu'en devant ou en  
arrière, ainsi que sur les côtés; de l'avant par exemple  
en arrière les condyles qui se trouvent ne peuvent  
glisser à cause du choc de l'apophyse stylo-  
moyenne de l'os de la mâchoire à cause de la résistance de  
l'apophyse épinoïde de l'os occipital. Lors qu'elle  
est bien en devant, les condyles passent alors  
sur la racine transverse de l'apophyse styloïde  
qui ne peut avoir lieu que dans son abaissement.  
Elles ne peuvent point avoir lieu chez les  
enfants à cause de la direction oblique  
de l'os occipital de la mâchoire, ce qui  
fait que les condyles sont toujours dirigés en arrière.

puisque pour arriver bien, il faudrait que sur 173  
l'angle d'insertion sur le corbe de 90 degrés  
chez eux, tandis que chez les adultes il s'élèverait  
guère que 40 au 45. Il y a des personnes chez  
qui il entre une autre disposition à ce qu'il se  
fasse, soit que cela dépende du relâchement  
des ligaments qui entourent l'articulation, ou  
bien du peu de profondeur de la cavité  
glenoïdale, qui loge le condyle de la mâchoire,  
ou bien par le peu de hauteur de la racine  
transverse de l'apophyse zygomatique, ou  
par une autre cause. Dans ce cas.

Elles arrivent tantôt par des causes venues  
du dehors, soit qu'on se soit porté malade  
à la mâchoire, lorsqu'elle est bien plus abaissée, ou  
bien par une cause que les communications  
des os du crâne les quels ont fait 99. une  
chute. D'autre fois cela dépend d'une cause  
interne, qui est la contraction musculaire, lors  
du baïlllement, dont les dents griffent & qu'elles  
sont déterminées par les muscles abaissés  
les autres les élèvent. Elle arrive sq. encore  
lorsqu'on place un corps entre les dents d'un  
côté, & l'autre sq. serré fortement les mâchoires.

Ces gens qui ont dit qu'elles arrivaient bien de la  
par l'action musculaire, les ont dit qu'elles à la  
étaient produites par les muscles élévateurs, long. opinion sur  
après qu'ils mâchoire s'est abaissée dans le cas  
humidité au l'apophyse avancée tenait



174 Reinmann Malaise, laquelle lui servait de  
point d'appui, mais dans aucun cas elle ne  
tauche, ce qu'on peut même se confirmer  
par l'un ou y portant l'oeil, car l'un tout en  
interprétant, etc. etc, telle était l'opinion de  
Malaise et la manière dont ils les expliquent  
et devant dans ses dernières trépas qu'il avait  
embrassé, l'on qu'elle est fautive.

Il s'agit l'explication dans une manière  
qui se trouve parmi une délicate de l'histoire  
au moyen de l'action du muscle tempora-  
re contraction, lorsque la mâchoire inférieure  
a été d'abord abaissée, qu'il explique l'angle  
de l'angle droit qui forme la ligne de  
suppression de l'apophyse, qui a lieu lorsque la  
mâchoire est un peu abaissée, qui alors se  
contractant dans le mouvement que l'angle est  
dirigé en arrière, et les condyles en devant et  
la trachée transverse de l'apophyse zigomati-  
que passent par dessus et la lésion à l'angle  
Mais cette opinion pêche en ce qu'il n'y a pas  
que ce soit l'usage qui commence à l'œuvre,  
puisque il y a encore l'usage temporaire et  
phlogistique de chaque côté, puis ensuite qu'il  
n'est pas possible de penser qu'il  
par l'action des abaisseurs qu'elle a lieu, ce  
n'est alors l'usage de l'apophyse.

Ce qui prouve l'opinion qu'on a alors,  
est que le rapport des Malades, est dans  
l'instant même de la lésion qu'il a lieu.

éprouvent la difficulté de la mastication, 175  
ansuages de ~~la mastication~~. Les muscles sous la  
machoire, dont la puissance se trouve à l'extrémité  
de l'os, la résistance à son extrémité et la  
puissance d'appui à sa cavité. Je n'en ai pas  
le sentiment à la vérité. De cette opinion, M. Hille  
en a parlé aussi il y a quelque temps; les  
muscles qui l'opèrent sont ceux qui se trouvent  
au-dessous d'elle; et qui sont attachés à son  
extrémité.

Une fois qu'elle a lieu, les os de la  
machoire se trouvent au-dessus de l'apophyse Signes  
transverse de l'apophyse zygomatique, au même  
temps qu'elle se trouve accompagnée de douleur,  
par la pression des os et temporaux profonds,  
ainsi que de la part des muscles pinnaires  
supérieurs et des abducteurs, au moyen de l'écailleur.  
De leurs fibres, au même temps que les fibres  
cartilagineuses suivent le canal.

Lorsque la lésion a lieu des dents  
ou la ramène à l'impossibilité qu'à l'état  
à fermer la bouche par le défaut qu'à la  
machoire de s'ouvrir, à l'aplatissement des  
joints, qui sont osseux au moyen de l'écailleur  
des os, à la suite de l'aplatissement de  
la bouche faite de pression latérale à la son  
pression des os de la mâchoire, lorsqu'  
y sont les doigts. Pour les signes la fait  
pression joint du côté sur le menton  
ou bien une chute sur lui. Lorsqu'elle n'a  
rien qu'un côté, la mâchoire est guérie.



176 On celui opposé au elle à lieu et amener  
que d'un côté l'abaisse des coudils.

La non réduction de la mâchoire supérieure  
prouve la mort du collade, comme Hippocrate  
l'aurait dit, en disant qu'un jamais les coudils  
ne se établissent, ce qui n'est point, puisqu'ils  
coudils se creusent une cavité dans le lieu qu'ils  
occupent, et ils reviennent petit à petit, mais  
en faisant observer seulement que la mâchoire  
lorsque la lésation n'a lieu qu'un côté qu'elle  
se trouve toujours inclinée du côté opposé  
et que les dents qui ont habitude d'être usées  
dans un sens, l'étant au contraire dans l'autre.

C'est pourquoi

La lésation - comme il faut la réduire,  
Il y a différents procédés pour cela, au lieu  
d'abord anciennement on avait l'usage de la machine  
afin de faire glisser les coudils sur les <sup>os</sup> ~~os~~  
transverses de l'apophyse zygomaticque, ce qui  
peut être suivi de la fracture de ces os  
coudils, puisqu'il faut se faire que par la  
résistance qu'on leur imprime au moyen  
du cord, que cela ait lieu. On pourroit faire  
ensuite comme le Dr. la fait, placer entre  
les arcades dentaires un morceau de Bois, au  
moyen du quel il se retireroit de point d'appui  
à la mâchoire inférieure, ce qui lui feroit  
représenter une espèce de levier du premier  
genre, dont la puissance et la résistance se  
trouve aux ~~os~~ <sup>os</sup> ~~os~~ <sup>os</sup> tandis que le point d'appui  
est au milieu, ce qui est bon à employer  
lorsque les os sont fortement courbés  
et qu'ils présentent trop de résistance pour passer

faire la réduction.

Le moyen le plus préférable pour guérir le  
point de raison pour employer ce dernier moyen,  
est de se servir d'une dent propre, que l'on a  
enveloppée de linge, crainte que les dents ne  
se frottent trop les uns contre les autres d'aut voir  
la manière de se prendre. Vous introduirez  
les deux dents dans la bouche, que vous appliquerez  
sur chaque arcade dentaire, qui y étant placée,  
ou l'une imprimera un point de compression  
pour abaisser la cavité, qui une fois qu'elle  
se trouvera dégagée de l'indurité qu'elle occupait  
au fait d'extension un léger mouvement de  
la langue à la mâchoire pour pousser la  
denture en bas, pendant qu'elle pousse la  
arrière pour faire parvenir la cavité dans  
cette cavité, qui une fois qu'elle y sera, on  
a soin de dégager des doigts ou d'éloigner,  
crainte d'être serrés entre les dents, au moyen  
de l'action des muscles qui agissent aussitôt  
et qui replacent les parties dans leur situation  
naturelle.

Lorsque la lésion est évitée, il faut  
avoir soin de recommander au malade de  
ne point faire de grands balancements, de ne  
changer que des postures peu assistantes,  
pour empêcher la récidive, car dans cela  
on a vu des personnes chez qui elle s'est  
fait voir de nouveau. Il faut en même temps



178 Appliquer un bandage et les moyens convenables  
2.° Des luxations de l'extrémité  
sternale de la clavicule.

Rarement elles sont liées, malgré les grands  
mouvements dont sont susceptibles l'épaulé,  
qui se trouve au nombre des ligaments  
qui tiennent invariablement la clavicule avec le  
sternum et avec celle du côté opposé.

Elles ne peuvent se faire qu'en devant ou  
en arrière, et non sur le côté et en bas, malgré  
ce qu'en ont dit quelques Pathologistes. C'est  
en devant qui est également lié et exerce  
cette en arrière, ce qui est heureux, car lorsqu'il  
y a lieu le malade pourroit en être suffoqué,  
à cause de la compression de l'artère aorte  
de l'artère carotide, de la veine jugulaire et  
l'œsophage, par la pression de la clavicule  
en bas.

Causes

Les causes qui la produisent sont, soit  
la pression très forte de l'épaulé en avant  
sur celle en devant, ce qui se passe un  
bandage avec la tête au moyen d'un  
qui appuyant sur un coussin, elle l'a  
placée en arrière, alors voulant la retirer  
gêta en devant et les épaules furent portées  
en arrière, qui donne lieu à une  
luxation de la cause ici agit avec d'autant  
plus de force que la puissance est plus  
faible de la résistance. Celles en arrière

à peu près dans l'axe opposé, dans une <sup>179</sup>  
et se produisant par conséquent partie d'une la  
partie antérieure de la clavicule, qui agit  
proche son extrémité sternale, alors se passe  
en arrière.

Les ligaments aux quels on les réunissait cette ligament  
présentent deux terminus indépendants qui ont une  
nature, fournis par la présence de l'extrémité  
de la clavicule, pour celle en devant et l'autre  
à l'arrière pour celle en arrière. L'épaulé est souvent  
un peu rapproché des côtes, le malade  
est dit de Douleur dans la partie, qui se trouve  
d'ailleurs annoncée par l'annonce par l'inspection  
de la partie. ~~Soit~~ celle en arrière elle se trouve  
généralement accompagnée de difficulté de respirer etc.

Ces espèces de luxations se connaissent, et sont  
annoncées par le séduire le état du pectoral,  
surtout pour celles en arrière, à cause de la  
suffocation qu'elle peut causer. Pour  
connaître celle du devant, il faut celle en arrière  
il faut toujours porter l'épaulé du côté où  
existe la luxation, en même temps que l'on  
exerce un point de compression sur l'extrémité  
de la clavicule, du côté de son union avec le  
sternum pour celle en devant, en qui fait  
rentrer la partie déplacée à sa position  
naturelle. Comme cela ne suffit point  
que la luxation persiste, on emploie  
le bandage de ~~Devant~~ de l'arrière quand on la  
fracture, au moyen de crochets et d'un



180 Caput; ce qui fait que la partie supérieure  
trouve l'égale en dehors, par l'accommodation  
de l'os sur l'articulation inférieure de l'os.

Second 40. Des Luxations du Poignet.  
L'os du poignet se loge dans quatre. Sans Différence  
de l'os, en arrière et en devant; et  
Déplacement n'arrive jamais dans des mouvements  
ordinaire. Mais bien dans une force et par  
une cause mécanique.

Cause Elles en arrière arrivent. Dans le mouvement  
qu'une personne nous fléchit fortement la main  
lorsque nous tenons l'os de la main de l'autre  
ou bien lorsque nous l'avons appuyée contre  
nous et qu'une personne agit sur le bras  
de manière que son effet est transmis au poignet  
sans elle en devant au contraire, à l'inverse  
nous tenons sur la paume de la main  
quand nous nous en servons, elle est  
lorsque la main est fortement portée devant  
après.

Signes On reconnaît ces sortes de luxations, par  
l'apparence que fait le malade d'arriver  
sur la main d'arriver au bras, par la  
proéminence des os du carpe du côté de la  
luxation par la difficulté que le malade  
de fléchir, ou d'étendre, ou de porter la main  
dans le bras, à la douleur qu'il en  
ressent; et est à remarquer qu'il paraît  
que l'os se trouve par elle en devant,  
la cause des lésions qui se trouvent devant  
ligament annulaire des tendons du carpe.

L'apex de la rotation des os, il faut avoir 81  
soit de faire la réduction possible (certainement)  
à cause des gonflements qui surviennent, qui se  
font au moyen de l'extension, que l'on fait.  
avec une main en tenant celle malade, tandis  
que l'autre au produit la coaptation, en même  
temps que l'on fait la contre extension sur  
l'autre bras, que l'on fait en portant la partie  
déplacée, en sens contraire du chemin qu'elle  
a parcourue.

Une fois réduite, on tâche que le malade  
ne fasse point de mouvement avec la main,  
qu'il la tienne dans le repos, sur la quille  
employée le représentant et en évitant par la  
suite, pour prévenir le gonflement, lorsque  
les malades commencent à se servir d'elle  
on ne doit pas leur en garder, parce que  
l'extension est devenue plus gênante à se  
représenter de nouveau.

H. Des luxations des os du  
Métacarpe et des phalanges.

Le premier os du métacarpe peut se luxer  
sur les troisièmes, dans l'extension trop ou dans l'extension  
forcée du ponce en devant, puis en arrière.  
Dans la grande flexion, on peut tomber dans d'autres causes  
qui agissent très fortement dans l'un et  
l'autre sens.

On les reconnaît en deux espèces de luxation  
à la mauvaise conformation de cet os du  
pouce, qui forme un angle droit avec le  
sigar.



De Coarpe, puis parvint et arriva au Malak  
Craintant d'être comédien en faisant une attention  
le prince, en même temps que lui approuva  
son caractère de lui l'empereur  
De Coarpe, puis parvint et arriva au Malak

Les premières phalanges qui s'articulent avec les os du métacarpe, ne peuvent qu'en laper, au du moins les esquilles se lèvent, et le font être moins que le premier os du métacarpe. Les esquilles arrivent, elle ne peuvent se faire qu'arriver au lieu où devant. Au vu les os du premier métacarpe, à cause de la présence de l'os du premier de la main.

Les causes qui y donnent lieu, sont les  
chutes sur les doigts et la jamme de la chape.

On les recouvrait par la présence des  
des premières phalanges du côté de l'os  
de la chaîne.

De la main.  
 Au premier par l'extension des doigts, et  
 traitement contre l'extension de l'avant bras, et par la  
 compression au moyen de la compression  
 l'un coince l'autre. C'est la circonstance  
 chez les quels avec plus ou moins d'infirmité  
 résistive, au moyen de l'eau ou d'un bandage  
 à l'usage d'une fois. De l'autre de l'opération  
 faire une incision derrière l'extension de  
 la phalange inférieure pour introduire l'écaille  
 dans l'articulation entre la phalange et les os de  
 l'articulation, afin de l'écaille de l'articulation et la  
 ramener à son état naturel, que le doigt  
 à se fuser et qui s'est contracté.

Les autres espèces de phalanges  
à refuser et qui sont  
Grandes autres phalanges des  
cavités des articulations (un seul point)

ou du moins si elles arrivent, elles embrandent  
celles des Dégâts. quelque peu ailleurs, elles  
viennent bien que dans une extension forcée.  
Après rémission après les avoir enroulés, ce qui  
est facile de voir, au moyen de leur extension  
après quoi on replace leur extrémité dans  
leur rapport naturel.

§. 2. Des Luxations des Pieds. Secundo  
Le pied peut se luxer dans quatre sens différents ; Indication  
en dedans & dans une extension forcée.  
Lorsque le pied est pris dans un état et que  
le tarse est porté en arrière, en arrière  
également prononçation forcée, tel que pour  
le cas précédent. Il peut se luxer en dedans,  
dehors lorsque le pied est porté en dedans,  
puis en dedans lorsqu'on le traîne il est porté en  
dehors. Elles arrivent plus fréquemment en dedans  
proportion à la longueur du Péroné qui  
empêche que le pied ne se porte aussi facilement  
de côté qu'en dedans, ou que l'humaine  
forme du tibia est moins longue. Dans  
l'un et l'autre de ces deux circonstances, le Péroné  
éprouve un effort considérable de la part de  
l'astragale, qui est prise en dehors, dans la  
luxation de côté, tandis que dans celle en  
dedans appuyant sur son extrémité il peut  
lui causer une luxation de son extrémité  
supérieure avec le tibia. D'où vient que  
après cela il peut y avoir deux luxations  
en même temps du tibia diastasis et fractura  
du Péroné. Dans quelques cas qu'il y ait lieu



184 Il y a toujours un traitement considérable  
des ligaments, qui tiennent le pied avec la  
jambe, par une grande quantité, au il y a  
en général facile de reconnaître les  
signes de luxation, par celui qui est arrivé au  
état de, puis par l'inspection des parties, et  
reconnait celles enlevant, par l'augmentation de  
la partie antérieure du pied, joint à une tumé-  
faction de la jambe, formée par l'abaissement  
à la diminution du talon. Celles en arrière  
tous les signes, opposés aux précédents, sont  
celles en dedans, par l'abaissement du pied  
d'abord, et le creux sous la malade interne  
quand enfin celles en dehors par également les  
opposés à cette dernière.

Traitement La luxation de luxation qui est existante  
reconnue, il faut savoir quel partie que l'on  
prendre, puisqu'il est des pathologistes et  
que le faisant fût, qui disent que l'ardeur  
luxation du pied, il faut amputation  
jambe de préférence que de la réduire, par  
prévenir les accidents qui arrivent surprenant.  
Mais il est à remarquer que ces accidents  
l'on craint, ne surviennent pas toujours,  
on est chez qui on croyait qu'ils survien-  
nent, et qui cependant n'en ont point arrivé.  
C'est que quand ils arrivent, qui est l'égale  
inflammation, souvent n'est point considérable  
et qu'il totorum est fort heureusement,  
qu'il peut même guérir au la sue dans  
cas au il arrivait, se terminera par supp-  
qui celle-ci finissant produire une atrophie  
malade de l'atrophie par cela, ce qui est



préférable à une amputation, & grand bien 185  
même l'engorgement qui survient, deviendrait  
très considérable, qu'il nécessiterait l'amputation,  
il serait temps de la pratiquer alors, de manière  
que quand il donnerait lieu à la gangrène,  
lorsque celle-ci seroit limitée, de manière qu'il  
est généralement admis de ne point amputer,  
et de réduire la lésion de préférence.  
On la réduit en mettant les parties dans  
l'extension et la contre-extension, au moyen du  
pied et de la jambe, en même temps que la  
chirurgie prévient la coaptation.

Si étant réduite il survient un gonflement  
considérable, il faudroit employer les moyens  
éprouvés pour le combattre, en même temps  
que l'on fait usage de l'appareil de la fracture  
de la jambe, pour maintenir le pied dans  
l'immobilité et empêcher qu'il ne se porte  
dans une autre direction, parce que sans cela  
il pourroit se faire que les parties contractassent  
une mauvaise habitude et que le malade tombât  
estropié. Il est bon dans pareil circonstance  
d'examiner s'il n'y a point de fracture du  
péron, parce que si elle existoit, il faudroit  
y remédier, en même temps que l'on auroit  
soin de porter le pied en dedans, comme  
nous l'avons fait observer dans sa fracture,  
crainte qu'il ne survienne une luxation  
consécutive, au moyen de l'action de l'os  
si l'on n'a pas soin de le malade qu'il  
il ne faudroit point s'attarder quand il survient  
un gonflement parce que cela arrive presque  
toujours.



Il est de cas au Castrol de...  
fluxion avec le scapula, tel qu'il arrive  
dans une forte contorsion du pied, dans  
l'adduction & l'abduction que l'on réduira  
portant le pied sur une surface dure de sorte  
à se tenir par là, en même temps que l'on  
fait exercer une extension et une contraction  
ainsi que l'on exercerait une pression sur  
partie. On a vu cette luxation exister  
celle de la jambe, qui par les accidents qui  
surviennent décide d'abord à pratiquer de  
incisions autour de l'astragale, de couper les  
ligaments qui l'attachent au tibia & au fémur  
et de l'exciser, lequel pratiqué trois fois  
cette opération, qui lui rendait tant de  
puisqu'il est mort une femme à la suite  
qui mourut dans un mois après.  
l'opération, mais d'une autre maladie, se  
peut-être une tumeur du tibia avec l'astragale  
Il paraît que cette opération avait été  
pratiquée par l'exciser le tibia, sur une incision  
qui guérit également et qui peu de temps  
après, lequel portait les os en l'air dans la poche

Leçon du 28  
Vendredi

Section 5. Des Luxations de la

jointure de l'opposition Vague, de la  
circumduction et de la rotation.

1.° De la scapula humérale.

En examinant cette articulation, on voit  
que tout est disposé chez elle pour résister  
les luxations de l'humérus, l'os de la main  
glénoidale qui lui forme l'implantation est



superficielle, ce qui fait, que la tête de celui 87  
est très peu saillante, le ligament capsulaire  
qui l'entoure est très lâche, puis l'humérus  
se trouve être exposé à l'action des corps étrangers.  
Cependant l'humérus n'est point encore autant  
fréquent qu'on pourroit le penser,  
parce que comme l'omoplate joint de son  
manuscrit cela empêche la disposition on  
se trouve l'articulation.

Quoique c'est dans cette articulation que  
les lésions sont les plus fréquentes, les  
pathologistes n'en ont pas cependant encore  
bien accordé les lui ni elles ont bien d'une  
manière déterminée s'accommode au sacro-  
généralment maintenant à en admettre de Cumbrin plus  
trois espèces, 1<sup>o</sup> celle en bas, dans la saignée  
qu'elle la tête de l'humérus se trouve sur  
la côte de l'omoplate que l'on peut appeler  
axillaire, 2<sup>o</sup> une en dehors sous la cote  
de l'omoplate, qui peut être appelée sous-épaule,  
3<sup>o</sup> une autre dessous l'omoplate, sous l'humérus  
sans sa capsule, que l'on peut nommer sous-axillaire.  
Il y en a bien encore une autre qui se  
fait en haut que quelques pathologistes  
admettent, qui pour ainsi dire il faudroit  
qu'il y ait fracture de l'apophyse coracoïde  
et acromion, à cause de l'apophyse de l'omoplate  
quelles forment à la tête de l'humérus, exp.  
Desant dit l'ancien vu une fois, sans doute  
cela ces mêmes apophyses se sont fracturées  
dans la quelle ulnule avoit passé un os



1788. L'apophyse Coracoïde.

De ces trois espèces de levatrices admet-  
tantes on se peut passer aussi fréquemment  
est l'axillaire qui a lieu le plus souvent, et  
ensuite la sous-scapulaire, puis la sans épaule  
mais rarement celle-ci à elle. Il est des gens  
qui prétendent que pour qu'une levatrice ait lieu  
il faut que l'humérus soit en position  
supérieure.

Cause

Dans quelque sens que fassent les levat-  
rices ne peuvent jamais avoir lieu que par  
l'action des corps extérieurs et par l'action  
effusculaire, mais le plus communément par  
l'une et par l'autre en même temps. Il est  
qui agiraient peut-être que celle en bas puisse avoir  
lieu par l'action des corps extérieurs, à cause  
de la position que leur forme l'apophyse Cor-  
acoïde et acromion; mais il n'en est point de même  
pour celles qui ont lieu au moyen de ce  
que l'on saisira par la main, pour un mou-  
vement en avant, ou levant un libre; elles  
peuvent également être déterminées par l'action  
du grand pectoral et grand dorsal, lorsque  
le bras est fortement étendu du tronc  
l'action de Deltoides. Elles ont lieu en de-  
hors lorsque le bras est étendu du tronc  
que nous tenons dressés, alors la tête de  
l'humérus se trouvant sortie de la cavité  
l'action des grands pectoral et dorsal  
entraîne dans la fosse sans scapulaire  
celles au contraire en dedans et que nous  
le bras est porté en dedans et que nous



tambour de bois, qui se trouve entraine par  
l'action du grand rond et petit rond et les  
épiners.

Dans ces luxations il y a toujours un  
déchirement du ligament capsulaire, malgré  
que Desaut disait en arriant l'os qu'il y en  
a, mais cela est trop difficile à croire  
ou, mais cela est trop difficile à croire  
pour pouvoir l'admettre, qui d'ailleurs ne  
peut point être vu, qui dans pareil circonstance  
elles pourraient être qu'insupportables.

Le lieu qu'occupe la tête de l'humérus dans  
chaque espèce de luxation, est pour la luxation  
sur la cote de l'omoplate, entre le petit rond  
et le sous-épineux d'une part, puis entre la  
longue duiceps de l'autre. Dans la sous-épineuse  
entre le tendon du sous-épineux et l'omoplate,  
que la tête de l'humérus à un peu détachée  
de l'os, et non sous le grand pectoral comme  
que pathologistes l'ont dit. Dans ce dernier cas  
se trouve sous l'épine et le muscle sous-épineux  
pour elle en haut, rapportée par devant,  
comme elle n'est que très peu élevée, puis que  
ce grand pectoral, ne l'a en effet que quinze fois  
ou ne peut guère assigner l'endroit, par lequel  
que si la tête de l'humérus à partie des l'apophyses  
coracoïde, qu'elle est venue se placer à la  
partie inférieure.

On reconnaît qu'il y a une luxation dans  
l'articulation scapulo-humérale, par la douleur  
ressent le malade, par ce qui lui est arrivé;

Signes



199

par la difficulté qu'il a de nous voir le mal  
que cela pourrait tenir encore à d'autres os  
que le malade sentait avec la main d'acier  
apposée, le quel est toujours un peu incliné  
du côté affecté, en même temps que tout  
se troussait à l'aise de son tronc, à la dépression  
que lui restait en portant la main ~~dessus~~  
l'épaule, laquelle présente une enfoncement  
qui n'a point lieu dans l'état naturel. Après  
l'annonce en gémissement <sup>Malade</sup> na point de lui  
toutes les fois qu'il ~~exerce~~ bien tous les  
mouvements en flexion, sans aucun effort  
de saillie, les os.

On reconnaît chaque espèce de luxation de  
particulier aux signes suivants. D'abord pour  
l'acillaire, par la présence de la tête de l'os  
sous l'aisselle, qu'on ~~reçoit~~ <sup>reçoit</sup> en y portant  
l'œil, en même temps qu'il y a une ~~vidue~~  
les apophyses acromion et Coracoides, qui peut  
être enfoncée avec une fracture du col de  
l'humérus, mais qu'on ~~ne~~ <sup>ne</sup> découvre pas  
en sachant qu'il n'y a point d'os sous  
le moyen de l'épaule. 1<sup>re</sup> La sous-scapulaire  
par la présence d'un os à l'épaule, en  
même temps que la tête de l'humérus est  
la fosse sous-scapulaire. 2<sup>re</sup> Enfin celle de  
dehors au sous-gomme par la présence  
de cette même tête de l'humérus et le  
sans le moyen de l'épaule.



Lorsqu'on est conduit à reconnaître une lésation  
unilatérale, il est difficile d'en saisir le point  
de l'origine, par conséquent est toujours appelée pour  
arriver d'un temps plus ou moins éloigné de 30 secondes  
l'accident, qui a agi sur le bras et qui l'a  
produit. On le reconnaît par le rapport qu'il  
fait le malade, qui dit qu'il a eu l'attaque  
de l'épave pendant 99<sup>es</sup> temps. *Scizé de*  
la cavité glénoïde de l'acromioclaviculaire puis insiste  
que par l'effort musculaire elle est portée en  
dehors ou en dedans parce qu'il est de l'acromioclaviculaire, que  
les lésations acromioclaviculaires ont lieu.

Pour réduire ces espèces de lésations, il faut  
comme dans toutes les autres de l'acromioclaviculaire, l'acromioclaviculaire  
père parcourir à l'os un chemin différent de  
celui qu'il a parcouru. Pour cela il convient de  
mettre les parties dans une extension, ce qu'on  
fait en employant des puissances comme on  
le fera; mais il est bon avant de dire les  
manières qu'on emploie anciennement, avant que  
de dire celles nouvelles.

Avant d'abord usage en particulier d'une  
machine de la même du tronc à propre, qui  
présentait une branche de la queue un appui  
le bras, qui était fixé, on le rapprochait du tronc.  
C'est ce qui était appelé la machine à rapprocher.  
qu'elle était employée d'abord pour l'acromioclaviculaire.  
Ensuite on a fait usage de l'échelle, et pour  
cela on faisait monter le malade sur une  
chaise, qui était montée en lui faisant passer  
le bras dans une échelle, que l'on avait en



nombre suffisant d'adresses, qui une fois  
 recueillies, on entrait le tabouret et le  
 suspendait aussi suspendu, et qu'il se  
 suspendait se redressait. On a fait encore  
 usage du bâton, qui doit être sans laideur  
 du malade, pendant que des aides le tenaient  
 et qu'on tenait maintenant le bras. On tenait  
 de petit d'un espèce de cuir, qui se tient  
 d'une espèce d'ore, ou le plaçait dans le bras  
 de l'aide, et on le maintenait au moyen  
 d'une manivelle. Les chirurgiens les ont encore  
 réduits au moyen de deux tuteurs, qu'il plaçaient  
 dans le bras de l'aide du malade, après  
 lui avoir fait passer horizontalement sous  
 table, tandis qu'ils tenaient de l'autre main  
 le bras et la main correspondant au bras  
 lésé. Dans ces moyens, présente l'inconvénient  
 de ne point agir sur les muscles qui se  
 trouvent contractés dans le bras de l'aide  
 que l'on veut étendre, et par conséquent aller  
 jusqu'à pousser les premiers produits la  
 fracture du col de l'humérus, la guérison  
 point dans la direction également de l'aide  
 Avant que d'appliquer des aides, pour  
 une luxation, il est d'usage de la guérison  
 ce qui fait supporter le bras dans divers  
 sens, et même, en mettant comme l'aide  
 devant, une fois qu'on est sûr qu'il n'y a  
 la main du bras correspondant au bras  
 lésé, entre les cuisses, tandis que l'aide  
 met ses mains en arrière, l'autre aide  
 celle-ci le plus possible, contre la tête de  
 qui aide, plaçant au agit sur le bras en  
 manière de l'aide des premiers, dans



la nuque et au bas du bras, la résistance 192.  
à l'abaissement et la pince d'acier ou mieux  
puisque l'insuccès il est arrivé que pendant que  
l'on préparait les conjonctions musculaires pour  
celle le chirurgien l'a conduit. Il est même  
arrivé qqf. qu'on est parvenu à les réduire.  
Quelques temps après, au moment où on y passait  
la main, a eu lieu de grandes tentatives que  
l'on avait fait pour cela, parce que dans pareille  
circonstance, les muscles se présentent plus ou moins  
à la résistance. Aussi à tout Ha d'application  
très-célébrée ne peut parvenir parvenue  
en résine, tandis que d'autre par instants  
en sont devenus à bout.

Il est bon d'observer que pour la réduction  
d'une luxation, on est qqf. obligé de l'écarter  
des règles primitives par là, même on ne  
peut jamais parvenir à les réduire de cette  
manière, tandis qu'il y a une exception à cela,  
parce que qq. la tête de l'humérus ne peut  
point entrer dans sa cavité en employant  
cet instrument pressé, tandis qu'il le peut  
autrement. Aussi est-ce pour cela que qqf. de  
personnes entièrement étrangères à l'art en  
réduisent qqf.

On réduit une luxation de l'humérus  
en mettant les parties dans l'extension, selon la méthode  
fait en agissant sur l'avant et la main pour  
l'extension en entourant même le poignet d'un  
lapp, tandis que la main est entourée d'une  
nou l'épave et la saignée, au passant une  
serviette pliée en plusieurs doubles, dont  
une des bords passe devant la main, tandis



1939 que l'autre passe en arrière, est il faut  
agir sur les muscles en même temps que l'on  
doit rendre le membre immobile, on passe  
sur l'os une lanière de crin, dont les  
extrémités passent également au devant et en arrière de  
l'articulation, quand les aides tiennent le membre, on  
a d'un côté opposé de celui où existe la  
lésion. L'opération est donc terminée, l'opération  
et la contre-indication. Doit-on en général  
à peu près de même faire.

La position qui conviendrait le mieux, qui  
est horizontale, que l'on donnerait au malade  
en le faisant coucher sur une table, avec  
les muscles dans ce cas s'étendent dans le  
relâchement, et sont ainsi exprimés employé  
dans les cas, où on le met en exercice que  
lorsqu'on ne peut point venir à bout de réduire  
la lésion. Celle qui donne le plus d'efficacité  
est la verticale, en faisant mettre le malade  
sur une chaise ou une table, plutôt que  
sur une plus basse qu'une plus haute, parce que  
les aides ont plus d'efficacité.

Le Malade et les aides ainsi placés, on  
procède à la réduction, en faisant tirer par  
des aides l'un des deux bras, qui est fixé  
les aides ont amené la tête du membre, à  
près au niveau de la cavité glénoïde, et  
qui font l'attention pendant que le chirurgien  
place la partie postérieure du malade, on est  
du bras gauche, il est tenu humérus avec son  
doux muscle en avant et en bas, tandis que l'autre  
est en haut et en arrière, comme nous l'avons  
déjà dit, comme on a vu d'habitude le bras.





19<sup>e</sup> est dans lequel les tendons se réduisent à rien et sans le déffort.

On peut pendant ce temps employer les moyens sollicitants, tels que les bains, les cataplasmes, la dissolution, d'opium appliqué sur le bras, le repos convient également.

Dans le cas où on parvient à les réduire, il faut maintenant le membre dans l'immobilité fixant le bras contre le tronc et on peut appliquer quelques cataplasmes inaltérables sur l'épaulle etc.

Leçon du 22<sup>e</sup>  
Brumaire  
an 13.

Levant disait que la résistance qu'on éprouve à réduire une luxation, dépendait du roserment de l'architecture de la capsule articulaire comme nous l'avons déjà dit, de manière à étranger les, que pour la réduire il fallait par conséquent la distendre. Cela n'est point bien prouvé, puisque cette résistance peut tenir à la contractilité des muscles qui se trouvent irrités par le tiraillement qu'on leur fait. Voilà pourquoi regarder les luxations primitives.

Les luxations comme une coarctation, se qu'on peut toujours réduire, qu'on ne peut reconnaître qu'à l'inspection qu'on ne peut l'écarter de la tête de la tête et au temps que la cause qui agit peut l'écarter faire. Une fois reconnue il faut se contraindre de la tête de la tête dans sa cavité, parce qu'on ne peut se faire qu'elle se réduise par une pression dans l'endroit qu'elle peut occuper. Il faut cependant un certain temps pour cela, quoiqu'elle ne dure pas bien comme cela tout de suite. Au la réduit, en faisant passer à l'endroit différent que celui qu'elle parcourait; et

il arrive quelquefois qu'un auteur, pas trop, alors 196  
ou imprime d'abord à la / des manuscrits  
en bas de page.

On a demandé s'il faut limiter la réduction  
d'une locution de Numéros, lorsqu'elle est ancienne  
de trois ou quatre mois. On peut répondre  
que oui, puisque la pratique de Diderot prouve  
qu'il en a prévu d'assez ancienne; à la suite  
après la difficulté; mais il en venait toujours  
à bout, après des tentatives plus ou moins  
prolongées et à plusieurs reprises.

En concevant bien tous les moyens nécessaires  
pour en procurer la réduction; il venait aussi à l'esprit  
d'être l'objet des accidents qui peuvent se présenter  
manifestes lorsqu'on imprime.

Il survint d'abord une fois à Paris, dans  
le moment où il faisait de grands efforts  
pour en réduire une, un grand nombre de  
considérable de tant d'opérations, qui l'étonna  
au premier abord aussi que tous les assistants,  
lequel se rassura au bout d'un instant, par  
le défaut d'un effacement de la peau,  
pâtesqu'il croyait dans le moment qu'elle  
était due à la rupture d'une artère; ce qui  
n'était point et qu'il attribua à un dégoût  
d'air dans le tissu cellulaire. Il n'en put rien  
guère probable de croire que cela dépendait  
de cette cause; et sans croire plutôt que la  
cause à être produite par la rupture d'une cellule  
certaines des personnes, qui à l'instant échappèrent  
à la dans les grands efforts que les malades  
font pour résister aux forces extérieures.  
laquelle d'après la nature du tissu cellulaire  
qui ne peut guère admettre la qu'il s'agit



19) aucun si se peut au sang pour par  
l'emploi des résolutifs, que l'on applique  
sur toute l'épaule.

Un engorgement adhésif fait 99 fois  
qui arrive très rarement, surtout en fait  
ce qu'il y a de surprenant est que. Bel par  
que cet accident arrive assez souvent en fait  
On ne connaît point trop la cause d'un  
genre ne dépendit de la rupture d'un vaisseau  
lymphatique.

La paralysie du Muscle Deltéide agit  
l'un; mais on s'accorde mieux pour indiquer  
la cause, puisque cela peut tenir à la rupture  
du nerf axillaire qui va se rendre, au lieu  
de l'acromion.

Quant à la paralysie de tous les muscles  
du bras, cela ne peut dépendre que de l'acromion  
des nerfs du plexus brachial, qui a lieu  
soit dans la lésion de l'humérus en  
dehors? Lorsque cela arrive, on y remédie  
au moyen de frictions sèches faites toutes  
de même par l'emploi de la teinture  
Cantariée dont on se frotte, par les verticales  
les obliques, l'horizontal et le Galvanisme.  
Si malgré tous ces moyens la paralysie continue  
longtemps à avoir lieu, qu'on ait recours à  
mettre le nerf à découvert et de faire  
immédiatement sur un des irritations.  
Mais cela ne peut que être pratiqué par  
le plexus brachial se trouvant en vison de  
toute part par des vaisseaux, on ne peut  
point prescrire cet emploi, d'autant plus  
celui qui le ferait devrait être un peu  
des connaissances anatomiques.



## 2.° Des Luxations du fémur. 198

C'est ce qui est le plus difficile avec la cavité  
cotilée de l'os des Thighs se trouve dans  
quatre sens différents et à chaque extrémité.  
De deux ligaments qui traversent cette cavité.  
D'abord elle peut se faire en haut et en dehors  
sous la fosse iliaque, en haut et en dedans  
sous le pubis, en bas et en dehors sous l'échancrure  
puisseuse en bas et en dedans dans la fosse  
sacrale pubienne qui peuvent être dénommées  
d'après l'endroit où va le ligament la tête de l'os  
des, en iliaque, sus-pubienne, sous-pubienne  
sous pubienne. C'est par l'iliaque et la sous-pubienne  
qui sont les plus fréquentes, et de ces deux  
malgré que la tête est déprimée pour qu'elle  
se fasse plutôt en bas et en dedans qu'en haut et  
en dehors, par le rebord de la cavité cotilée  
qui est plus saillant de côté la fosse  
ligamentaire supérieure, le défaut de l'ongle  
ligament triangulaire, qui se trouve implanté  
à la tête de l'os, et enfin le mouvement  
mouvement facile, après que tout existe  
en sens contraire pour celle en bas et en  
dedans, on ne les remarque pas plus  
souvent. Après ces deux espèces vient la sus-  
pubienne par la fosse, quand à l'iliaque  
elle a été très rarement prise, il n'y a que  
desant que la rencontre une fois.

Secundum  
Prima  
Causa

Des Luxations du fémur ont toutes lieu  
par l'action des corps extérieurs ou bien par  
l'action musculaire, mais ces dernières n'ont  
pu être si communes que les premières, les plus  
dangereuses les premières se voient encore qu'on



499 les internes, car les externes ne sont point suspendus  
au du moins ils nous semblent l'être, qu'ils ne  
peuvent point être prodromes par cette cause, et  
lesquels arrivent versant les muscles adducteurs  
qui les prodroment.

Jusqu'à les locations naissent dans les muscles  
ordinaires de la cuisse, il faut pour qu'ils aient  
lieu qu'ils soient toujours portés au-delà de leur  
naturel, qui est <sup>en dedans</sup> ~~en dedans~~ dans les combinaisons de  
celles en haut qui ne peuvent se faire que l'extension  
de la cuisse, et celles en bas dans l'application,  
il faut que joint à cela, que la cuisse soit  
protégée en dedans pour la location il s'agit  
en dehors pour elle en dedans, il en est de  
même pour celles du bas soit de la sous-  
pubienne, au lieu de l'ischiatique.

C'est surtout pour les externes, que les locations  
de fémur se font dans tel ou tel sens, qui pour  
quelles aient lieu doivent être faites d'une manière  
assez forte, surtout pour celles en dehors, qui  
sont de même pour qu'elles puissent s'opposer  
par l'action de ces muscles adducteurs.

Signes

Il y a quatre signes de commun dans les  
locations de fémur assemblés des ilia. Diminution  
ou bien augmentation de longueur de la jambe,  
la direction dans l'adduction ou bien d'être son  
adduction, changement de rapport du grand  
trochanter avec l'épine antérieure et supérieure  
des os des ilia, et l'épine postérieure, qui dans  
l'état ordinaire forme un triangle, dont

la base est formée par ces deux dernières 200.  
buccinées, tandis que le sommet est formé  
par le grand trachante; qui est en  
parallèle à la base, tandis que la base est en haut  
non plus loin et cette dernière se trouve rapprochée  
dans ce cas de l'épine iliaque, au lieu de la  
pubienne, puis comme il y a difficulté de faire exécuter  
des mouvements <sup>quels</sup> ainsi se qui appartient à chaque  
espèce.

D'abord l'iliacque est annoncée par la présence  
de la tête du fémur dans le fossé iliaque  
qui se trouve entre l'os et le petit fémur, il y  
a diminution de la longueur du membre ce  
qui tient à la contraction des muscles fémoraux  
la pointe du fémur se trouve portée dans  
le grand trachante se trouve rapprochée de  
l'épine antérieure et supérieure de l'os des ilia,  
on ne peut point porter la cuisse d'autant dans  
l'adduction, à laquelle on ne peut point faire  
exécution de mouvements, puis, enfin, comme la  
tête du fémur traverse les ligaments dans  
l'endroit diminué.

Dans la sans pubienne, la tête du fémur  
se trouve portée par le sans pubienne, que l'on  
se voit à travers les ligaments et les parties  
molles, la longueur du membre se trouve augmentée,  
le quel est suffisant, quoique toute petite la  
caractéristique, mais il ne peut changer de  
direction, le grand trachante se trouve rapproché  
de la symphyse pubienne, lequel est en ligne  
oblique avec l'épine antérieure et supérieure  
de l'os des ilia, puis on ne peut point faire



201

essentiel de l'inspiration au module.

La luxation des pubiennes est caractérisée par la présence de l'atité du fémur seule pubis, ce qui forme une tumeur que l'on sent sur tout la crâne, laquelle comprime le vaisseau et les nerfs crâniens, il y a diminution de la langue du membre, mais il ne change point de direction, diminue que le pied de la jambe se déplace de sa position naturelle, au lieu d'être dirigé vers l'avant, il se porte en dedans, le grand trochanter se trouve rapproché de l'épine supérieure et antérieure du pubis et de la symphyse pubienne qui ne sera point enfoncée avec son fémur en sachant que par la compression il ne s'élève point à la position normale quand est étendue. Enfin par la luxation ischiatique, la cuisse est portée en dedans et se trouve fléchie, qu'on ne peut faire que presser le pubis, qu'il se relève qu'on ne peut plus lever le cadavre par devant, le pied se trouve en avant de la face plantaire tendue, le grand trochanter se trouve rapproché de la tubérosité ischiatique seconde et on verrait le bras pubis à la position normale que par le pied de difficulté.

Crâniens On voit les luxations du fémur comme les autres de sang, on fait tout par le pied de la tête du fémur de l'os de celui qu'elle a parcouru. Ces luxations ischiatiques sont les sans pubis qui malheureusement les fréquentes sont celles qui présentent de la difficulté à réduire. De toutes ces luxations qui présentent le moins de difficulté, par ce

2 ans ces muscles qui continuent 102  
l'oscillation de femme, mais ceux qui présentent  
le moins de flexion, et ceux qui le font, sont  
les jeunes, le piramidale, l'obtusateur interne  
et le quadr. crural, encore très peu. Cuy-  
parvient par l'usage de l'infusoire et par la  
contraction.

Voici comment qu'on les pratique, on fait  
l'extension sur la jambe étendue tandis qu'on  
fait la contre extension sur le Bassin. La pare  
se fait comme au bras, au moyen de la ceinture.  
Des oliviers. Sur la 2<sup>e</sup> elle se peut toujours  
être faite de la même manière; elle se peut  
si l'on veut la faire sur les épaules, mais  
il vaut mieux quelle soit sur le Bassin,  
les anciens qui y pratiquaient, plaçaient le  
linge sur le dos du Drap, qui servait à  
faire les fonctions de la ceinture dans le p<sup>er</sup> de la  
cuisse droite de la luxation, mais les modernes  
la font sur la ceinture opposée, parce qu'on  
la fait ainsi de ce côté par la compression.  
qu'on y détermine au même lieu la  
contraction. Des oliviers, tandis qu'on fait l'autre  
on ne peut le même inconvénient, ce qui  
s'oppose à ce qu'on ne puisse bien les réduire.  
Où il se présente également on, c'est qu'on  
agitait ainsi du côté opposé, on fait qu'on  
au Bassin on manœuvre de l'autre, qui  
L'angle du côté droit, on qu'on ne peut  
remédier que par un laq appliqué sur le côté  
qui par le bras agit de ce côté et appliqué  
de ce côté, tandis que les oliviers servent



20 Diriger en tous sens; mais cela ne peut servir  
d'autre chose, parce qu'en appliquant, on peut  
les appliquer de la sorte il y a une cause  
cette que les fibres. On y réussit en le faisant  
appliquer sans la force il y a une cause  
d'une manière à ce que les fibres viennent à rendre  
du côté affecté, joint à l'instruction d'autre  
des sans l'usage de salive.

Il faut pour bien faire que le malade soit  
dans un point stable, qu'il ne se fure pas,  
et que son bras soit au même endroit, le  
bras est, qu'il soit placé sur un matelas, le  
plus horizontalement possible. Le malade de côté  
placé convenablement pour réduire une luxation  
sans y procéder en faisant pratiquer l'extension  
et la contre extension la flexion du bras, en  
dirigeant les forces à peu près égales, ce qui  
s'accomplira au point de la luxation, en même temps que  
l'on a soin de recueillir un peu la suite dans  
l'adduction, au lieu d'adduction en l'adduction la  
direction au il saurait. Il y a la luxation  
il y a qui a bien, au moment où les aides  
pratiquent l'extension, on porte légèrement  
la cuisse en dehors, pendant qu'on applique  
sur la tête d'extension, qui une fois qu'elle  
est prise la cuisse est élevée, attachée  
et fait rentrer pour la sans poulaine, on  
porte ainsi que dans la luxation, la cuisse  
en un instant, en la rapprochant d'en haut  
du côté opposé pendant que le chirurgien  
empêche au bras un mouvement, en même  
temps de la poulaine, pour porter la tête

La femme d'après de la cavité crânienne, 204  
Elle se ressemble à un de ces premiers papiers  
des dernières, si ce n'est que l'une qu'il faut  
tailler de façon d'enlever la tête du fœtus tandis  
que l'autre l'autre n'aurait en plus la cavité  
Si après toutes les tentatives que l'opérateur  
aurait fait, au bout de plusieurs reprises,  
il ne faudrait point vouloir persister à  
les réduire, et abandonnerait l'opération pendant  
quelques jours, ne supposant toutes fois qu'un  
emploi en nombre. L'idea consommable, alors  
durant l'intervalle duquel on emploierait les  
moyens capables de relâcher les parties, en  
attendant temps que l'on ferait garder le repos,  
après quoi on reprendrait à de nouvelles  
tentatives.

En supposant qu'on n'arrive nullement  
à pousser les réductions, voici ce qui arriverait,  
l'état de la femme se formerait une nouvelle  
cavité, lequel deviendrait quatre fois difficilement  
des manœuvres, et n'y parviendrait qu'à  
à petit, qui ne valent pas très considérables  
ce qui est différent de ce qui a été dit ailleurs  
on est en mesure en pareil circonstance de  
facilité des extrémités manœuvres encore assez  
étendus.

### Des Bourses en général.

Elles existent dans le développement du fœtus  
en elle, contenant trois grandes cavités d'un corps,  
qui sont la tête, la poitrine et l'abdomen,  
que pour cela on peut désigner d'après l'ordre  
propre, au lieu d'en celle de la tête de  
la poitrine et de l'abdomen.



205 Aux compensés également rance  
un peu la proéminence que forment les blanchs,  
une soit que les parois <sup>continuent</sup> l'épau, gaines fibrées  
sont divisées accidentellement, de quelle manière  
certaines ~~qu'après avoir~~ parli de cette des Viscs  
Il est au d'abord pour ces-ci, qu'un peu  
de l'exterieur comprend sous le nom de hernies  
que la partie des Viscs ~~pas~~ cavités au  
ils se trouvent certains, qui par les ouvertures  
faites accidentellement, au lieu par les naturelles  
et non certaines maladies que nous avons  
reconnues, voir les. la chute du testicule,  
le roulement du flagin de la Matrice.

Des hernies de l'utérus. Du Corps de l'utérus.

Il en est comme dans le nom d'Anéurysme  
qui existe dans la proéminence qui forme  
les Membranes du Corps de l'utérus et est organique  
même, qui pour cela demande qu'il y ait  
une ouverture accidentelle dans le Corps  
qui soit formée soit naturellement tel qu'un  
de remarque chez les enfants qui les apportent  
en venant au monde, qui forment les hernies  
Anéurysmales congénitales, tandis que celles qui  
arrivent chez les adultes, ont à la suite d'une  
apoplexie du trépan. Ce. forment celles qu'on  
nomme accidentelles au commencement.

Les premières sont plus fréquentes que les  
secondes, dont j'ai eu rapporté un assez  
grand nombre dans la collection de l'Hôtel  
de la Santé. Le Corps en rapporté avec assez curieux.

laquelle suivant les circonstances on des catarrhes  
de l'orbite, sur la portion écailleuse de  
temporal, qui offrait sentie des ondulations  
qui correspondait aux sautes d'impulsion  
de l'oreille, qui est l'oreille correspond  
à celle des vertèbres, dont la circonstance est  
l'impulsion par un choc du, formée par les  
os, qui était molle par elle-même, qui par  
la compression occasionnait un assoupissement  
d'organe cérébral, lequel est parvenu  
à la guérison au moyen d'une compression  
méthodique longtemps continuée. Elle a si-  
gnifié l'absence qu'on n'observait pas la tête  
aucun signe, en appliquant la main  
à l'endroit qu'elle occupait, au lieu sentait  
les os du crâne. Elle consistait deux jours  
enfant. Ce fait est intéressant. Tant fois  
il ne s'est point trompé.

Ces sortes de tumeurs peuvent occuper  
différentes régions de la boîte osseuse qui forme  
le crâne, on a vu à la fontanelle, à l'occipital,  
et autres endroits. Elles se présentent parfois  
sans les mêmes signes. La tumeur est arrondie,  
plus ou moins considérable, ne présentant pas  
de changement à la peau, occasionnant un  
assoupissement lorsqu'on y fait un point de  
compression, ayant un choc du formé par  
les os du crâne, faisant sentie des pulsations  
d'ondulations semblables à ceux du crâne, qu'on  
malade ne peut être semblable, s'y en est



20 Jokes cadut, au cas fungus de la Durum  
pout au imposeo.

Le hernie caustique chez les adultes doit  
que par la distribution des vaisseaux du Pave  
et qu'à la suite d'une fracture de l'opercule de  
l'épave. Ce cas a été rapporté  
par Sarr. Lapiromonia et Quibet.

Secunda. On peut obtenir la guérison de l'ancipit  
+ Brumaire par la compression, mais ce moyen ne réussit  
point chez l'adulte, aussi se détermine-t-on de tout  
moyen, on se contente seulement de comprimer  
l'anneau d'une sangle de gomme élastique, pour  
la préservation d'un contact des corps étrangers.  
20 Des hernies de la Poitrine.

Ces hernies sont moins communes que celles du  
Cervix, cependant on en a vu des exemples,  
mais jamais le Pannu ne sort en totalité  
ce n'est qu'une partie d'un de ses lobes  
ou d'un lobe; elles ont été tout à fait observées  
à la suite des cicatrices résultant de plaies  
de la poitrine. On a vu l'exemple de cinq  
ou quatre hernies de Pannu, à la suite  
d'un effort, une est rapportée par M. Salabert  
dans la Médecine opératoire. Une autre  
n'a été reconnue qu'à la suite d'un effort  
d'un député, qui était formé à l'endroit  
d'une ancienne cicatrice.

Signes

On les reconnaît à une tumeur en sautoir  
nature sur l'un des côtés du pectoral de la  
poitrine, qui s'élève dans l'un des espaces

intercostaux, qui diminuent dans les inspirations et augmentent au contraire dans ces expirations.

On y remédie au moyen d'une compression que l'on exerce dessus. Après avoir eu soin de les réduire auparavant, laquelle doit être continue jusqu'à guérison.

### 3.° Des Hernies Abdominales.

Elles sont les plus communes et les plus variées, soit par leur situation et par les organes qu'elles forment. Contre les considérations qu'en ont donné les pathologistes, voyant seulement les hernies inguinales,

faucibus annis, nous traitons d'abord de leur cause, 1.° De leur espèce, 3.° de leur siège 4.° Des organes qui les forment le plus ordinairement.

Celles qui sont les plus fréquentes sont d'abord les inguinales, ensuite les ombilicales, puis les crurales. Il y en a encore d'autres qui se forment dans différentes régions de l'abdomen, mais elles sont moins fréquentes, aussi les passons dernières que nous finirons.

Ces sortes de hernies consistent dans la sortie partielle ou totale d'un des viscères contenus dans la cavité de l'abdomen, soit par une ouverture naturelle, soit par une accidentelle, ou dans des parties de cette cavité.



209  
On divise les causes qui produisent les  
hernies <sup>appréhendées</sup> en deux <sup>disposantes</sup> et en <sup>efficientes</sup> <sup>disposantes</sup>  
<sup>disposantes</sup> Les causes <sup>disposantes</sup> se subdivisent à  
leur tour en trois autres espèces, 1<sup>re</sup> en celles  
qui ont rapport à l'âge, 2<sup>e</sup> au sexe 3<sup>e</sup> à  
la manière de vivre.  
1<sup>re</sup> au rapport à l'âge. Les hernies peuvent  
survenir à toutes les époques de la vie, mais  
les deux extrêmes sont celles dans lesquelles elles  
ont plus fréquemment lieu. Les plus communes  
chez les enfants sont les congénitales qui sont  
remarquables en ce qu'elles peuvent occuper  
la bourse vaginale, par la descente de l'intestin  
dans la cavité qu'elle forme, au moyen de  
l'ouverture qui à l'épée passage chez les petits  
garçons au testicule, qui ne se ferme point  
encore à l'âge.  
2<sup>o</sup> au rapport au sexe. Les hernies se différencient en celles qui  
ont lieu au sexe masculin et en celles qui ont lieu  
au sexe féminin. Les hernies sont plus communes chez les hommes  
que chez les femmes. Cependant il est bien d'observer qu'elles sont  
plus communes chez les hommes que chez les femmes.  
3<sup>o</sup> au rapport à la manière de vivre. Les hernies sont plus communes  
chez les hommes que chez les femmes. Cependant il est bien d'observer qu'elles sont  
plus communes chez les hommes que chez les femmes.

ceux qui se livrent à des efforts plus annuels 200  
violents, tels que ceux qui se battent, ceux qui

veulent lever des poids pesants. ... à l'état des parties

4.° Enfin ceux en qui se trouvent à l'état parties  
dans les quels se trouvent les parois et les viscères  
abdominaux. Sans cesse, ceux qui ont  
les intestins pleins et sont plus disposés à  
les autres soit par suite de la digestion ou  
bien par des gaz. ~~Après l'état de~~ état de  
grossesse y est plus disposé que dans un  
autre moment, l'estomac dans l'état de  
l'estomac dans l'état de plénitude. Quand  
l'estomac est dans l'état de plénitude. Quand  
à ceux là, tout ce qui peut diminuer leur  
état de résistance dispose à la formation de  
hernies; c'est pourquoi voit 1/2. à la suite de la  
grossesse, des ~~hernies~~ ~~hernies~~ d'une manière  
considérable à la suite d'une colicade, c'est  
même ce qui fait qu'elles sont plus communes  
chez les vieillards.

Quand aux causes efficientes, on peut  
les distinguer en celles qui agissent subitement,  
et en celle qui agissent d'une manière  
lente.

1.° Celles qui surviennent d'une manière lente, continuellement  
sont 1/2. celles qui arrivent aux personnes qui  
jouent des instruments à vent, chez eux  
qui font les exercices à cheval, tels que  
les cavaliers.

2.° Celles qui arrivent d'une manière rapide  
sont celles qui se trouvent forcées par la



211 diminution de la capacité du bas ventre, tant  
par la contraction très forte des parois de cette  
cavité que par celle du Diaphragme tel qu'on  
le voit dans les vomissements dans les grandes  
inspirations, en levant des fardeaux considérables,  
en chantant, même en parlant.

Celles qui surviennent d'une manière lente  
sont moins fâcheuses que celles qui arrivent  
d'une manière prompte, parce que dans cette espèce  
rarement les parties se détachent & étranglent, mais  
si elles persistent en élargissement, elles sont plus  
difficiles à guérir aussi les personnes qui les  
ont doivent elles porter constamment un  
bandage propre à empêcher que les parties qui  
les forment ne s'échappent.

En contraire celles qui arrivent d'une manière  
prompte sont plus capables d'être étranglées, & même  
l'anneau est devenu aride en même temps que  
l'étranglement. Mais, quand il ne subsiste pas,  
on peut à l'aide d'un bandage procurer la  
guérison de la Malade.

Après avoir vu l'anneau facilité la connaissance des parties  
par où se forment les hernies, on divise les parois  
des hernies. Du Bas Ventre en six régions.

1. Diaphragme. 1. la supérieure ou Diaphragmatique est  
qui s'étend aux hernies, à cause des problèmes  
considérables qu'on y voit les organes qui avoisinent  
cette région qui sont le foie, l'estomac et  
la rate. Lorsqu'ils ont lieu elles paissent  
arriver de deux manières, ou par les ouvertures  
naturelles que présente le Diaphragme, ou bien  
par une rupture qui y arrive, ce qu'on

viens ggg dans les autres. Mais ces deux en 212  
ne doivent point être considérées comme  
hernies.

22. L'inférieure ou ~~pelvienne~~ <sup>21</sup> Pelvienne  
exposée également aux hernies, ce qui tient  
à deux causes, l'une parce que les Viscères  
sont situés plus en avant qu'en haut; ensuite  
parce que les parois du Bassin sont moins  
solides, supposent à quelques endroits des  
plus, c'est-à-dire les organes que le Bassin contient  
sont assez volumineux, et qu'ils sont situés  
naturellement plus près de la surface que les autres.  
par des organes assez solides. Cependant il en  
arrive ggg au péricrâne au lieu d'être  
qui est encore beaucoup possible, par le  
trou ischio-pubien. En tous cas, les hernies  
sont communes au deux sexes, mais la femme  
a de plus celles qui partent de la paroi  
Vaginale.

30. La paroi postérieure n'est point  
susceptible, à moins qu'elle ne soit considérée comme  
telle, elle qui peut avoir lieu par la petite  
ouverture triangulaire du grand oblique, au  
costo-abaissément, et du grand dorsal au  
côté huméral; mais les hernies sont très  
rares. Elles n'ont été observées que par Sill.  
ce qui a fait qu'on les a nommées hernies humérales  
au dit Sill.

4. L'antérieure est celle où elle  
se trouve le plus souvent. Celles qui y ont lieu  
sont 1.° l'ombilicale ou exomphalique, 2.° l'inguinale  
ou suspensoriale, qui est la plus fréquente, et  
l'autre, qui est ggg et très volumineuse.



713 qui sert à la distinction du labovelle qui est  
plus petit et de l'occipital quand elle est plus  
confondable 3<sup>e</sup> la Crucelle ou unal boele et  
par q<sup>ue</sup> q<sup>ue</sup> q<sup>ue</sup> unguinalle. 4<sup>e</sup> fl. se forme ensuite  
des hermes à l'extre des crénans au castrant  
des filles des parais de Taboumen qui sont  
distingues par le nom de Ventral à la région  
le p<sup>er</sup>igastrique elle est portee la même nom  
(et ya la l'hamatique) et hypogastrique  
elles qui ont lieu dans cette région. Les deux  
derniers de hermes des papilles communément  
sont la ligne blanche.

Second 5<sup>e</sup> et sixième celles qui sont les crénans, mais il  
s'ensuit que peut être de hermes dans  
la région, on en a peut être encore un.

Caus les p<sup>er</sup>icrès qui forment hermes au  
devant des, q<sup>ue</sup> sont l'endrait où ces dernières  
ont lieu il ya un prolongement du p<sup>er</sup>icrès,  
S'ensuit lorsque la p<sup>er</sup>icrès forme une queue  
qui est peut être accompagnée au devançant s'il  
s'ensuit lorsque la p<sup>er</sup>icrès, est l'q<sup>ue</sup> dans  
les cas où il ya complication en même  
temps des testicules, qui alors dans ce cas  
est distincte pour le devançant. Il peut se faire  
encore quelque chose que dans certains p<sup>er</sup>icrès  
il n'y en ait, peut être, mais cela à l'égard à la p<sup>er</sup>icrès  
sac herminière de p<sup>er</sup>icrès qui alors dans ce cas les  
parties faisant effort contre la cicatrice qui  
se forme, empêche à ce que la p<sup>er</sup>icrès  
s'ensuit ce cas, dans toutes les autres hermes,  
le p<sup>er</sup>icrès l'endrait une p<sup>er</sup>icrès qui n'a

une hernie, lequel présente une élargie  
une capacité et une épaisseur en raison de son  
ancienneté, et d'où les premières viennent de  
la formation. D'une hernie il y a deux points  
de caractères qui en les acquiescent par l'impulsion  
des intestins en outre lui et par une augmentation  
de l'ambie appliquée l'une des autres. Il présente  
au côté de l'abdomen une espèce de bourse  
par une augmentation un peu plus épaisse. Il  
répond en de vant, tantôt la tige et l'abdomen  
et au contraire, l'autrefois au contraire, les  
qui augmentent à des rapports. L'abdomen lui-même  
parties de l'abdomen. L'abdomen présente une  
il est en contact avec les parties qui font hernie,  
avec les qu'il peut contracter des hernies,  
mais ne peut pas se rétracter en partant de  
l'opération qu'il est obligé de faire. Les  
hernies sont presque toujours une certaine  
quantité de sérosité, de l'abdomen du périclisme  
et dans d'autres seulement que les hernies  
passent un bandage, et peut être hernie entre  
lorsqu'il l'abdomen. Il est possible de la nature, de  
même structure que la hernie.

Quant aux parties qui forment hernies. Ce qui forme  
ce sont plus particulièrement les épiploques et plus particulièrement  
les intestins; cela n'est comme l'un d'eux  
qu'un prolongement de l'intestin, qui quand  
ce n'est que lui qui les forment ou les mènent  
épiploques quand à un d'eux par un tour  
une qui se trouvent dans la capacité de  
l'abdomen, ce sont les intestins grêles qui  
sont les plus petits, qui comme l'un  
lui occupent la plus grande partie de la



21) capacité de l'abdomen qui prennent alors  
l'un ou l'autre, il importe peu par la  
résection de savoir quel intestin qui les forme  
plutôt qu'un autre, mais il n'est point  
même quand on opère, il est intéressant de  
savoir si c'est le jejunum ou l'iléon, surtout  
lorsqu'il y a ogène, parcequ'on peut alors  
indiquer tel ou tel intestin affecté. Lorsque  
c'est l'apoplexie et l'infarction du même temps que  
les forment, elles prennent le nom d'apoplexie  
et d'infarction. Parmi les gros intestins, le caecum est  
le plus susceptible d'en former, pour les colon  
les deux portions ascendante et descendante  
sont susceptibles à raison de leur point de  
fixe, il n'y a que sa portion transverse  
qui est susceptible. Quelque peu le rectum il n'y  
a que sa portion supérieure du sacrum  
qui est susceptible, à la face inférieure du sacrum  
il est le plus susceptible que dans la formation  
d'une hernie, ce n'est point toujours la partie  
d'intestin correspondante du côté du lien qui  
elle existe qui la forme, mais bien qu'il y a  
cette ogène.

Quant aux autres organes contenus dans  
la capacité de l'abdomen, tous n'en sont  
pas susceptibles, et d'ailleurs pas aussi susceptibles  
que ceux qui peuvent en former.  
Le foie, l'estomac, et le tronc des reins, sont  
susceptibles d'en former, mais cela  
est rare, et qui grand est à l'encre, le plus commun  
l'accompagne toujours.  
Le péricarde, la grande et la petite  
veine, et le péricarde, et le péricarde, et le péricarde  
est point

exposée, si cela arrivait, ce ne serait que 716  
dans le cas de destruction, on a vu tous les  
viscères sortis de la cavité de l'abdomen,  
au moyen d'une suture qui se formait à sa  
paroi, ce qui pourrait arriver chez le fœtus  
et non chez l'adulte.

La Rate malgré son point fixe dans  
l'abdomen, est cependant susceptible de former  
hernies, on a deux exemples, l'un rapporté  
par Pott et l'autre par Petit.

Les reins à raison de leur fixation,  
ninsi que le Pancréas, n'en sont point  
susceptibles.

La Vessie en forme ggff, et l'urètre en  
anneau liu, par l'arcade orurale, l'anneau  
inguinale, le Vagin, le Rectum et même  
l'anus du Pubis.

Quand enfin on s'adresse à la Matrice,  
ils en sont tous deux susceptibles. Les Ovaire  
en forme ggff, et surtout chez les petites filles,  
et c'est même qui est caractéristique qu'elle  
était susceptible de hernies inguinales. Quand  
à la Matrice elle n'est susceptible que pendant  
l'acte de la conception, laquelle se présente  
ggff tant à l'extérieur, qu'elle forme un  
volume considérable et dans lequel se trouvent  
gentement le fœtus, que l'on sentait au travers  
des parois et qui ne peut empêcher qu'il soit  
peu augmenté de poids.

On a observé examiné sur plusieurs fois la  
trois espèces de hernies les plus fréquentes, après  
qu'on nous indiquera leur siège.



217 Des Hernies en Particular  
Des Hernies de la Paroi antérieure.  
De l'Inguinale.

On nomme ainsi celle qui a forme au  
travers de l'anneau du grand oblique, qui  
se trouve chez l'homme traversée par le cordon  
spermatique, tandis que chez la femme il n'y  
a que le ligament rond. Mais c'est plus  
fréquente chez l'homme que chez la femme  
aussi est-ce pour cela que tant qu'elle n'est  
pas antérieure elle est plus commune  
Lorsqu'elle a lieu il peut se faire que le  
peritoine et les intestins qui la forment descendent  
dans la tunique vaginale et qu'ils y restent par la  
contact immédiat avec l'intestin. Lorsque celui-ci  
n'est point encore descendu, qui ne descendent dans  
les bourses qu'après la naissance la plus tardive,  
et n'ont point toujours avant comme on  
l'a dit, puisqu'il en est au il en descend  
quelquefois même de plusieurs années. Il peut  
se faire même que quand il seroit descendu,  
le péritoine et les intestins y adhèrent toujours,  
parce qu'il seroit difficile de l'impossible que  
l'adhérence de la paroi du petit canal que  
le peritoine forme pour donner naissance à  
la tunique vaginale, ne soit point encore  
parfaitement oblitérée, d'autant qu'il y a  
une forte résistance qu'ils se rencontrent dans  
le foramen inguinale ne point toujours  
par l'anneau du même nom; elle a été observée  
entre les fibres qui forment les piliers. C'est  
pourquoi les auteurs qui ont fait cette remarque  
qui n'ont point été compris depuis et d'autre



est d'accord à ces faits. Cela ne lui qu'en se que 918  
il y a écartement des fibres qui entre dans la  
composition des Pellucides l'anneau, qui en une  
on s'en retrouve formée par la cellule grand  
oblique et non par la petite aussi que par la  
transverse. à la stérilité de la petite oblique (forme bien  
une laine à l'anneau, mais s'en est en haut et en  
dedans, tandis qu'en bas et en dehors il est  
libre et se trouve occupé par le tissu cellulaire  
et se recouvre par les legumens.

Pour le mécanisme de la formation de la  
hernie inguinale, on admet plus maintenant  
le plus ordinaire que la formation de défects en  
dedans et devant en bas, et non de dedans en  
dehors à cause de la position du petit oblique,  
qui s'oppose à ce qu'elle se fasse dans ce sens  
et derrière en dedans. Il est bien d'observer  
d'après cela que le cordon spermatique se  
trouve porté en dedans, lequel entraîne avec  
lui les testes épigastriques.

Quant au rapport du cordon des testes  
spermatique avec les parties déplacées, l'observation  
de l'embryon cadavérique, à démentir, fait  
quand on s'agit de la vérité, lorsque les testes  
se sont faites de dehors en dedans, il se trouve  
il se trouve placé à la partie postérieure  
et interne de celles là, tandis qu'il s'en fait  
il se trouve, au devant, l'un après l'autre  
l'autre, en devant et sur les côtés.

De la hernie congénitale

Il ne survient qu'à un âge très tendre  
de la naissance, on lui en a vu pendant longtemps

Second  
7 Brumaire



219 après; Il est même à présumer qu'elles ne  
seraient point chez le fœtus parce que les  
intestins ne jouissent point d'un mouvement, et  
il faudrait en supposant qu'elles a'échappent  
qu'on admet une adhérence contre nature des  
intestins avec le testicule et que celui-ci ait de  
dans les bourses ce qu'on ne peut que représenter  
au lieu qu'après la naissance, au contraire il se  
développent ce que leur développement des  
fœtus de l'abdomen et le diaphragme au moyen  
des lésions qu'ils font et des masses accumulées  
au-dessus d'eux. Ou bien elles pourraient  
se faire à un époque un peu éloignée, mais  
alors il faudrait que le testicule se fût pair  
descendit dans les bourses qu'elles descendent  
après, un peu de temps après, comme dans  
dans le dernier cas, avant que l'ouverture qui  
permet le passage soit oblitérée.

Il peut se faire qu'une hernie de  
naissance, ou congéniale, que les parties déplacées  
ayant contracté des adhérences avec le testicule,  
et que s'en suit grand obstacle, avait  
une qu'il portait depuis la naissance.

Cette sorte de hernie se guérira d'autant  
plus que les personnes sont plus près de la  
naissance, parce qu'il faut que les parties  
déplacées aient été réduites, comme les bourses  
qu'il y a dans le passage, de même qu'on  
testicule, à une tendance à l'oblitération alors  
on pourra procurer une guérison de l'obstacle  
en faisant porter un bandage au Malade  
et les faire à repos le repos.  
Il peut se faire également une hernie  
congéniale chez les petites filles, mais pour



que cela arrive et font, mais soit dans les 290  
premiers moments de la naissance.

### De la hernie Crurale.

On entend ainsi celle qui se fait par la crural  
crurale, qui est plus fréquente chez l'homme  
que chez l'enfant, qui tient à l'égail à l'anus, les  
grande tumeur, que les diamètres transversaux  
du bassin; chez elle, est plus considérable, plus  
fréquente également chez elle, que chez  
les jeunes filles, par rapport à ce qu'elle aient  
pu être de l'enfant à l'adulte, et l'adulte suffit  
de dans en dehors et de haut en bas, se fait  
plus tardive lorsqu'elle existe, et l'adulte  
en dehors qu'en dedans, ce qui est contraire  
de l'inguinale, qui n'acquies jamais une aussi  
grand volume, et l'adulte par conséquent  
ce qui tient à l'apophyse du fœtus, qui  
s'appuie à ce que les parties ressortent, à une  
forme un peu différente.

De la  
8 Bémair

### Hernies Ombilicales

Elles sont moins rares que les précédentes,  
quoiqu'elle naissent cependant plus tard.  
Elles peuvent arriver chez les enfants ou chez  
l'adulte. Dans un peu par l'ouverture même  
de l'ombilic, parce qu'il peut se faire que les  
parties qui la forment, n'ont pas été traitées avec  
l'adulte, ou de l'enfant qu'il n'a pas et l'adulte  
ainsi par les viscères; chez les adultes  
elles se font par une élargissement, une escarre  
qui est faite au tour de l'ombilic, qui



27) n'est rien sur la connaissance de la  
maladie, mais qu'il est essentiel de connaître  
le royaume chez un enfant, parce qu'il  
peut se faire qu'il y ait des parties qui se réunissent  
certaines, y ait une tendance, et il est à  
presumer qu'elles se réunissent, si on en fait la  
réduction, ou bien que chez l'adulte elles ne se  
réunissent pas. Dans tous les cas elles se réunissent dans les  
mêmes proportions. Lorsqu'elles arrivent dans  
l'adulte, cela n'est pas chez la femme que  
l'homme, parce que celui-ci n'est pas aussi  
susceptible à des crampes des parties indigées  
que la femme, ce qui lui arrive généralement dans  
le travail de l'enfantement. Quelque soit l'époque  
où elles se forment, elles paraissent dans tous les  
cas formées plutôt par le col utérin, que  
par un autre organe.

C'est ce qu'on appelle par un accouchement  
difficile. D'après ce qu'on nous a dit de dire, il est bon  
d'informer si la femme n'a point eu de hernie  
ombilicale, parce qu'on en a vu chez quelques  
disparaître pendant la grossesse et réapparaître  
ensuite, ce qui est essentiel à savoir, afin de  
prévenir de ne point faire de grands efforts  
et qu'on recommande la gymnastique, crainte de  
le étranglement qui pourrait avoir lieu dans ces cas.  
On s'est demandé s'il y avait une espèce  
aponeurotique entre l'entre la poche ovarienne  
et les téguments, les opinions sont partagées  
à ce sujet; ce qui porte à croire qu'il n'y en  
a point, c'est que les aponeuroses n'ont  
pas susceptibility de se distendre, et ce qu'on  
croit être une, pourrait bien être deux.







223 Sachant quelle occupe presque dans tout le cas  
une certaine distance. D. l'anneau quelle est  
soutenue par le moyen du sordone laquelle  
présente une certaine légèreté, qff. de la flueté  
je dis qff. parcequ'elle n'en présente point l'aj  
une, reste à chercher dans le même volume  
si elle n'aigmente point au lieu que la hernie  
diminue par la position horizontale, et augmente  
dans la verticale etc.

1<sup>er</sup> un Sarcocel 2<sup>e</sup> C'est plus arde le sarcocel, qui est survenu  
à la suite d'un cont, d'une chute, qui a donné  
lieu à un gonflement inflammatoire du testis  
qui présente une tumeur dure, résistante, dure  
qff. à la suite la hernie se présente qff.

3<sup>e</sup> un Varicoel. 3<sup>e</sup> C'est un <sup>de même</sup> Varicoel, qui présente une  
Varicoele qui n'est due qu'à la dilatation veineuse  
qui est flexueuse, qui augmente par la position  
verticale, tandis qu'il diminue dans l'horizontale,  
qui succède qff. à une ecchymose veineuse et  
qui disparaît par le usage d'un suspensoir.

La hernie  
Oculaire. Quand à la hernie oculaire, elle pourrait  
survenir avec un engorgement des glandes lymph  
matiques ou ne s'en laisser point engorgées. Elle  
se rappelant quelles sont les engorgées  
ou bien petit à petit, qui qff. succède à une  
Maladie vénérienne ou bien à la suite d'une  
piqure d'un instrument imprégné de fluide  
vénéreux. Quand aux dilations Varicoele  
qui paraissent assez bien, rarement elles  
sont, etc. que d'ailleurs sont faibles à



recommence par la flexion de l'anneau. 224

Comme une hernie ne peut être formée que d'une  
par l'épiploon, ou bien par un intestin <sup>ou l'épiploon</sup> <sup>ou l'intestin</sup>  
ce qui le caractérise séparément. Lorsqu'elle  
est formée par l'épiploon, la tumeur est dure,  
légère, elle diminue moins de volume lorsqu'elle  
se comprime, au du moins ne rentre que  
d'une manière lente, et jamais brusquement.  
Si au contraire le malade, il est assez ordinaire  
qu'il éprouve d'abord un sentiment de gêne  
par la fixation du fœtus dans l'organe,  
diminue point de suite ni après le repas.

Accompagnée par la hernie formée par l'intestin  
la tumeur est plus arrondie, plus ferme, plus augmentée  
après le repas, par le passage des aliments dans  
son intérieur, et des gaz, si l'on cherche à la faire  
disparaître, elle rentre en faisant un certain bruit.  
Sans caractères de l'épiploon, elle est plus  
difficile, il est plus facile de reconnaître l'épiploon  
en ce que c'est lui qui est situé le plus extérieurement,  
qui forme une espèce de poche à l'intérieur, dans  
laquelle il se trouve contenu, qui en gênant par  
la caractéristique il fait entendre un bruit de battement  
et qui se voit des signes appartenant à chaque  
espèce de hernie. Il est intéressant de remarquer  
le connaître le régime pratique l'opération de  
la hernie, pour la voir à l'intérieur et affecter  
non.

Second  
Principes

Les hernies peuvent occasionner un malade  
des traitements, des étranglements et un caractère de gêne  
sombre, aussi est-ce la cause de la mort. Les hernies  
qui empêchent la plupart des personnes qui les  
ont, qui comme l'on sait que cela est d'autant  
plus ordinaire que ce sont les vices abdominaux



225 qui les forment, qui affectent occasionnellement des vices  
des veines de la mort, tandis que le contraire  
contraire à bien pour eux de la fistule, dans  
les maladies espèrent toujours guérir. Ils peuvent  
par leur ancienneté acquiescer un volume très  
considérable, qui s'efface l'acquièrent tout de suite  
au lieu plutôt qu'ils qui peuvent espérer les  
malades à la mort, il survient un étrange  
comme cela est à voir s'efface. Aussi les qui  
engagent à chercher tout les moyens capables  
de les guérir.

Quand il n'y a qu'une portion d'éciploce de  
sortie, il faut se faire qu'il se guère un peu  
au plutôt un rapprochement de manière à ce qu'il  
devienne semblable à un cordon, lequel peut être  
à son extrémité une certaine portion en peu  
considérable qui en impose pour un tiers  
testicul. s'il peut se faire que dans le grand  
nombre d'observations qu'on a faites, qui n'elles  
il n'y en soit troublé.

Le sac herniaire formé par la péritonée,  
mesure quela hernie acquiesce de volume, aux  
détours, lequel lorsque les veines se pressent  
trop, se creuse et laisse passer subitement  
place dans la tige cellulaire sans entrave, et  
cela arrive pour les hernies ventrales.

Enfin Quant on considère les hernies pour les  
traiter sous trois points de vue, 1.<sup>o</sup>  
ou les hernies sont réductibles. 2.<sup>o</sup> ou irréductibles  
sans étranglement. 3.<sup>o</sup> ou avec étranglement  
1.<sup>o</sup> les réductibles  
1.<sup>o</sup> Pour les hernies réductibles, il n'y a point de



De moyens guérissables, mais il y en a de fatigables 226  
malgré tout ce que les anciens ont employé  
peu et effec. Offant cependant comme qu'il y  
en a peu lesquels on pourroit espérer la  
guérison, si le malade se livrait à une cure  
abandonnée, et s'il fait tout les efforts auxquels il  
pourroit se livrer et qu'il se feroit qu'il n'aurait  
avec le secours d'un bandage qui maintiendrait  
en lieu fixe les parties. Cependant également  
que malgré tout les inconvénients que présentent  
l'emploi des moyens dont se servent les anciens,  
il y en a qui pourroit également être employé  
avec succès, tel que <sup>l'usage</sup> la ligature, qui a été  
essayée pour la hernie inguinale, qui lui est  
au regard pas plus défavorable, tandis qu'en  
l'employant avec succès pour l'ombilicale et qui  
est le moyen pour ainsi dire seul dont on  
obtient la guérison.

Les bandages mis en usage pour les hernies sont <sup>bandages</sup> mis en usage, les uns qui sont de la première espèce  
mis en usage, dont il en a de la première espèce, les autres  
qui sont maintenant en usage dont on ne se sert  
plus, sont les élastiques.

Les non élastiques sont de deux sortes <sup>Des non</sup> élastiques  
les uns sont simples, les autres ne le sont  
point. Les premiers se font avec du linge, de la  
laine, du coton, <sup>ou de la soie</sup> fait de petits sacs  
recouvert de peau; qui se font plus ou moins  
usages. La seconde se fait avec une bande de linge  
élastique, il conviendrait qu'ils soient bien appliqués  
et d'une manière très forte, ce qui devient  
gênant; puis ensuite est qu'ils peuvent se déplacer



227 Plus qu'ailleurs, et par la exposure à l'étranger.  
On peut cependant malgré cela, les mettre en  
usage, et que chez les locifères, qui sont en  
en nourrice, parce que les agens de la pénétration  
de la langue, les vides quand l'un même  
il se déplacent, ne servent point à sept  
d'être étirés, et que plus ils sont pressés  
toujours dans une position horizontale. On peut  
les servir jusqu'à ce qu'ils aient acquis un  
certain âge; après quoi on finit en faisant passer  
un fil de gomme, de l'élasticité. Les derniers  
sont ceux que l'on faisait en feu, qui avaient  
une pelote, qui se tenait très-mauvais, parce qu'ils  
ne faisaient point d'élasticité.

228 De l'élasticité. Les Bandages élastiques sont des pannes  
première intention, à un namme d'usage, de  
laquelle pour en donner une idée et pour en  
qui l'on ne peut se fier, qui ne servent pas  
à même d'en faire faire les diètes. Pour  
eux l'on ne s'en sert que pour la partie  
inguinale.

Un bandage présente une arc de cercle et  
une lame d'acier qui traverse la fente de la  
de cercle au-dessus de la fente, de sorte que l'on ne l'on  
d'acier, dont la longueur doit être égale  
la cavité de la cicatrice de la bourse de  
la largeur à peu près d'un pouce, et d'une  
ligue d'épaisseur, qui en général, devant  
servir d'appui à la fente de l'indurée de  
force la volute de la bourse, qui éprouve  
se faire qu'on en est approchant toujours  
la même pour tout, augmentant de largeur à



sur sa extrémité, sur le lieu où elle doit s'appliquer 28  
sur la colonne épinière; je dis sur la colonne  
épinière parce que l'ampère s'applique à elle  
une lésion plus considérable, d'autant plus  
ce qu'elle l'adapte, et même se rendre d'autant  
après à la hernie, mais qui ne conviendrait pas  
parce que cela empêcherait que les malades ne souffrent  
de crainte, pour leur repos, qui d'ailleurs n'empêche  
rien de force, comme il le prétendait. Faut-il  
passer à l'usage, lorsqu'on est obligé de faire  
faire un bandage, au moins l'apaiser comme on  
entre le lieu de la hernie et le contour du bassin

pour la direction. qu'il doit avoir il faut  
qu'il soit tellement construit, que l'extrémité  
qui doit être appliquée sur l'épine, soit  
précisément au dessus du sacrum, tandis que  
l'autre doit être un peu dirigée vers le bas de  
manière à ce le ressort se soit point d'une  
forme horizontale, ce qui fait qu'il s'applique  
mieux. Quand à la platte qui se trouve  
par là doit être dirigée <sup>vers le bas</sup> à laquelle soit.  
incliné de bas en bas, afin de soutenir  
mieux les parties déplacées et qu'elle s'applique  
sur la partie inférieure du bas ventre, qui  
bien entendu doit être à son extrémité  
antérieure. Elle doit avoir une face antérieure  
comme on doit se trouver un petit crochet  
pour attacher l'extrémité du bandage puis  
une face postérieure comme on voit en regardant  
l'extrémité de la hernie, qui se trouve remplie de  
du linge de coton ou bien de la laine  
pour la construction du restant du bandage



229 on entoure toute l'atige d'acier de linge qui  
l'en recouvre de dedans, que l'on abat tout  
sa longueur qui doit se terminer par une  
capitule de cuir, qui doit avoir la longueur  
capable d'entourer tout le bassin, et servir  
d'attache au crochet d'ironné. A cela on  
coint au dedans de tout cela, sur la lame  
d'acier et sur la pelotte un boyau de cuir  
dans lequel s'entrouve de la laine ou de  
coton, qui doit être en général en peu plus  
épais que trop mince, crainte d'obliger  
les indexiens.

2e seconde. Il faut encore joindre à tout le bandage une  
11e Brumaire. On se sert pour les tenir maintenant, que l'on fait  
le plus ordinairement avec de la soie, ou d'un  
bandelette de linge, couverte de cette manière  
qu'au lieu de ses extrémités il se trouve une dans  
dans laquelle on passe le bandage, tant à qu'à  
l'autre il se trouve une autre destinée à être  
passée par un petit crochet qui se trouve à la  
pelotte. Il est toujours bon que celui qui  
en porte une, en ait deux, parce qu'au lieu  
au fil vient à peu de supprimez les joints  
d'humidité, crainte qu'il ne pousse, il le  
remplace par un autre.

3e comment. En supposant tout préparé pour l'application  
qu'on applique du bandage, voici comment qu'on y procède.  
On fait d'abord ordinairement le phallus d'acier  
phallus horizontal, et l'on commence par en  
la tenir si elle ne soit point, ainsi qu'il faut  
point ordinairement qu'il faut faire, parce qu'on  
l'on suppose qu'on a pour la tenir redoublée  
qui en général se redoublent en y appliquant la  
la main, qui tient un applique le bandage.



en ayant bien pendant ce temps de continuels 230  
parties entières, l'application de toute le bandage  
qui comme l'on s'en agit de bas en haut tel que  
l'auteur, ce qui est évident, car sans cela il n'y  
alloit d'appuyer sur le fémur, ce qui deviendrait  
très gênant à cause de la compression des vaisseaux  
et n'est du tout que l'application d'un frottement  
appliqué, au lieu le ressort du bandage, qui  
doit passer au-dessus de la crête iliaque, et non  
dessous ainsi que sur la fosse antérieure, à cause  
de la résistance qu'elle lui présenterait, ce qui serait  
très gênant pour faire comme dans l'autre dit, la  
pression à la frotte par le moyen d'un crochet.  
Lorsqu'il est appliqué, la malade ressentait  
trop de douleur par son application, au point  
qu'il était un peu hors de l'usage, mais il ne  
faudrait point le faire, parce que tout il  
pourrait le faire (car les parties s'échappent)  
sans joint à cela, faire un instant la malade  
dans une position horizontale, en la faisant coucher,  
et lui recommandant d'éviter tout ce qui pourrait  
le fatiguer. Par ce moyen il s'habitue à se tenir  
pâle, et le supporter la chose facile. Il faut également  
la prévenir qu'il doit se tenir pendant toute la  
durée, comme pendant le jour, parce qu'il ne  
le faisait point, même étant un peu revenue  
sur lui-même, et étranglée au point les vaisseaux  
s'en échappent. aussi est ce parce que toujours  
autres savent, qu'il arrive que les parties qui  
s'échappent se trouvent étranglées de cette  
manière, chez les personnes qui les veulent avoir  
pendant l'usage. C'est pour quoi on doit  
d'appliquer un bandage il est au-dessus



231 tous les inconvénients qu'il peut causer et ses avantages.

Cela nous amène par conséquent à dire maintenant, que la loi étoit un mélange d'acier et de fer, et non de fer et d'acier, qui pour la faire est battue à froid, qui casse assez aisément et même en la appliquant, lorsqu'on en prend point qu'on pût le pressentir.

Il faut en continuer toujours l'usage, et si que même que l'animal reprendrait son caractère ordinaire, il faudrait également le faire, parce que les parties ont des tendances à l'habitude, et les personnes mêmes qui n'ont jamais eu d'acier, lorsqu'on fait qu'on est et lorsqu'on serait sûr que l'animal ne soit repassé son caractère, cela n'empêcherait point et faudrait commencer par un peu plus de fer, et pendant qu'on tienne, puis pendant la jour, et ensuite tant en qui pourraient occasionner une apparition de nouveau, cela serait même plus chez un enfant, comme chez un adulte.

Il est des personnes qui ont dit qu'il y a peut-être une honnêteté, on pourrait penser à l'usage d'une herbe; mais on ne peut pas le faire, car on ne peut que se voir et se voir. D'autant plus qu'on s'en est vu, il n'y a point d'autre. Mais si chez l'individu, qu'il la porte de quel on voudrait, on ne peut pas la position d'acier en prenant l'acier, d'autant plus que s'il n'y a point d'acier, il n'y a point d'acier, et si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire.

Quand on a le bandage de la herbe, on ne peut pas le faire, d'autant plus que s'il n'y a point d'acier, il n'y a point d'acier, et si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Mais si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire.



bas en haut, mais ayant le ressort moins dirigé 232  
en bas.

Il peut se faire que le testicule ait deux hernies  
à la fois, mais rarement plus, lorsqu'il a deux  
hernies inguinales, une par conséquent de chaque  
côté: on a ordinairement deux bandages, qui  
alors agissent à-proposant tout le long de la même  
manière, chacun séparément. Il est des cas très-  
rars, il y a une hernie crurale et inguinale à droite  
côté, il se trouve alors deux plaques dissimulées  
en deux incisures, soit à dire après à chaque  
espèce de hernie, malgré que le ressort n'est  
traverse qu'une plus forte.

Pour ce qui regarde les bandages de la hernie  
ombilicale, ils ont également deux espèces de  
détachement et de non détachement. Les uns sont  
se servent pour une telle hernie d'une bande ombilicale  
Celle qui s'appliquoit sur la tumeur, sans la qu'on  
il mettoit des compresses graduées, qui alloient  
en augmentant de densité au-dessus, mais ce  
moyen présentoit un inconvénient, en ce que  
il agissant que sur la partie qui est une  
tumeur à se déplacer et non sur la tumeur  
de l'ouverture, celle-ci ne pouvoit s'oblitérer,  
ce qui pouvoit se faire, pourvu qu'on a bien  
fait pour les enfants.

White a ignoré cette espèce de hernie par  
l'usage seul d'une manière de manière de bandage  
qu'il faisoit et s'appliquoit avec l'inspiration  
au moyen de linge. Mais cela n'est pas la  
testicule obstruente qu'il lui attribue et qu'elle  
est si forte, elle ne peut qu'elle agit, mais son  
pu se faire et qu'elle plus elle est tenue dans  
des fesses.



233. Potas à rendre proposé de le quier par  
le moyen de la pignation d'un mélange de  
et de blanc d'oeuf, mélangé avec des éponges  
de la même manière que pour la fracture  
du col de l'humérus, qui peut présenter  
un excellent effet, en se quier à point  
et à l'usage de la gomme d'astic pour la  
mauvaise de bras, puis qu'elle a un bon  
servant l'âme.

Il y a encore comme nous le dirons  
figature, qui consiste à entourer la tête  
qui recouvre la hermine et de la bécasse  
s'est s'il y a qui couvrent les couverts au moyen  
de la d'oeuf qui s'élève la tête  
place, une cicatrice qui présente de la d'oeuf  
et s'élève à ce que les parties ne sortent.

Pour les moyens quierables de cette espèce  
de hermine chez les enfants il n'y a aucun  
il n'y a que de la d'oeuf, qui consiste à  
d'oeuf dont les d'oeuf sont de la d'oeuf  
y a de celui de d'oeuf, car les d'oeuf sont  
d'oeuf qui présente une petite d'oeuf  
dans son milieu, de côté qui doit regard  
l'abdomen et de chaque côté d'oeuf  
distances à leur d'oeuf plus annuins de  
d'oeuf de compression, puis il y a encore  
à présent fait de la d'oeuf mode, d'oeuf  
nous d'oeuf point et les d'oeuf quier  
d'oeuf de d'oeuf temps à leur d'oeuf, selon  
d'oeuf seulement qu'aujourd'hui au d'oeuf  
usage de même d'oeuf à présent que  
de hermine d'oeuf, si ce n'est qu'il y a  
une plaque de d'oeuf plus large, mais d'oeuf  
le d'oeuf d'oeuf.



Les moyens proposés pour y parvenir se réduisent à deux 231  
ils ont été multipliés, parce qu'à tout dit, on les  
détruit par la ligature ou la hernie.

Plusieurs de ces espèces, les uns consistent à simplifier les hernies  
à les réduire, les autres à les détruire.

Pour le réduire on a employé la compression,  
puis l'huile et assés au moyen d'un bandage à  
d'empêcher et de faire la réduction, on le fait réduire  
par l'usage de l'huile. Mais le moyen le plus sûr  
rien et peut exposer à qqc d'incommode, qqc de  
grave, puisque cela ne s'appuyant point à quelque  
hernie ne reparait pas. Aussi ce moyen à été  
proposé et n'a point eu d'usage.

Ces deux moyens de détruire sont de différents  
sorts.

1<sup>er</sup> On se servoit anciennement du fer rouge pour détruire  
après lequel on brûloit les parties qui se trouvoient  
dans le lieu de la tumeur. après avoir rangé les  
cordons spermatiques de cette manière. On brûloit  
de brûloit même le prolongement du testicule  
après avoir réduit les intestins, après quoi on  
employa les moyens pour procurer la chute  
de l'écaille. Cela se fit au moyen d'un fer rouge  
caustique, qui présente plusieurs diff. les uns  
étendent leur effet plus ou moins selon le  
propos. Mais on a vu aussi d'autres moyens  
à cause des inconvénients aux quels ils exposent,  
parce qu'ils peuvent interesser le cordon spermatique  
et les intestins, et par là, permettre le passage de  
matières qu'ils peuvent contenir, ce qui est à craindre.

2<sup>e</sup> La castration ou la ligature, puisqu'on veut  
faire il faut employer le fer rouge au moyen d'un  
de l'écaille à la place d'une cicatrice qui empêcherait  
les parties de se déplacer, moyen employé même

Secondes 11  
Première

2<sup>e</sup> la ligature



285 Dans quelques départements, pendant l'opération  
et qui s'appelle à peu près le même accident  
que les Caustigues.

3.<sup>e</sup> Le point  
d'apex.

Le point d'origine se fait soit en mettant  
le sac à découvert, en faisant les ligaments  
bistourneutaires, après quoi étant en la sautoir  
ainsi que le cordon spermatique, pour passer  
de sous pris de l'anneau, une aiguille garnie  
fil d'or ou de plume, dont on doit faire les  
de manière à fermer le sac. Il faut que  
cette pression n'ait pas trop forte, parce que  
cela endommage les vaisseaux qui sont au-dessus  
d'elle, et être suffisante pour presser le sac  
de la partie. La partie accidentelle du sac est  
coupée avec des Ciseaux, après quoi on rapproche  
les bords de la plaie dont on fait la suture  
la consolidation, qui sans doute n'aurait lieu  
qu'environ la partie comprime entre la lig  
étroitement comprimée et la queue se fait et est  
comprimée à pression la tige de ses vaisseaux  
devant l'atrophie et d'autres accidents, tel que  
les empyèmes.

4.<sup>e</sup> La tumeur  
Royale. H.<sup>e</sup> La tumeur Royale qui est la tumeur  
moins ancienne, consiste à mettre le sac à découvert  
après quoi le point d'origine se fait soit en mettant  
le sac à découvert, en faisant les ligaments  
bistourneutaires, après quoi étant en la sautoir  
ainsi que le cordon spermatique, pour passer  
de sous pris de l'anneau, une aiguille garnie  
fil d'or ou de plume, dont on doit faire les  
de manière à fermer le sac. Il faut que  
cette pression n'ait pas trop forte, parce que  
cela endommage les vaisseaux qui sont au-dessus  
d'elle, et être suffisante pour presser le sac  
de la partie. La partie accidentelle du sac est  
coupée avec des Ciseaux, après quoi on rapproche  
les bords de la plaie dont on fait la suture  
la consolidation, qui sans doute n'aurait lieu  
qu'environ la partie comprimée entre la lig  
étroitement comprimée et la queue se fait et est  
comprimée à pression la tige de ses vaisseaux  
devant l'atrophie et d'autres accidents, tel que  
les empyèmes.

hernie ne repaïsse.

Voilà les moyens proposés pour détruire 236  
La hernie et pour parer la guérison des hernies  
Il faut tout abandonner maintenant, si ce n'est  
la ligature dont on fait encore usage pour  
la hernie ombilicale seulement, mais en pratiquant  
pour la première fois par-dessus, qu'on l'est-  
guise dans un moment que par les élans, qu'on  
réellement elle procure la guérison de la hernie,  
ce qui tient d'usage car, à ce que les parties qui  
ont donné passage aux viscères, ont une tendance  
à s'oblitérer, se fermer aussitôt qu'il n'y a  
rien de plus, tandis qu'il n'en est pas de même  
pour les hernies inguinales et crurales, qui ne  
s'oblitérent point. Elle n'est point en  
usage, par les Docteurs à cause que ce moyen  
leur parait cruel, mais qui ne l'est cependant  
peu beaucoup. On la fait également chez les  
enfants, parcequ'ils ne sentent rien à ce qu'on  
qui peuvent faire repaître la hernie, sur-  
tout les adultes, d'ailleurs chez les adultes cela ne  
réussirait pas autant.

On demande pourquoi puisque les parties  
qui laissent passage aux viscères ont une  
tendance à s'oblitérer lorsqu'elles ne passent  
plus, on ne fait point usage de la compression.  
C'est parcequ'elle ne peut faire la plus mauvaise  
que pour les personnes d'âge, parcequ'ils  
n'étant point bien faits elle se déplace très-  
facilement qui d'ailleurs étant mal point  
susceptible de rester longtemps, et qu'on la fait  
c'est cela qui a engagé à ce qu'on fasse la  
ligature, qui est le seul moyen de guérison.



237 ont été faite, que les parties intérieures sont  
réduites, l'ouverture qui lève à l'air parage  
l'oblitération. Cette ligature qui a été élevée est  
pour les deux espèces d'hémies précédentes  
n'est plus employée pour cela, parcequ'il y a  
des mêmes les vides ne paraissent point, les  
ouvertures qui lève sont d'une manière  
l'oblitération point, parceque elle n'y a point  
de tendue.

Voici comment qu'on se fait la ligature  
pour cela. On se fait d'abord pour cela avec de la  
de la ligue, on est un peu d'un fil ciré composé de deux  
ou trois, on le place dans un lit, d'une manière  
ce qu'il ait une direction horizontale puis  
commence par faire l'acception des parties de  
cela fait, on tache de comprimer les parties  
des teguments, en les faisant saisir, qui se  
a fait la ligature en les faisant saisisse  
pour l'opération à ce qu'il y ait des parties  
plus, se fait, on applique des compresses  
en dessous de la ligue, qui l'en tienne au moyen  
d'une bande de corps, puis l'en fait saisir  
le lit au talon. On tache de le l'oblitération  
tant ce qui pourrait donner lieu à ce qu'il  
hémie repousse. On veut de deux autres  
jours, comme les parties en tienne de la ligue  
composée dans la ligature se tienne relâché, on  
mouche la supputation qui s'établit, avec  
allige de l'écoulement une peu de temps à l'écoulement  
ligature, on en veut d'un applique d'autre l'écoulement  
des teguments sont tombés, il reste une cicatrice  
qui présente à l'écoulement de l'écoulement, pour l'écoulement  
à ce que les parties qui formaient hémie



un formant pour nouveau.

238

20 Les hermes sont irrédutibles, en par conséquent les Ligaments 14  
parties qui les forment, ont contracté des adhérences irrédutibles  
entrelacées, ou parce qu'elles sont tortues entrelacées  
grande quantité et forment une masse qui en part 20. Des hermes  
plus entrecroisées, il faut que pour cette dernière irrédutibles sans  
circonstances, qu'elles soient tortues depuis un peu d'engagement  
temps, car sans cela, il est probable qu'elles  
retrouvent promptement en prenant une position  
horizontale au Malade. Dans le cas qu'il existe  
des adhérences, cela n'est point toujours très-  
facile à reconnaître: On ne peut en faire  
que si la herme était plus volumineuse, qu'elle  
ait existé et que le malade ait fait usage  
d'un bandage mal fait, les parties n'ont  
point entièrement rétrécies, alors on aurait  
fait l'un de la présence.

Dans pareille circonstance quel moyen à  
employer? Les uns ont dit qu'il fallait mettre un moyen  
de l'adieu, étant d'y pratiquer une incision irrédutible  
et de détruire les adhérences qu'il y aurait entre  
l'intestin et le péritoine: Mais il est nécessaire  
qu'on ait point toujours l'un de l'existence de  
l'adhérence pour le faire, quelquefois même on  
le croit, il faudrait point toujours, puisque  
dans la présence sans le péril d'irriter l'intestin  
la présence est de ne point entretenir l'intestin  
aussi si quelquefois cela servirait ou ne servirait  
le malade à quelques accidents, parce qu'il  
n'est point grand au by ce point toujours,  
parce qu'il n'est pas une espèce comme cela  
sans aucun effet. Ensuite il y a des adhérences  
et qu'on la fait, il faudrait le faire qu'on  
saurait, on coupe l'intestin et qu'on donne bien



239

à un autre contre nature. Aussi est-ce pour-  
 que quand même on opère de la hernie  
 est sur qu'il y a d'écarter entre les parties qui  
 l'on ne cherche point à la détruire, comme on  
 le dirait. Mais avant qu'il ne soit cas on ne peut  
 chercher à la détruire, si ce n'est dans celui où il y a  
 hernie congénitale, que l'entaille à l'ouverture de  
 nature avec le testicule. Cela a été une fois  
 pratiqué par Colledge par l'instrument qui se  
 trouve dans la hernie de ce genre et qui s'en fit après

Il y en a d'autres après l'opération qui  
 disparaissent par l'usage de cataplasmes emollients  
 aussi que de purgatifs; mais il ne faut point  
 croire qu'il faut cela, d'autant qu'on ne connaît  
 comment qu'il se produisent leur effet. Si l'on  
 qui existe. Si cependant une hernie se présente  
 à elle qu'on dit d'une hernie on peut voir le temps

Dans pareille circonstance il ne faut point  
 essayer de prendre, qu'on se fasse porter avec  
 un bandage à surface concave qui maintient  
 ainsi la hernie, et empêchera que la partie qui  
 la forme ne soit tentée et ne soit un peu soulevée.  
 Dans le cas où elle existerait au thorax, on peut  
 porter au malade un bandage suspensif. Si  
 elle avait lieu chez une femme on emploierait  
 le bandage qui conviendrait. Je même qu'il s'agit  
 d'un très considérable et que le bandage à  
 surface concave ne conviendrait pas à l'usage  
 tâche de sentir les parties avec un appui

3. Des hernies

3. Des hernies

3. Les hernies avec étranglement, sont celles  
 qui sont les plus fâcheuses et qui, sans les plus  
 d'accidents, les qu'on peut dire de l'usage de  
 au lieu de se résolvant de l'usage de l'usage  
 s'en font partie au travers de l'usage de l'usage

De l'augmentation du Volume, ce qui constitue les  
humeurs avec inflammation, et celles par  
engorgement. 240

C'est aisément à savoir si l'étranglement dépend  
de l'humour, à lieu toujours par la même cause.  
En effet, cela ne pourroit dépendre que d'une  
contraction des Ristes - le péricrân, comme elle  
est dans son traité des hernies, admet par  
l'engorgement du commencement, qui est le transport  
l'engorgement en français, de même que les contemporains  
distinguent par la contraction spasmodique des  
muscles du dos, au moyen de fibres qui  
peuvent s'y attacher, en étranglant alors le Viscer.  
De la même manière qu'il est dit dans un autre  
endroit et dater, que les fréquentes des Anévrysmes  
qui ont lieu au dessous des artères aponeurotiques,  
étaient déterminées par le resserrant des artères  
ce qui est bien contredit maintenant par les  
anatomistes qui sont d'accord à ce sujet par  
le contraire. Cela l'est d'autant plus que l'humour  
à une forme circulaire et non angulaire.  
Rougeur qui admettait cette opinion disait bien  
que les muscles paraissent déterminés à se  
contracter par l'irritation des intestins hyngatés,  
au moyen des nerfs, mais on ne peut guère  
la soutenir, déterminant le peu d'effluence  
qu'on les nerfs organiques <sup>ou les fibres</sup> des muscles de  
la vie animale; D'ailleurs si cela étoit, on le voit  
chez les enfants, tandis que cela ne paraît être  
puisque c'est chez les enfants on trouve les plus  
communément les fibres de plus à l'engorgement  
qui ont été réduites à l'état de l'ent, puisque  
l'ent, l'ent par l'usage de collaplatons  
emoulinant.



241 On a pu voir successivement la formation de hernies étranglées que par le passage prompt d'un intestin, et de l'intestin, qui avait un volume plus grand que le diamètre de l'anneau, qui l'avait forcé à esquisser le distende, qui lui ayant permis passage, résistait en vertu de la contractilité du tisse, au retour à l'élasticité, à son état naturel, qui lui permettait et produit l'étranglement.

Expérience aussi de cette manière, il en résulte à quelle trois choses; 1<sup>re</sup> resserrement des parties, 2<sup>de</sup> interruption du cours des matières dans le canal intestinal, 3<sup>de</sup> défaut de passage du sang dans les vaisseaux qui le traversent. Auquel on peut joindre qu'il survient une irritation dans la partie, qui d'ordinaire que c'est, devient animale, puisque l'Esprit ne cessant point ordinairement l'irritation des tisses il le perçoit, qui donne lieu à l'inflammation de la partie, qui détermine de la douleur dans ce endroit, à un changement particulier d'état, puis à un dérangement de certaines fonctions, par cause sympathique.

Dans quelques cas cet étranglement ne survient que dans trois des causes, soit dans la formation même d'une hernie, ou quand elle est, mais qu'elle a augmenté d'un volume plus le défaut de l'application d'un bandage mou, ou les personnes habituées de porter, comme on l'a vu dit ailleurs.

On peut se faire remarquer que l'opération se perpétue par la formation d'une hernie étranglée, tant que l'anneau persiste.

colique, qui s'enveloppera, mais on ne s'y méprendra point, en sachant la manière dont elle survient, qui ne commencent toujours à se développer que dans un point quelconque de l'œdome, puis important l'œdome sur la hernie si elle existait et la faisant rentrer.

Sauf les Malades qui portent une hernie sont exposés à éprouver une inflammation du Pérityon, par la communication avec les intestins, d'une que par les épiploons qui peuvent se trouver traités dans les moments de la sortie ou rentrée de la hernie. Cette absorption est due à l'œdome qui la empêche que l'on pourrait faire chez une personne grosse. Dans une petite hernie, qui présente un point de l'œdome, exige qu'une attention de la part du Chirurgien, qui doit par conséquent employer une assez grande quantité de ligaments avec la main, lorsqu'il cherche à la remettre. Aussi lorsqu'une personne nous appelle qu'elle éprouve des nausées, des vomissements etc., averti par chez la femme par une chez l'homme faire une possible pour flaire si sa nausée n'est pas due à une hernie qui existerait, qu'une colique, en parcourant les endroits qui y sont le plus exposés.

Locau du  
18 Brumaire

Ces moments même une portion d'intestin est épiplocon se trouve étranglée. Le malade signes de éprouve une douleur plus ou moins vive étranglée qui est d'abord faible, mais qui augmente par suite des nausées, des vomissements, qui



243  
Il faut même s'en tenir lorsqu'il n'y a rien d'autre  
l'estomac décliné par cause sympathique  
par le retour des répétitions faibles au moyen  
des mouvements anti-peristaltiques des intestins  
ou au resserrement de la Valvule de Bohn qui  
s'oppose à leur venue. Il pourrait cependant  
se faire que la nature dans laquelle intervient  
un peu séquoie seule de ces mêmes matières  
dans les intestins qu'elle, qui alors regrettent  
présentent ce caractère, et l'usage d'opium dans  
ainsi que l'abandon, le cours des matières  
trouvent interrompu, le malade éprouve des  
saignées du à l'irritation du Diaphragme, le  
pouls devient fréquent, petit et non développé.  
Le visage aminci, qui par suite devient pâle,  
allongé, la Phalange se fait sentir sous l'ongle  
la superficie du corps, de même que des  
suintements de sang, mais alternativement.

Persiste lorsque la maladie continue la  
tendance devient plus douloureuse, rouge, et  
à l'intensité de l'irritation qui se trouve augmentée  
qui donnent lieu à l'effusion de sang, au point  
temps après à l'effusion grasse de la par  
d'écoulement. Il est cependant des cas où le  
dout S. G. paraît sans que c'est lieu, et dans  
cas où l'on se trouve appelé pour venir  
à parait accident, il faut se rendre à l'appel  
les accidents qui ont lieu.

Tant que la maladie a lieu, il y a une  
nouvelle lésion dit fréquence du pouls qui du  
tant que les symptômes ne sont point dits  
mais qui finit de même que tout le reste  
la gangrène separe de parties, demandant

à impossible pour la disparition de la hermine 24h  
aussi que personnes qui expérimentent se sont  
telles trouvées, ce que ne fera point d'autre  
qui sont le fait, en se rapportant des signes  
caractéristiques, la tumeur en pareille circonstance  
petit & le grand est petit souvent, & manie  
que dans cet état les personnes affectées y restent  
un peu de temps.

Dans pareille circonstance, des maladies ont  
été assez hâtes pour échapper à la mort, au  
moyen de la raptote de l'équivalent, qui ont  
pu être de la sorte sortis d'ailleurs les maladies  
et d'une bien à son sens contre nature, & en  
cas est moins rare qu'on ne le présume, &  
surtout chez les personnes qui restent dans  
l'insouciance, qui n'appelle aucune pour la  
secours, ce qui arrive spécialement dans cette  
par l'ignorance.

André qui se trouvant à l'in, il faut  
chercher à faire rentrer les parties, qui se  
sont déplacées. Il est cependant possible  
au médecin de faire, telles que pour les  
hormes qui existent depuis longtemps & qui  
ont été et se redonne, au contraire si l'on  
y tâche, et peut se se proposer que ce qui  
est déplacé, tout, naturellement ce qui se fait  
ou au moyen d'une compression que l'on exerce  
sur la tumeur, qui forme ce qu'on appelle  
communément tumeur comme cancer  
avant point par là jusqu'à présent, que nous  
avons dit que nous en parlerons, il faut de  
dire comment qu'on s'y prend pour cela



248

Il faut pour l'exécution mettre le collade  
sur un plan horizontal. Si est dans l'air  
la faire approcher de son bord, la faisant  
voler la tête et la poitrine, de manière que les  
cuisses tendent qu'il a les jambes fléchies, ce qui  
donne une position dans laquelle tant  
les muscles se trouvent dans un relâchement  
ce qui permet plus facilement de faire rentrer  
les parties déplacées, qui se trouvent au moyen  
de l'application des doigts de chaque main  
spécialement l'indiquant de chaque main  
traverse, étant appliquée, on tâche de les pousser  
légèrement de les faire rentrer, en l'absence  
de les pousser dans le sens opposé par lequel  
ils se sont déplacés, ainsi pour l'inguine  
ce sera de bas en haut, et en dehors, pour le  
Cervical également de bas en haut et en dedans,  
pour le dos, quand à l'ombilical, on agit  
directement en arrière. Comme il peut se  
faire qu'impuissant cette méthode, qui sont  
les règles de l'art, qu'on ne parvienne point  
à faire la réduction de la hernie, on doit  
intenter de la faire rentrer par tout  
autres en allant petit à petit l'indiquer sans.

Lorsque par des tentatives on est parvenu  
à se faire que l'on désire, il n'y a  
rien de résister par ce que les hernies qu'on  
exerce. Mais la hernie peut fort bien  
commencer à donner lieu à l'augmentation de  
l'inflammation aussi est ce pour ce que les  
parties ne sont pas autant de fois qu'il faut  
avoir la précaution de l'écarter, qui fait  
mettre des cataplasmes emollients sur les



afflicté & rendre des laines de Malade les  
gens ont le plus de facilité la réduction des 240  
parties. En effet, il n'est pour la plupart de  
Bastins facilement par un moyen, tandis qu'il  
en est d'autres à l'apoplexie qui y persistent de  
Malade ne vont point y aller, et il n'est  
rien dans une position horizontale, aussi  
est ce pour cela qu'on s'est efforcé de mettre  
sur un drap, attaché à la Béquière dans  
lequel il se couche, pour faciliter la  
réduction des parties, au même temps que  
le chirurgien s'occupe de la réduction, l'acte de la réduction  
On doit y faire de la même manière autant qu'il paraît  
le supposer, car il n'est guère possible  
puant de temps. L'on doit s'occuper de la réduction  
qui ne soit point possible, mais de manière  
à ce que le malade puisse la supporter.

Lorsque le malade est hors du bain, on  
doit y recourir de nouveau, s'il n'y a point  
de danger en attendant, on peut attendre la  
tristesse jusqu'à ce qu'il y ait danger de la vie.  
malgré cela on ne parvient point, alors  
il faut au moins l'application.

Il peut arriver que malgré la réduction  
de la hernie, les symptômes de la strangulation  
puissent ce qui peut tenir à deux causes, premièrement  
au lieu de recourir de l'intérieur lui-même  
au lieu de la ouverture du sac herniaire  
de la même manière que malgré que l'on dit  
que l'intérieur se trouve hors cependant il  
ne l'est point, et la matière continue dans  
le sac qui forme hernie, s'y trouvant toujours.



247 en qui tient au vice de la saine col, au  
point il dans tous les cas comme, ceux de  
Pierres de diables en faisant l'opération de  
la hernie.

Ce vice de la saine col n'a point été vu  
de tout temps, qu'on s'est avisé de le faire  
qui n'y croyaient point, présente une autre  
à l'usage, pour faire voir que cela n'est  
possible point sans l'usage de la saine col  
au il s'agit de la saine col, d'istère pour  
lui la contraindre, qui pour la saine col  
et le diables, fait s'entendre que cela n'est  
sans l'usage de la saine col, d'istère pour  
les exemples que la pratique fait voir. Il n'y  
aucun plus intéressant s'entendre que cela  
qu'on a vu de la saine col, qui pour s'entendre de  
réduire une hernie de cette espèce, qui s'entend  
les symptômes ne s'entendent point, le  
s'entend en un mot, de quel s'entend  
cas s'entend en un mot de la saine col.

Le tout s'entend par un mot de la saine col  
s'entend que ce sont les saines col.  
anciennes, qui tiennent à l'usage de la saine col.  
intéressant ne s'entendent plus de la saine col  
comme dans la saine col, ne s'entendent plus  
autour de la saine col, qui s'entendent.  
Cela a lieu encore plus fréquemment chez  
celles qui ont une saine col de saine col  
tout autre que la saine col, de saine col  
l'usage de la saine col, de saine col  
chez les saines col, de saine col, de saine col.

qui s'accumulent que difficilement les intestins 48  
sont dans les personnes qui portent une  
tumeur qui s'accumule avec facilité et s'engorgent  
de l'air de gas. Rarement dans ce cas il  
survient une, manière pte, mais bien  
longtemps lentement.

Sous cette circonstance la condensation  
se trouve interrompue qui à mesure  
qu'elle s'augmente s'engorge et s'élève  
qui se recouvre avec elle qui la caractérise,  
la tumeur qui forme s'élève de plus  
volumineuse, ce qui tient à l'augmentation  
des matières dans et autour, et qui par  
les rapports de l'abaissement, les qui s'engorgent  
de douleur dans le lieu affecté de plus  
en plus, une augmentation en volume  
la suppression des matières fécales, du  
la faire pressurer.

Les signes qui annoncent la hernie par  
engorgement sont un sentiment de pesanteur  
dans la partie de douleur, le ballonnement de la  
des vagues, des vomissements, des matières coagulées  
elle avec inflammation, un sentiment pénible dans  
le bas ventre, des hémorrhoides, de la fièvre, etc.  
la tumeur présente une certaine résistance,  
il survient ggt ggt dans la partie avec  
une sorte de gonflement et il peut en résulter une  
au bout d'un certain temps.

Le fait qui lui doit se reproduire dans un  
engorgement, est de donner lieu à la partie  
des matières contenues dans l'aine d'écouler,

Leçon de  
16 Brumaire



2499. L'enfant au moyen de la pression que l'on  
exerce dessus avec le bout des doigts qu'on  
a fait dans qq cas un peu trop, puis par  
des praticiens qui exercent dans cette  
circonstance une compression longtemps prolongée  
et répétée, ce qui peut conduire à qq accidents  
en ce qu'il peut se faire que les parois de l'utérus  
soient avec les autres parties qui lui sont liées  
dépourvues de leur propriété vitale, ou du moins  
en partie et d'un lieu à une ressource, qui  
peut produire en dans sa nature, de ma-  
nière que l'enfant est très résorbé l'advent.

C'est dans la crainte d'y donner lieu  
que qq'un employait dans l'entretien de l'organe  
les parois des intestins de l'écoulement im-  
puissant, de l'excès de l'eau froide, de  
l'excès de friction, ou faisant remarquer que par  
ce moyen on peut la partie de l'organe  
à ce que l'on hémosse à l'organe, après l'opération  
de la hernie lorsqu'on la fait, ce qui a été  
remarqué pour les premières fois, par Ruy-  
sch et Ruyssch. Mais maintenant on s'en fait  
plus grand usage, on se sert plus souvent  
des fenestres, on y emploie plus de soin  
parce qu'on dit que les praticiens modernes s'en  
l'entretien de l'affaiblissement qui donne lieu  
à l'organe, il faut bien mieux ne point faire  
usage de tanigues, parce qu'ils ne font  
qu'augmenter la maladie de la maladie, plus  
obscurement que dans les premières opérations.

l'affection. La manière que d'après cela on  
se fait et par conséquent de l'influence auais  
lorsqu'on se parvient point à dissiper la  
matte des phlegmes contenus dans l'intestin,  
que les symptomes augmentent, et faut en  
venir à l'opération.

Lorsqu'on la pratique elle à un but différent de l'opération  
suivant l'état dans lequel se trouvent les parties,  
en effet lorsque les parties sont saines, on en  
fait la réduction, et l'on voit que quand elle ne l'est  
point, ce qu'on recommande à la suite de la réduction,  
à la suite de l'écoulement, qui est d'opérer avec  
une arête qui parvient alors la partie des  
matières fécales, qui exigent alors qu'on se conduise  
différemment.

Elle consiste à frotter les teguments, à l'aide  
d'une hernie, à ouvrir l'écoulement, puis à réduire  
les parties déplacées; on ne peut point tenir pour  
les saines surtout lorsqu'il y a adhérence avec l'intestin.

Ce ne fait point le plus ordinairement faire  
de préparations au malade, par conséquent à l'opérateur  
même, et que lorsqu'on opère on est peu près  
les suites qui résultent le plus souvent d'une  
opération, comme celle-ci n'est point une opération  
elle même et qu'elle n'est point à aucun danger  
on le fait par l'écoulement, quelque fois on fait  
écouler de l'écoulement, et l'on fait  
appliquer des médicaments sur la partie.  
Lorsqu'on décide à l'opération, il en résulte  
d'abord un fistule, dans laquelle on peut  
conduire et l'autre qui ne l'est point, une pince  
à dissiper les ligaments par le tranchant et qui  
à l'aide d'un bistouri de gougeon, dans le cas où il



2517 en avant du fil pour éviter l'hémorragie, de  
la scissure, de la charpie, de la ouge,  
ou un petit gâze par-dessus lequel on peut poser  
la charpie d'après la méthode que l'on veut choisir.  
Ces instruments doivent être placés dans  
l'ordre qu'il conviendrait, sur un plateau.

Il faut pour ouvrir, que le malade soit placé  
sur un plan horizontalement, s'il est dans son  
lit, qu'il soit proche du bord droit, tête vers  
le gauche, et que l'on place quelque soit ligature  
de corde, afin qu'il y ait plus facilement  
et de la main droite. Il doit y avoir en  
autre trois aides, deux pour tenir le malade  
commode, puis un autre pour donner les  
instruments, dans l'ordre qu'il conviendrait.

La manière de faire ainsi disposé, puis commencer à  
opérer, l'incision qu'on pratique, doit toujours  
être plus grande que trop petite, ce qui se  
peut faire par une règle établie, on dira  
seulement qu'on coupe la hernie inguinale, elle  
doit s'étendre depuis le dessous de l'aîne  
jusqu'à bas du scrotum pour pénétrer jusqu'à  
de haut du sac qu'il s'ouvrira au maximum  
l'issue cellulaire qui se trouve. Quand elle dirait  
quelque chose de l'anneau, elle doit en général  
être verticale, tant pour la hernie ombilicale  
qui est qu'elle est considérable chez la femme,  
ce qui coupe le ligament de Fallope pour  
la crèche, quand la hernie est tout à fait  
du cordon spermatique.

Quand à l'incision qu'on doit faire, on  
se la fait avec le bistouri, de manière à  
qu'il ait le tranchant porté du côté de l'intérieur.



Se autres en manière insérée. Il faut aussi  
cela que le chirurgien fasse un petit ala peau  
transversalement devant il doit faire deux  
cous à un côté, tandis qu'il tient l'autre,  
qui doit être celui du côté où il se trouve  
quelque l'ouverture soit en différents points  
qui regardent la distance, il faut enlever  
le tissu de manière à ce que le dos soit l'ouvert  
en dehors, car à l'intérieur. L'incision faite,  
il enlève de la grande, alors l'opération ainsi  
que l'aide, saisissent chacun le bord de la plaie  
qu'ils soulèvent un peu, tandis qu'ils se  
do faire, ce qu'il faut.

L'incision faite, s'il y avait une quantité de <sup>Lecan du</sup> 17<sup>e</sup> Brumaire  
sang assez considérable qui s'écoulerait, on pourrait  
se servir de l'alcool pour l'arrêter, d'autre  
protéger la plaie, qui a la vertu de l'arrêter  
ce qui suffit, en enlevant les vaisseaux, au lieu  
de la ligature dans le cas où il faudrait s'en  
servir. Cela fait on étend le sac herniaire  
ce qui donne de l'op de précaution pour empêcher  
l'interstice, de même que l'interstice, par lequel peut  
se faire qu'il y ait grande adhérence entre eux,  
qui arrive surtout dans les hernies anciennes, on  
le tient collé à la tumeur très appliqué contre  
le sac. De cette manière quand on passe à l'opération  
le distinguer. Il est deux manières de la faire  
on le peut appeler d'une seule, comme les  
qu'on introduit entre les lames à différentes  
reprises qui lui coupe avec la distance, par  
l'un doit faire plus et plus, qu'on se rend à  
trop faire en un point que le moins possible  
à la fois, par lequel on évite de faire qu'on



253 interressa le sac & l'intestin au même temps,  
On him au le point au moyen d'une pince à  
dissection, après la quelle on l'aubey l'intestin  
cylindrique, le moins possible de faire et qu'on  
coupe avec la bistouri en descendant; le moyen  
présente un peu plus de sûreté, par lequel  
on se propose point à piquer le sac & l'intestin  
On fait ensuite l'opération de la sac, pour  
il est dit. qui sont les auteurs point toujours  
autres qui, il est d'accord en effet, l'opération de la sac  
nous vient par la même fin, on l'aubey point, il est dit  
le sac / la réduction des parties de place sans cela,  
ce qui est une inconvénient, par lequel on  
se faire que cela en qu'on réduise une partie  
les parties sont égales et par là ne peut  
sans apparence et par là donne lieu à la  
mort de l'animal.

Voici comment qu'on l'aubey ce qui est  
facilité par le peu d'incision qui s'y trouve  
d'ordinaire, d'ailleurs ne présente les mêmes dangers  
il n'entraîne point d'aucune précaution la partie  
de la lèvre caudale dans le sac, puis incise,  
ce qui prouve bien que les craintes qu'on a  
y existait au été un peu trop exagérées, lequel  
comme lui soit, de les craintes point. On  
lorsqu'on voit l'animal le plus de 10 et même  
toujours, on commence par l'aubey le sac  
avec une pince, puis avec la coupe en descendant  
cela fait, on introduit une tige caudale  
au dessous, puis on le divise, ne faisant  
attention de ne point aller jusqu'à la base  
le sac on a une pince après une pince  
par lequel on l'aubey l'animal, une asg



Le fœtus ne introduit pas facilement le doigt & St  
dans l'anneau, qu'on débide avec plus de  
facilité. Dans le cas où il y a des adhérences  
avec l'intestin, on va à plusieurs reprises  
après de ne point le couper.

Les parties voisines ainsi à découvert sont  
saines, ou bien affectées de gangrène. Soignons-  
nous dans ce moment au 1<sup>er</sup> cas.

Si bien elles peuvent être libres, ou bien  
adhérentes, lesquelles sont libres sont les  
réduites facilement. Lesquelles ne le sont pas  
on est obligé d'agir d'une autre manière, et  
est des cas comme nous l'avons dit où il convient  
de débider l'anneau qui forme le sac, qu'on  
fait en introduisant le doigt de la grande camelle  
entre ce lui et l'intestin et qu'on débide, selon  
le bistouri. Seblance lui conseillait de ne  
point faire, mais de le dilater avec la pince  
à anneaux, en prétendant que la dilatation  
ainsi dilaté les parties ne seraient pas autant  
exposées à être déplacées, ce moyen est  
bon, ingénieux, il paraît être employé,  
mais il ne le peut point, car ce moyen  
ferait certainement des parties et de plus  
si l'on peut introduire la pince au point  
de faire la hernie, sans ce moyen et quel  
on ne le peut point, il faut tant attendre  
servir de bistouri tranchant. Il est encore  
avec cela des cas où on ne peut point faire  
la dilatation du sac, tandis que dans d'autres  
on le peut.

Quand on a la direction que l'induit donner  
au débiderment, cela s'appelle l'opération  
de l'anneau



255 de l'année. L'auto-ambulance elle doit être en  
de l'ambulance et à gauche, crainte d'inspiration l'artère  
ambulance qui pourroit bien ne point être  
abolitee; comme cela arrive j'att. quand il  
Percussion <sup>linguistique</sup> la percussion à l'oreille, d'ailleurs  
lorsqu'on se connaît point le mécanisme  
de la formation de cette espèce, on la prend  
ingénue in dedans, ce que les artistes jadis  
dans ces derniers temps enseignaient, mais  
maintenant que l'on sait quelle espèce de  
débordement in dedans, que par ce moyen identifié  
avec elle (les parties épigastriques) l'artère  
épigastrique, au moyen du voreum spermatique  
alors du prescript de l'affaire au l'oreille  
Cela l'opération doit encore l'oreille, car  
il faut toujours grande pour qu'elle la  
position du voreum, car l'opération in dedans  
alors l'artère étant en dedans, on la ferait  
du côté du pilius interne, tandis que si on  
ne la ferait point, par conséquent elle  
à la partie postérieure d'ailleurs elle  
épigastrique, alors on la ferait en dehors  
Haut de l'opération que l'opération au  
à l'opération l'opération, qui indiquait  
de la l'opération faire in dedans en parle  
également aussi est-ce que les l'opération  
au l'opération des exemples cités de l'opération  
de l'artère épigastrique, tandis que l'opération  
au l'opération l'opération, cependant cela  
arrivent très rarement, d'ailleurs que  
pourroit dire d'après cela qu'il n'y a  
en dedans rien indiquant point et qu'on  
pourrait faire point d'indication.



Comme on ne peut pas se passer de la hermine  
de la hermine inquiète, on s'aperçoit que pour  
l'homme, puis que la femme ne peut se passer de la  
spermatique, la règle à suivre pour celle-ci  
lorsqu'elle arrive chez elle doit être d'efforcer  
en effet, comme l'artere épigastrique se  
trouve toujours placée à la partie externe de  
l'aisselle, il faut faire constamment le débordement  
en dedans, pour quelle ne change point de position.

Quant pour la hermine crurale, comme elle se trouve  
parties d'apoplexie peuvent être adressés au  
gros de l'artere crurale, que l'on pourrait  
s'adresser si l'on ne savait point attention, il  
faut avoir tout l'attention de la hermine  
accusée puis lui fait le débordement, qui  
je crois doit être fait de côté opposée au côté  
se trouvant.

Pour faire le débordement il y a plusieurs manières  
subordonnées qui tous se rapportent au même but, <sup>comme je l'ai</sup>  
qui en général se fait de la même manière  
que pour les plaies de l'abdomen, accompagnées  
d'hémorragies que nous avons vus à en  
partir en traitant des hernies.

Il y a en l'abord pour cela l'instrument  
de Bisacaise, qui consiste en un espèce de  
titotome caché, muni d'une bascule qui  
en fait s'élever la lame tranchante, laquelle  
à l'ap de rapport le titotome caché du côté  
d'une, qui par lui être employé pour  
ainsi dire sans mouvement. On dit seulement  
à cela que pour les hernies il faudrait  
l'ouvrir, qui étant fermé ne se trouve pas



Il s'agit de même que tout d'autre instrument  
à savoir les deux susdits encore pour les  
que l'on peut très bien s'en passer jusqu'à  
des moyens plus simples. Il faut en les opposer  
que la lèvre pouvant ne point être bien dans  
la cath. continue peut occasionner la laceration  
des viscères qu'elle peut toucher.

Moran a également inventé un piston  
au bout duquel se trouve une tige qui  
sert à piquer les parties et qui permet  
de débiter l'urine, dont on peut aussi également  
se servir.

Il y a un autre de même de linge, pour  
produire le même effet.

Mais comme pour tout ces moyens, il  
faudrait les avoir et qu'on en a d'autres plus  
simples ils sont abandonnés. On se sert maintenant  
de deux autres qui sont le cathéter du piston  
avec une tige cannelée, laquelle est de  
deux sortes, l'une simple qui est celle instructive  
par elle-même peut insérer laquelle on peut  
se servir d'ostéodermis. On est d'ailleurs de  
celle qui est au large par laquelle on peut insérer  
la tige, elle insère les viscères et empêche  
à l'urine de passer la saignée qui doit laque  
piston, dans laquelle on peut insérer une  
au fait qu'il est et l'on divise le cathéter  
en deux. Comme généralement il faut le plus  
qu'on peut faire introduire la tige dans  
l'urètre sans diviser, il faut comme seule  
peut point toujours, et qu'elle peut même  
être dans un autre lieu, il faut qu'elle ne  
soit de la cavité, ne point point trop grand  
afin de pouvoir insérer la tige dans l'urètre.



en question, qui se fait selon l'impression du 288  
ou autrement de l'opération sur elle-même, &c.

Chirurgie pratique a été l'incision qui se fait  
de l'opercule pendant, et d'un seul temps. 2<sup>e</sup> On  
avec le bistouri qu'on lui fait glisser leale  
droit, lequel lui-même doit l'avoir été en  
premier lieu, en ayant soin de retirer le  
main. Demander que la partie opposée  
à l'angle soit tenue en dehors qui tendent  
la pince, et le chirurgien pratique à plusieurs  
fois le débordement, ce qui est même plutôt  
fait, que par le premier moyen.

Bel pour de le faire autrement par la  
hernie crurale, il dit qu'on peut l'opérer  
ou disant de ligament de la poche de dehors  
en dedans, au moyen du bistouri, qui coupe  
après un effort que de diviser les fibres  
superficielles, laquelle étant restée plus lâche,  
peut se réduire la hernie et quelle protège  
n'est point autant exposée à se réouvrir. Mais  
peut encore être soit en pratique en France.

Le débordement fait, il faut faire la  
réduction des parties déplacées. Pour cela, il faut  
à une règle de la quelle il ne faut jamais  
se servir, quelque soit l'usage de la hernie.  
c'est qu'il faut toujours tirer une certaine  
quantité d'intestin vers la  
hernie de manière que de réduire, puis puis  
il n'y aient pas une partie de gangrène  
et qu'on ne l'ait donnée bien au gosier  
aux matières fécales qui se trouvent continuellement  
spécialement dans celle par engagement car  
l'usage, &c. ce qu'il faut entendre et faire.



\* 259 par la lèvre inférieure. On brécute en posant  
 au moyen du bout des deux doigts indiqués  
 comme par le trait, en faisant toujours  
 reculer ce qui est resté au Derrrière du lèvre inférieure  
 sans supposer pour cela que les parties  
 corraient avec l'écoulement abessé d'écoulement, laines.  
 purement Une fois faite, il faut en faire le possible  
 différer de au minimum de ce qu'il est  
 maintenant, car étant, crainte que les parties  
 ne se déplacent de nouveau, au contraire  
 avec compression sur la lèvre affectée, ce qui  
 était certainement un inconvénient car les  
 parties qui se trouvent dans un état d'irritation  
 qui sont très sensibles, au linge qui y  
 ont une tendance, donne lieu à ce qu'on  
 appelle souffrance. Aussi ne la faire  
 plus, parce qu'on peut s'opposer certainement  
 à ce que les parties ne se déplacent sans cela,  
 par la rotation seule que les laines donnent  
 lorsqu'il s'agit de faire le trait. Au contraire  
 seulement par cette dernière (la position), puis  
 d'un petit morceau de linge fin qui lui  
 applique sur la lèvre d'écoulement, sur lequel  
 on met de la charpie que l'on tautait  
 seulement par un linge simplement  
 contentif.

Si l'on demande il faut lorsque la chose  
 est faite, d'administrer des purgatifs aux collas  
 puisqu'il paraît que les symptômes  
 de la hernie, ne disparaissent que lorsqu'on  
 met des purgatifs sur ces parties malades.  
 Effectivement si l'on avait égard qu'à cela,

ou en ferait grande aux Malades; Mais 280  
il faut remarquer que si l'administration  
en pareille circonstance, est il faut se  
faire que les matières fécales qui sont durcs  
et qui nous gênent servent à celles qui ont  
du passage de l'estomac, qui par conséquent il  
est de l'entretien de l'organisme dans l'intestin,  
que les purgatifs qui irritent les parois,  
détournent une portion de l'effort  
cette action est considérable, que par là il se  
forme qu'au moment de l'acte qui existe  
dès. Arrêt et se parer cela, que les praticiens  
ne doivent pas administrer que les  
caractères nécessitant en cela un évacuant  
peut pour les besoins par eux-mêmes.

Quant à celles après inflammation, qui  
est déterminée par le pincement d'une portion  
de l'intestin ou bien l'intestin, comme l'estomac  
que dans pareille circonstance il existe  
inflammation aux parties, quand administrer  
les purgatifs, ils ne font que les aggraver  
qui doivent pas déterminer à produire la  
gêne et l'effort qui ont été étranger, ils  
paraissent par là la division qu'elle  
administrer doit non plus d'après cela.

Si cependant on croyait qu'il existait  
il faudrait se permettre qu'en donnant  
des légers lorsque le mal de ventre, les  
portant l'intestin. Mais si on veut peut  
se remettre à l'administration de purgatifs,  
il faut dans tous les cas qu'on ait l'attention  
de faire donner des laxatifs pour



2. B. Débarasser les gros intestins, des matières fécales  
qu'ils peuvent contenir, et par là ne point  
former obstacle à celles qui passent dans  
les intestins.

Leçon du  
19 Mars

Malgré que les parties soient réduites, il faut  
faire cependant qu'elles restent toujours étendues  
par le vol du sac. L'urinaire demeure vide.  
L'urètre dit, soit qu'on passe par elle. Si l'urètre est inflé,  
ou si elle s'élargit, mais elle se dilate un peu  
fréquemment qu'elle ne l'est été, en regardant  
à son de débiter le sac. Ce qui n'est pas  
autant fait anciennement. Mais en supposant  
que cela n'est point dû, alors on recommence à  
la miction dans l'état de la maladie, aussitôt  
que les évacuations alvines ont lieu, ce qui peut  
se faire aux matières fécales d'après une évacuation. Pendant  
ce temps, il faut procurer la cicatrice de la  
cicatrice. Ce qui se fait en la traitant comme  
une autre de sa nature, qui est toujours  
très longue à guérir, qui dure même six  
semaines au plus. On doit procurer  
durant quelle se forme, que la maladie  
dure de haut, parce que cette position favorise  
la sortie des intestins par la pression pratiquée  
aussi sur ce point, qui a dit la faire cette  
dans une position horizontale, qui ne doit  
jamais s'appliquer de haut. Lorsque le malade  
commence à se lever, il faut faire attention  
à soutenir le point des viscères au moyen d'une  
bande élastique, et une fois que la cicatrice  
peut paraître, l'application d'un bandage  
il faut en appliquer un qui lui fait  
toujours porter la maladie dans le cas où  
la hernie aurait de la tendance à se reproduire.



si elle était une forte pousse. 208  
pousse si pousse, alors on ferait qu'elle  
pousse l'écoulement de mucus alors c'est tout dans  
cela.

Requons nous de dire l'application aux  
hernies les plus singulières, mais il peut se faire  
qu'il y ait d'autres complications.

Talors il peut se faire que dans une hernie  
il y ait une grande portion d'épiploon de complications  
déplacé, et par là même une tumeur amovible. Des hernies  
alors dans ce cas, il peut y avoir une tumeur si l'  
on n'a pas pu faire une portion d'intestin lésé,  
parce qu'il la pousse qu'il s'y entasse de  
contenu, dérange un peu l'épiploon.

De suite, il peut arriver qu'il y ait adhérence  
entre le péritoine et le sac herniaire, adhérence des  
d'une manière très forte, au point très peu, parties  
comme nous l'avons dit, au lieu même entre  
les parties, qu'il peut arriver l'un sans qu'il y  
ait eu inflammation, de la même manière  
que cela arrive pour la pleurésie et  
pneumonie, et les autres membres de ces  
qui ont le même analogie entre elles.

On juge d'après les adhérences qui existent  
si l'on peut réduire les parties, au lieu si  
on ne le peut point, de l'effet lorsqu'elles sont  
peu considérables, il est facile de les faire  
en séparant le peu qu'il y a d'adhérence tandis  
que quand elles sont très considérables on ne  
peut point les faire, ce qui exige le  
recours à l'opération pour le faire, à cause d'une  
portion d'intestin lésée. Il est même des  
cas où elles sont tellement liées, qu'on ne



263 peut même servir à introduire l'os entre  
le sac et l'intestin, qui se joignent alors qu'on se content  
de débiter simplement l'os avec le bistouri  
ou le couteau. Sans pareille circonstance est alors  
sur les parties intimes de l'os qu'on fait le  
pansu, qui se trouvent aux endroits des os  
extérieurs et sur les quels on fait la Cicatrice  
au moyen de l'adhérence qui se contracte les bords  
de la plaie.

Il est d'usage au lieu d'une portion d'épiploon,  
qui se trouve dans, comme on le voit, qui  
~~est~~ pincé; si cela étoit ainsi, on pratiquerait  
l'opération de la même manière et l'on la retranche  
aussi de quoi on se contenterait avec moins de peine.  
L'épiploon et l'intestin qui se trouvent  
dans le sac herniaire qui forme l'os, peut  
se trouver dans les états différents.

Dans l'épiploon peut être simplement pincé,  
ou bien il peut être gorgé; Dans le  
premier cas, il n'est que traversé par un peu de fil,  
alors, dans le cas les praticiens ont vu le fil  
à découvrir et appliquant dessus des résolutifs  
pour le faire dissiper et l'état est guéri.  
Mais dans le second cas, dans l'abdomen, dans  
la chaleur seule qui se trouve est capable  
de faire résorber cette tumeur. Ensuite  
il peut être gangréneux, dans ce cas, on  
recourrait à un état particulier qui se présente,  
qui est de le faire, par un moyen, dans lequel  
on fait que, par une très petite incision, il  
qu'on se, l'abandonnant à la nature, on laisse  
par conséquent cette portion là à découvert,



la guille en face l'infestation, en agitant  
seulement l'un ou de l'autre de ces. Dans le 864  
cas où il y a une plus ou moins grande étendue  
d'affection de gangrène, il faut se retrancher,  
parce qu'il n'y a rien de fait point et qu'on  
l'abandonnera à sa nature, il arriverait  
ce qu'il faut lorsqu'on laisse qq. un membre qd. est  
à la nature. Il est très long temps à se faire  
l'attraction et de plus on exposerait à laisser  
peu de qq. l'infestation, par les accidents qui pourraient  
survenir.

Il faut donc retrancher la partie morte, ce qu'il convient  
qu'on lui fait en la coupant, après l'avoir soignée, de faire  
s'il est possible sans pour cela faire de mal,  
au moyen de la distance, mais même encore  
avec les ciseaux. Dans le cas, où l'épithélium  
serait adhérent au tissu de la membrane, il ne faudrait  
retrancher que ce qui pourrait se détacher  
plus tard. Dans le cas où on pourrait seulement  
la tirer avec les doigts, cela serait également  
qu'on retire la partie gangrénée, et qu'on ne l'agit  
d'intérêt jusqu'à dans la partie saine, alors  
on ne le ferait qu'avec les moyens ci-dessus. Ainsi  
on se la retranchait qu'au moyen de la ligature.  
ce qui présentait un grand inconvénient. Un grand  
inconvénient, parce qu'il y a guille ne fait que  
de faire risquer le développement de l'écritatilité,  
et qui est maintenant abandonnée, et est même  
surprenant qu'on lui ait fait aussi longtemps.  
On lui est même parvenu par la méthode  
émoussée qui peut survenir par l'opération.



263 que l'on fait pour chaque Saisonne en particulier  
ou bien en embasant par plus ou moins q.  
nombres. On y parvient au coup ou lépiplon  
par frange et la compréant à qui se trouve  
entre le change interval à la fois. Et ce  
grain ne plaidait point par là, ce qu'ils  
anciens faisoient, si me semble qu'on  
le faire par plusieurs ligatures, au lieu par  
une seule, l'effet est certainement le même et  
si je puis dire un peu plus, puisqu'il faut  
se fier qu'il se trouve Des Vaisseaux & plusieurs  
qu'ils ne l'auraient été par cella; puisqu'ils ont  
très dissolles étant ligaturés.

affection de l'intestin peut De même que le piplon être  
affectionné sous les deux états. D'innommable  
est simplement que pince il présente alors  
une tumefaction une divinité dans cette partie,  
les moyens à faire dans ce cas, est de le replacer  
dans la cavité de l'abdomen, ou la Chaleur  
seule dont elle est unie, suffit pour provoquer  
la résolution et le ramener à l'état ordinaire.  
Il ne faut faire comme les anciens le faisoient  
se laisser au dehors sans chercher nullement  
à le faire rentrer, sur lequel ils appliquoient  
des résolutifs, qui certainement ne valloient rien  
pour cela la chaleur de l'abdomen. 2<sup>e</sup> Si la  
cas au il se voit gonfler, il faut l'extraire dans  
une très petite étendue, et au lieu dans  
une très grande, ce qu'on recouvre au l'opérer  
dans un peu point qui provient alors d'un  
enlever un peu. Dans les premiers cas, il



serait la pierre pour donner lieu à  
matières, qui peuvent être déjà épanchées  
en peu dans la cavité de l'abdomen, ce qui  
de cette manière, donne lieu à une autre  
autre nature, ou plutôt à une troisième  
Héréditaire; car il ne s'agit pas de voir  
est, que quand le bout de l'intestin a été  
fixé. Dans le deuxième, lorsqu'il est dans  
l'autre cavité, tandis que dans l'autre  
pourrait se faire qu'il y eût une interruption  
entre les portions qui forment la lésion à  
l'anus, mais seulement d'une autre; au lieu que  
dans celle-ci cela a lieu. Alors dans pareille  
circonstance quelle partie prendra, il le faut  
examiner, qu'on fait en établissant une autre  
autre nature de cette fois-ci, en faisant app  
parais de l'abdomen la portion supérieure de  
l'intestin, au lieu en établissant l'anus des  
matières à envisager chaque portion de  
ce même intestin, l'un dans l'autre.  
La nature peut dans certains cas le rompre. Le second  
seul des matières fécales, lorsqu'il y a peu de primaires  
portion d'intestin de gangrène, l'inférieur qui a une autre  
elle ne le peut pas lorsqu'il y en a ép; aussi dans  
pareille circonstance faut-il la reconnaître et  
établir le cas des matières résidant au lieu  
une autre autre nature. Il semble être au  
premier abord qu'il faut embrasser l'opinion  
la, tandis qu'il conviendrait de reconnaître  
ceci est encore lui qui présente la manière  
l'incertitude qu'il en présente l'opinion



207 en convulsion, tels que la digestion d'avaire ténue  
des entières. Il est évident qu'il y a dans un autre  
endroit que celui qui ordure qui sont très  
pauvres, qu'il y a beaucoup de révolutions dans des lieux  
convenables, ensuite que les malades peuvent en  
mauvais état. Un temps plus ou moins long  
sans le défaut de nutrition à cause de la faiblesse  
très grande à l'égard de la substance nutritive.  
Malgré cela, c'est celui qui lui fait encore  
le plus fréquemment, parce qu'il y a à l'égard de  
personnes qui y succombent sont, tandis qu'  
par l'autre il y en a un plus grand nombre.  
D'ailleurs pour mieux en juger nous allons  
examiner les moyens d'arriver pour cela  
l'un sera à mesure d'un appétit, la suite  
de chacun.

Le plus évident de tous les malades dans  
le tube intestinal, il y a trois moyens d'y  
arriver. Le premier est le plus ancien qui est le  
plus ancien par lui-même. 2<sup>e</sup> Celui de l'apoplexie 3<sup>e</sup>  
celui de l'apoplexie.

1<sup>er</sup> Le moyen d'arriver qui est le plus ancien  
lequel se voit en usage avec succès dans  
tous les cas de l'apoplexie. Dans l'apoplexie d'inspiration  
d'inspiration artère dans le tube intestinal par  
lequel on s'efforce au moyen de se fixer en l'air  
que les deux extrémités de l'intestin soient en  
contact immédiat. Mais c'est une portion  
de l'air, de l'air que dans les autres tubules  
animales, présente l'insensibilité de la circulation  
au lieu de l'usage maintenant à cause de  
ceci, il faut donc insister le plus possible sur l'air.  
L'opération se fait avec un morceau de cuir  
qui est enroulé et fixé de cette manière dans  
lequel on fait passer des bords de fil, qui



sortent par chaque extrémité de la carte, au 208  
nombre nécessaire que l'on veut enlever.  
faisant passer dans chaque extrémité d'intestin  
ou moyen d'aiguilles, qui permettront par là  
de les placer convenablement en tirant les bouts de  
fil, après quoi on les réunira par un cordon  
du côté où ils se trouvent. On ne fera pas tout cela  
qu'après avoir tiré les deux intestins hors de  
l'abdomen, & agrandir l'ouverture qui a donné  
lieu à la hernie, s'il est nécessaire. Contre cela  
fait, on replace l'intestin dans l'abdomen, en  
la place qu'il occupait le mieux, en ayant  
soin de tenir les extrémités des fils cachés hors  
qu'on retire les aiguilles, pour empêcher la cavitation  
ou réunion des deux bouts de ce même intestin.  
entière s'en suit.

Sur Mée

Cela ne peut être certainement très ingénieux,  
mais ne peut trop le mettre en usage, d'après  
les incertitudes qui le présentent. Qui fait d'abord  
surtout le défaut de grandeur de l'ouverture de  
l'abdomen, quand est obligé de passer d'agrandir,  
que la carte dans l'intestin est un corps  
étranger, qui peut être cause de irritation, joint  
au piquet de cause les épingles, qui sont  
un peu de petites plaies particulières, qu'on  
souvent peut s'en passer, ne peut pas être  
à cause du défaut de grandeur de l'ouverture  
qui présente la carte, et que l'intestin ne peut  
peut revenir sur lui-même facilement, qu'  
même la contraction de la manière que d'après  
cela il est très peu mis en usage.

2<sup>e</sup> Celui de la spirone qui consiste à débrider  
à l'extérieur la portion gangrénée qui tient en  
fixe les deux extrémités d'un cordon de

2<sup>e</sup> Celui de la spirone  
de la spirone







La lésion adhésive fait entrer l'intestin 890  
au d'après avoir fait entrer l'intestin.  
Mais il est à observer que cette manière  
présente également des inconvénients, en ce que  
d'abord il faut faire passer une portion d'intestin  
dans une autre, qui est plus considérable, qu'elle  
présente de la difficulté à faire, qui entraîne  
que les anévrysmes sanguins d'origine intestinale  
que l'on met en contact avec une lésion  
est qu'elle est susceptible de contracter, adhérence  
entre elles. On sait bien que les lésions se  
peuvent, comme on en a des exemples tant  
les uns, mais les conséquences présentent les  
autres, ce qui le prouve est qu'il y a des  
autres causes naturelles, que l'on a vu de se joindre  
que pendant tout ce temps, il ne paraît rien  
de matière dans cette portion d'intestin  
qui correspond du côté de l'anus. D'ailleurs  
d'autres fait le prouvent.

De manière que l'opération tant cela, l'opération  
moderne, sans se contenter de faire en même  
temps la nature, qui ne paraît point naturelle  
de l'écoulement, par la sortie de matières  
hérétiques dans l'écoulement, qui se fait avec entrainement  
au dehors, malgré les grands inconvénients qu'elle  
présente également. Il est très facile à faire  
lorsqu'il est d'écoulement, qui consiste à faire la  
petite incision de l'intestin comme la supériorité  
contre la paroi de l'abdomen, au moyen de  
fil. D'ailleurs nous y venons nous en.

Grand aux autres espèces de hernie qui se forment espèces de hernie  
à la paroi antérieure de l'abdomen, qui ont lieu dans la ligne  
le plus ordinaire de la ligne blanche, au moyen  
de l'écartement des fibres dont elle est composée.



est de tissu cellulaire, est ainsi qu'il y a les  
épigastriques pour la partie qui se trouve au  
dessus de l'ombilic et les hypogastriques quand  
elles ont lieu au dessous. Partout ailleurs elles  
forment les hernies ventrales, tant antérieurement  
que sur les parties latérales de cette cavité, qu'il  
est difficile de reconnaître, surtout elles sont difficiles à  
reconnaître, à cause d'abord qu'elles sont  
que très petites dans le commencement, puis  
parviennent à acquiescer un volume considérable  
que longtemps après, puis ensuite que l'écoulement  
qui donne passage aux parties, présente  
un trajet tout sinués, par l'entrecroisement  
des fibres cellulaires, qui forment souvent les  
trous musculaires qui se trouvent sur les parois  
de l'abdomen.

Lignes

Les lignes qui se font reconnaître sont  
les mêmes que pour les précédentes.

Reconnaître faut le redire, en même temps  
que l'on doit tâcher de les maintenir réduites.  
C'est dans ces cas où elles présentent des difficultés  
pour parvenir à faire la réduction, à cause  
du trajet tortueux que présente l'écoulement qui  
à donner passage aux parties. On les maintient  
également à l'aide d'un bandage. On doit alors  
que l'on voit l'écoulement qui a donné passage à l'épiploon  
et à l'intestin présente des cloques, qu'il faut  
en formant des espèces de vésicules, en même  
temps d'une très considérable au  
dessus de la parois inférieure.



Peru de bras latique

292

Elle a été reconnue bien à cause d'un  
dit d'un que lui présente cette substance,  
joint à la résistance des parties du Bassin.  
On en a quinze très petit nombre d'exemple,  
la premier qui a été rapportée est celle  
qu'indiqua Haller dans sa collection de dents  
qui fut observée par Papin la quelle étoit  
très volumineuse, quoiqu'elle contenait presque  
la moitié du tube intestinal, mais en général  
elles sont très petites. Comme en Indigne  
bien encore un exemple, mais qui pourroit  
être la même, d'après tout ce qui est indiqué,  
qui d'ailleurs ne le prouve pas, au contraire ne  
le dit pas. La plus intéressante que l'on ait  
dans ce moment, est celle d'après laquelle  
parle dans son traité d'aprication.

Signes

Maisant en cherchant très difficile à  
reconnaître à cause de la petitesse qu'elle  
présente, qui le plus souvent sont toujours  
de plus en plus, et qu'au plus il y a une grande  
quantité de parties supérieures qui la reconnaissent,  
qui sont différentes d'elle.

C'est tout

Par la même que le plus souvent  
on les reconnaît par les causes indiquées,  
il seroit très difficile de les réduire, qu'on  
ne parvient guère à reconnaître qu'après  
la mort, au moyen de l'inspection extérieure,  
au moyen d'un examen de l'extérieur de la tête,  
à cause de la position, la quelle  
si elle n'est bien, je crains qu'elle soit très-



273. *Brachyopoe à titragelement, du genre des apes*  
*à nouveau apocryptique, comme dans l'ingén*  
*l'écadé orucala.*

*Legende*  
*72 Première* *Parie du trou d'Alaire.*  
On l'armentre très rarement, exprimant  
Comme l'ancien et garnit en supportant  
Des exemples. Cette l'acte tient à la grande  
quantité de parties mobile qui enserment le  
trou, allaire intérieure, qui sont le s'effusé  
obturateurs antérieurs, le s'effusé de. qui d'ailleurs  
se trouve rétrécit par le moyen du ligament  
obturateur qui se l'acte qu'une petite l'acte  
par la quelle passe les l'actes et s'effusé  
l'acte par la quelle peut passer les parties, qui  
pour être à l'apocrypte d'obturateurs sont alligés  
de la l'acte entre les anneaux et l'actes, et  
qui est très difficile.

*Ligament*  
On la reconnaît à la présence d'une tige  
soutre nature au p'tist de l'acte et à sa part  
supérieure; qui peut disparaître par une position  
horizontale au moyen de la pression. Elle est  
dans les cas où elle ne peut point entrer ou  
en s'effusé et qu'une chirurgie habile l'effusé,  
quel en allait faire l'actes au moment où  
elle disparaît en examinant l'acte il s'effusé  
point de l'actes.

*Cratium*  
L'acte à p'endré étant reconnu, s'effusé  
s'effusé, au moyen d'une position sus-math,  
à la pression de l'acte s'effusé. Dans le cas  
où ne peut point parvenir à la l'acte  
on s'effusé très habilement par la manière  
de s'effusé les parties, du la présence des  
vaisseaux qui traversent cette s'effusé, qui d'ailleurs



l'un à une amorce, que l'on étoit - 94  
cependant étoit ~~elle~~ faite par ~~l'usage~~ en  
un usage de ~~l'instrument~~ de ~~la~~ ~~main~~, mais dont  
cette part d'usage, à cause d'un peu de longueur  
qu'il présente relativement à la profondeur  
du trou.

### Perçoir de Serrin.

Il est tout à fait de même que les précédentes si l'on excepte  
chez les deux sexes; entre la Vierge et le testicule. ~~chez la femme~~  
chez l'homme. puis entre ce dernier et le  
vagin chez la femme. Il faut quand elle se tient  
qu'elle soit en position le Serrin, pour  
former un sac hermaïque, pendant que l'usage  
du colostrum de l'air se trouve également.  
Il est nécessaire qu'elle ait les bras  
Vierge aient parcouru certaines étendues de  
vieu recouvrent qu'on que traits ou qu'on  
enveloppes rapporte l'ovelle, Bronche de  
encore et d'usage en recouvre celle qu'il rapporte  
qu'un moment ou il étoit entrain de pratiquer  
l'opération de la taille, ce qui l'entraîne au  
premier abord, mais les traits furent  
cependant avantageux.

Les lignes auxquelles on se croit introduit Serrin  
devait de même que dans les autres espèces  
de hernies une tumeur de.

Reconnue, il faudroit l'usage d'un procédé entièrement  
la réduction au moyen de l'air de l'usage  
les parties d'usage par les en haut. Le doigt  
introduit dans le vagin ou le testicule peut



775 Le ~~jaour~~ <sup>jaour</sup> ~~des~~ <sup>des</sup> ~~saies~~ <sup>saies</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~maintenant~~ <sup>maintenant</sup> ~~en~~ <sup>en</sup>  
un bandage semblable à celui que l'on applique  
pour la hernie de la Vessie ou du Sein. Il est  
probable d'après ce que rapporte Sennert que  
pauvre y avoit étranglement, alors les voyes  
communes à remplir sont le débordement, qui  
se condamnait à s'écouler. D'abord de la manière qu'il en étoit  
s'il y avoit étranglement par une incision, après quoi on débordoit  
et il étoit possible avec le dilatateur de l'abaisser  
et le malade seroit guéri de suite comme  
pour l'opération de la talle. Il ne faudroit  
lui permettre de sortir de son lit avant que  
la plaie fut cicatrisée, et sans avoir pris la  
précaution de lui appliquer un bandage  
de supposer à l'effort que les intestins feroient  
pour s'échapper.

### Hernie Vaginale

Cette hernie n'a pas été connue de tout temps  
Garrugat est le premier qui l'ait remarquée  
sur une femme qui avoit eu plusieurs enfans  
qui n'ont également arrivés aux filles comme  
aux femmes. Elles peuvent se former dans  
les parois du Vagin, à sa surface supérieure  
et encore à une distance plus ou moins éloignée  
de l'orifice de la matrice. Dans ce cas il y a  
par conséquent des fibres du tissu du Vagin mais pas  
de cartilages, de même qu'on voit la membrane  
se former qui se trouve détachée. Elle peut  
être formée par les intestins, ou bien par  
l'expulsion d'un corps par lui-même et haute  
durée temps.



Les signes qui survient la suite recommandée, 1778  
sont la présence d'une tumeur dans le vagin. Signes  
qui sont généraux pour la gène de la circulation et pour  
l'accouchement, causé d'une manière que la plupart  
des autres espèces de hernie par les efforts. Causes  
que la maladie aura faite, soit par un abou-  
lissement de la robe, par un empêchement de l'écoulement  
par la lèvre certains fardes, ou bien par les  
secours, les chutes etc. Il est bien d'observer  
remarque que pour qu'elle ait lieu, il faut  
qu'il y ait un relâchement dans le tissu du  
vagin, ou bien encore que les autres  
endroits par les quels se forment les plaies  
communément hernies, présentent plus de résistance  
qu'à l'ordinaire.

Une fois qu'on est bien sûr de son  
existence, il faut tâcher d'en faire la réduction  
qui une fois qu'elle est au moment de se faire  
déplacée au moyen d'un pessaire de gomme  
élastique, qui a une figure à l'ongle, perle  
à son milieu. Il est rare qu'elle ne soit  
il y a tout lieu de présumer qu'elle se formera  
soit d'irritation, ou d'obstruction du vagin  
qui n'est point formé par une apoplexie.  
Quand on se voit cela arriver, et que dans la  
manière de l'accouchement il faut tout alors  
l'impression de la réduction, se placant  
la tumeur d'une manière à ce qu'elle occupe la tête  
et la partie dirigée en bas, tandis que les



277 L'usage se trouvait élargi, au moyen  
de la paille qui servait fléchir, ce qui permit  
à tous les Vénus de l'abandonner. S'attachant  
relâchant, et par là facilitant la réduction.  
Si au contraire, parait il faudrait s'en  
le rectifier au moyen de l'assouplissement et on  
aura recours à l'assouplissement et à l'assouplissement  
d'assouplissement. On a vu mille exemples de  
débilité à été fait. Les parties qui forment  
hernie paraissent être comprimées dans la  
mouvement que le fœtus se trouve encore dans  
la matrice, et bien plus tard dans l'organe  
lorsqu'il contient l'opérateur, et qu'il dans  
la suppression des règles ou l'absence.

### Hernie de la paroi postérieure

Second  
23 Brumaire

### Hernie Lombaire

C'est la seule qui se forme dans cette  
la quelle pourrait être placée parmi les hernies  
ventrales, mais quelle de la forme par aucune autre  
naturelle. Elle n'a encore été observée qu'une  
seule fois, au lieu d'être observée  
rapportée par M. le Pêre. Si elle existait,  
entrerait entièrement dans celle-ci.

### Hernie de la paroi supérieure

Elles sont très rares chez l'homme, quoiqu'il  
y en a quelques exemples rapportés par Haller  
chez qui elle se trouve devant; mais elles arrivent plus  
particulièrement chez les animaux, spécialement  
chez les chevaux, par le mouvement horizontal de  
la tête, ce qui expose la visière abdominale  
dans le mouvement qu'il fait, que dans les



faison accélérer au retarder à notre gré. 278.  
Il est cependant pas rare que l'on  
en aient d'autres plus près de soi. 279. quels  
chies en ont 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Lorsqu'elles ont lieu, elles peuvent se  
former par les ouvertures naturelles au  
sein et travers les fibres du Diaphragme  
se trouvant comprimées. Mais résistent toujours  
les causes symptomatiques, qui sont les plus  
ordr. qu'on trouve peut-être, et qui tiennent  
sans doute à la compression que forment  
les vaisseaux de l'abdomen et les poumons sur  
le Diaphragme.

Ces causes reconnaissent le plus ordr. qu'on trouve  
l'ouverture vasculaire, qu'on voit y avoir lieu  
qu'on trouve les symptômes qui paraissent les faire  
provenir d'une cause allée. Les  
parties qui les forment les plus ordr. sont  
les vaisseaux et le cœur. C'est  
pourquoi les faire provenir, sans paraître  
l'affirmer. D'après ce qui précède les  
personnes qui en ont une sont un symptôme  
de l'abdomen et de l'abdomen. C'est  
l'abdomen, qui a lieu surtout lorsqu'il  
est tendu et dur. C'est  
à lui lorsqu'il est plein d'aliments, ce  
qui se sentait facilement, à la difficulté  
de respirer et 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



299  
L'effort transporté dans le centre de l'apophyse  
de la classe.

Il n'y a aucun moyen à faire par lequel  
l'effort même ou secret sur qu'elle existait  
ou ne pourrait point aller prendre le pas  
et les lésions de dans la poitrine. En supposant  
même qu'il y en eût un, le moyen qu'il y en  
giverait plus d'un, le moyen qu'il y en  
à faire et serait de pratiquer une ouverture  
à la partie antérieure de l'abdomen et d'écarter  
l'ouverture qui dans ce passage aux parties  
mais au bout d'un certain temps, l'effort  
d'une espèce de hernie produite par  
les viscères qui se trouvent contenus dans le centre  
de l'abdomen.

### Hernie de l'estomac.

Il n'est point impossible de concevoir, comme  
que depuis le siècle dernier, qu'elle se soit tant  
que celle de l'épiploon et des intestins l'épiploon  
cela tenait dans d'autre au volume considérable  
de ce viscère, car on ne pourrait l'avoir dans  
point d'imagination qu'il pourrait en former.  
Puisque que sans avoir lieu, il conviendrait  
que les parties soient dans un état de repos  
d'attente, qui ne peuvent être l'impléant  
puisque au contraire, l'effort de l'estomac  
qu'il y ait une ouverture existante, soit par  
le diaphragme, soit par les parties de l'abdomen  
ou les viscères, à la tumeur qu'elle forme  
qui diminue et augmente alternativement, dans  
l'état de plénitude ou de vacuité de l'estomac  
en effet lorsqu'il est distendu par des aliments

Signes



elles ne se font point senties par conséquent 280  
ils se retirent de l'endroit qu'ils occupent.  
Il faut être très attentif pour les reconnaître  
car on ne peut tant au plus juger de leur  
existence, que pour celles qui ont bien attesté  
et pour celle du Diaphragme comme  
dans les cas d'joint au sentiment de  
douleur qui s'élève dans le thorax et à quelque  
forme les parties lorsque le malade est en  
couché et qu'on le fait tousser.

C'est à Gargot à qui l'on doit la découverte qu'il y a  
communication de cette espèce de fistule avec la  
cavité du péricard. que ne les communique pas au fait par  
singulierement il est bien de raconter l'histoire.

C'est un jeune homme d'âge de  
Chirurgie qui rapportait une depuis les  
premiers amis de sa vie, lequel était  
d'origine aussitôt qu'il avait mangé un  
pâté lorsque la digestion commençait à se faire  
de vomir, qu'on ne savait à quel attribuer  
lequel de consultation pour cela à l'hôpital de  
qui venait commencer par la cause, tard de  
Paris qu'on s'attendait, puis qu'il voyagea  
après pour tâcher de dissiper cela, qui fut  
quantité de chose et tout infructueux. Enfin  
ce ne fut qu'un jour qu'il traitait à la  
cave des herbes, que l'élève qui y était  
cra d'après ce qu'il entendait dire de l'histoire  
que ce pourrait être une hernie de poitrine,  
il l'essaya Gargot l'ayant examiné la hernie  
qui au moyen d'un bandage qui était étroit  
une compression sur la tumeur qu'il sentait.





que l'épiploon et les intestins factant. 288.

On ne peut pas que ce la s'empare au  
parcilles circonstances à cause de la grande  
quantité de parties molles qui la composent.  
Si cela était il faudrait en faire la section  
et le reste resterait dans les cas précédents.

### Bernie des Ombres

On la remarque très rarement, on n'en  
a que deux exemples, une rapportée par  
Pac et l'autre par M. Lachet. Elle se  
trouvait chez une femme. Cette dame une  
petite fille, qu'elle tenait bien et l'autre  
par l'autre cadavre. Celle de la petite  
fille existait au dessus de l'ombilic, au dessous  
par lequel l'air était passé. Comme on  
ne peut que s'expliquer d'un certain nombre de  
cas dignes d'être de moyen particulier.

### Bernie de la Matrice.

Cette espèce de bernie n'est point absolument  
rare, il y a déjà longtemps que les médecins en  
ont rencontré. Depuis Chopard et Desart  
dans ces derniers temps et même plus  
nouvellement M. Lalme à la Salpêtrière.  
Il y a des femmes qui en ont une, qui malgré  
cela au bout fait des enfants, on n'en a  
qu'un exemple d'une qui en fait deux.

On la reconnaît par l'état dans lequel  
se trouve la grosse, si elle avait lieu  
on l'enquêterait la matrice, qui se  
palperait la tumeur qu'elle formerait, on la  
reconnaîtrait un titre particulier qu'il  
est composé, l'écrite en introduisant



288 le doigt dans le vagin, au changement de  
position du sac, qu'on ne pourroit  
sentir dans certains cas. Si elle formoit un  
tumeur considérable et que l'écoulement  
en fût tel, ce qui arrive presque toujours,  
on pourroit plutôt, enlever le sac par un  
couteau qu'il pourroit exciter.  
Le moyen de prendre dans cette circons-  
tance de l'écoulement de la racine, et de la  
Lenture au moyen du bandage. Si le  
de l'accouchement étoit pour la femme  
accouchée, il faudroit y faire une  
incision et tirer le fœtus.

Le second. *Revue de la Vessie.*  
*U. B. d'urinaire.* On croiroit au premier coup d'œil que  
cet organe est le même à l'état de  
santé, ce n'est pas tout à fait. Déjà par un  
examen depuis que l'on s'est occupé de  
l'écoulement, c'est elle qui la fait la dernière  
de toutes. C'est, d'ailleurs, la première qui  
au elle présente un minimum dans lequel il y a  
assez souvent plusieurs exemples, qui font très  
intéressant. Elle peut se faire dans diffé-  
rents cas, par l'urine, l'écoulement de la racine  
de la vessie, la ligne blanche, par un écoulement  
de la vessie, puis par le vagin et le col de  
la vessie.

Signes

Il faut que la racine que l'on  
sent pleine d'urine, parce qu'alors dilaté  
par lui, ce qui est évidemment plus au moment  
autrement les douleurs en elle se font sentir  
tandis que le contraire a lieu lorsqu'elle

Viude. On presume que si elle est  
bien au-dessus des autres, il faut que son  
racis soient dans un état de l'air, et  
est à observer que quand elle se trouve alors  
la tension qu'elle forme disparaît. Quelque  
soit le bien par lequel elle se forme, jamais  
elle ne peut être trop ou trop petite.  
parce que pour cela il faudrait qu'elle disparût  
de la partie, lesquelles forment par elle  
des parties ensemble. Il est rare quand elle  
est bien que les fonctions de la vie soient  
interrompues et qu'il y a rétention d'urine,  
cela arrive souvent, mais alors est qu'il y a  
une chose qui surpasse le canal de l'urine.  
On la laisse encore à l'urine d'urine.  
que la maladie s'empare aussitôt que la  
l'urine au point de la presse, on introduisant  
le doigt dans le vagin au lieu dans le  
Rectum, ce qui tient à ce que quand les  
parois de la vessie se trouvent rapprochées  
elles sont qu'elles sont distendues, alors la  
vessie se contracte, de la même manière  
que cela arrive lors que nous prenons une  
grande quantité de boissons, puis qu'elle se contracte  
tout de suite. 284

Elle est réductible, au lieu elle n'est  
point, dans le cas où elle l'est, il faut en  
faire la réduction le plutôt possible, puis  
de suite maintenir la partie à l'air.  
en un bandage. Dans le cas où elle  
n'est point, que les parties de la  
strangée, on demande quel est le point



285 Qu'il faut prendre, les uns ont dit qu'il  
faudrait dans ce cas en il se trouve une  
certaine quantité d'urine dans la vessie  
y faire une ponction, ce qui permettra  
qu'elle rentre de suite; mais ce moyen  
défectueux en ce qu'il n'est point sûr  
qu'il se trouve dans la vessie qui produise  
l'étranglement mais bien le recouvrement  
partiel ou total qui l'étranglement. Il faudrait  
d'après cela recourir aux autres moyens  
indiqués.

[illegible]

C'est qui se passe à mi-les muscles du 8.  
C'est chez une femme, qui venant se voir  
par la fin de son perron au dessus d'elle,  
tourna fortament la tête, la quelle ne pencha  
la ramener, et se dissipa par la suite, quand  
à celle qui pourroit se former aux membres  
il dit 19. qu'un muscle se détachant en deux  
autres, que supposant à la contraction  
fortament, alors il se rompra par le coup  
et formera deux en glissant de l'intérieur  
dans le quel il se trouve, de la même manière.  
que l'on ferait glisser un corps entre les  
doigts; mais on ne peut guère prouver  
cela; aussi cette opinion n'est elle pas  
devenue à cette etc. Hætorius veut  
combattre par le Cat, par la respiration  
qu'il fit à ce sujet.

~~Après l'opération de l'opération~~

## De Ulceres.

La plupart des Sabbatagistes entendent par  
ulceres une solution de continuité ancienne,  
qui donne du pus; de sorte que d'après cela,  
tant les plus anciennes sont des ulcères  
et puisqu'ils suppurent, ce qui n'est point  
puisque il peut se faire qu'une plaie d'âge de  
plusieurs mois sans que par là on soit  
malade, telle qu'on le voit par celles des  
bras, à qui il faut toujours être long pour  
guérir la cicatrise. On doit entendre au  
général par le mot ulcere, une solution



287

se continue. <sup>intérieure</sup> ad. au même, continue par  
une cause permanente. je dis ad. au même  
parcequ'il y a des lésions <sup>général</sup> des lésions  
récentes qui peuvent être considérées car ayant la  
caractère d'un ulcère, s'il y a qq chose de  
l'intérieur, en faisant quelque chose qui ne se  
peut deviner, une plaie, dès que le virus  
existe q. d'intérieur et que le virus se  
détache. C'est ce qui avait d'ailleurs au même  
de la distinguer de simples et en conséquence  
cette manière de les considérer est vicieuse, par  
ce qu'il y a des ulcères simples, ne sont que de  
vraies plaies, tandis que les complications  
à propos parler de.

ce qui fait  
que la phthisie  
est souvent  
mortelle

Qu'on ne considère les phthises, que par  
une affection chirurgicale, parcequ'il y a  
une maladie locale, cependant cela est en  
trop restreint, parcequ'il y a qq chose  
d'intérieur, est ainsi q. que la phthisie  
pulmonaire, qui existe dans une affection  
des plexus et un ulcère, qui empêche  
le fil de sursaut qu'il y a parcequ'il ne peut  
y appliquer des remèdes car à cela qui la  
diffère d'extérieure, qui en changeant l'air  
et les remède, en une plaie simple, ce qui  
d'ailleurs est d'autant plus facile qu'il y a  
empêché le contact de l'air sur lui, au  
moyen de la respiration, que les plexus  
sont, est ce qui fait qu'il est presque  
toujours mortelle.

Malgré que nous avons dit que les  
phthises pouvaient être plusieurs systèmes, esp.



7<sup>e</sup> C On ne les considère que dans trois qui sont la  
peau, les membranes muqueuses, et les os, qui 288  
dans cette dernière circonstance prouvent le nom  
de Carie, dont nous traiterons dans un autre  
ouvrage. Il est bon de faire l' distinction  
de ce qu'on nomme ulcères, d'après certains  
petits pétéchies qui affectent la peau, lesquels  
doivent être étudiés dans l'étendue des affections  
après telles sont les dartres, la teigne, la gale.

Les ulcères que l'homme complice de Locum Dei  
Vera, ne doivent cependant point être considérés 76. Première  
ainsi, parcequ'ils ne font point une complication  
de la maladie, qui ne sont déterminés que par  
une malpropreté, les puerances inaltérables.

Les ulcères sont les Maladies les plus fréquentes  
en chirurgie, et de qui on est cependant le moins  
d'avis d'avoir occupé, ce qui est très manifeste,  
aussi est ce sans ce rapport que nous nous y  
arrêterons un peu plus qu'il a fait, lesquels  
doivent être traités d'après les causes qui  
les produisent et les déterminent.

On ne pourra distinguer les ulcères ~~de~~ Division des  
en deux classes, en ceux des parties molles et en ~~de~~ ulcères  
ceux des parties dures. Ceux des parties ~~de~~ Classe  
molles sont ou essentiels, ou symptomatiques,  
dans les quels parce qu'ils ne nous occupent  
en même temps ceux de la peau et des membranes  
et les os. Parmi les symptomatiques, ceux de l'ulcère  
une d'entre eux qui parlent des Maladies des parties molles  
qui les déterminent. Les différents  
d'après les causes qui les produisent en cinq ~~de~~ genres.



1<sup>re</sup> D'après l'analyse on rapporte aux Déterminées par  
 les causes ou des causes locales, soit par physique, soit par  
 y rapporte aux causes dans le 2<sup>e</sup> cas qui ne dérivent d'aucune cause  
 locale physique par l'ancienneté de la maladie. 1<sup>re</sup> une personne  
 qui porte bien mais elle porte une plaie qui  
 2<sup>e</sup> Cas produit par une plaie qui se guérit, quoiqu'il paraisse  
 par une cause ou d'un caractère, à cause des fatigues qu'elle  
 entraîne qui dérange la mauvaise manière de vivre. 1<sup>re</sup>  
 devient comme continue à se tenir debout. On range dans  
 cette catégorie 3<sup>e</sup> cas qui sont déterminés par une cause  
 locale, ou générale, ou d'un caractère, 1<sup>re</sup> une personne  
 qui fatigue qu'elle générale, ou d'un caractère, 1<sup>re</sup> une personne  
 fait une excitation au lieu d'une autre chose  
 légère, alors il se développe dans cette partie  
 une inflammation plus ou moins considérable  
 3<sup>e</sup> Cas produit qui est d'un ulcère, malgré qu'il soit  
 par une cause locale ou générale, 1<sup>re</sup> une personne  
 locale ou générale, le quel est très difficile à guérir  
 et c'est ce qui a fait dire qu'il est permanent  
 à une mauvaise charité, qui a lieu dans  
 le sac à quoi est attaché, puis par la cause  
 générale, quand à la locale on voit qu'elle  
 est le plus ord. d'une manière typique  
 1<sup>re</sup> Dans la suppression des écoulements chez les  
 hommes il se développe des ulcères d'après  
 les écoulements. Dans les affections de la rate, on  
 remarque qu'il se développe qu'il est une  
 infirmité, dans la phlébite il n'est point caracté-  
 4<sup>e</sup> Cas produit d'un ulcère aux environs de la cause. 1<sup>re</sup>  
 par une affection de la cause. 1<sup>re</sup> une personne  
 organique de la cause. 1<sup>re</sup> une personne  
 par une affection de la cause. 1<sup>re</sup> une personne



existent le Visc. Dartreux, Aphorisme 29<sup>e</sup>  
grandes signes cep? ne semble l'avoir annoncé.  
Enfin dans le 5<sup>e</sup> c'est accompagné d'une cause  
interne inconnue tel que le Visc. le Scroph. le  
Scroph. Les autres ces diff. se rapprochent  
d'ailleurs ne peuvent différer que par une cause  
cause locale, développée dans la partie telle Visc. Scroph.  
qui par l'affaiblissement par une cause interne  
s'aggrave et devient d'une Dartreux cas, et à l'in-  
fluence aux membres inférieurs, ce qui a  
que les parties au une très grande tendance  
à s'aggraver par la présence du grand Visc. Scroph.  
puis en outre à ce qu'ils sont plus exposés à être  
affectés par les agents du dehors.

On peut très bien savoir une grande conséquence  
conséquence du Visc. qui affecte un membre, soit en face  
ou quelque sorte quel est son espèce. Les  
et chez Scroph. se rencontrent le plus souvent  
aux genoux, aux hanches, les Scroph. aux  
coudes, et se rencontrent encore très souvent  
au Dartreux, au Visc. les Dartreux aux mains  
les Dartreux s'aggraveront par une cause con-  
stitutionnelle et non qu'ils ont plus en eux  
Visc. a été appliqué, aux mains à la face  
et dans les autres endroits où ils se trouvent  
reconstruit par une de parties molles,  
s'ils attaquent les membranes une qu'une, est  
alors à la face, au sein du palais, au  
se manifestent, ainsi que dans les foyers et les  
Visc. Dartreux de constitution peut être dans  
certains cas regardé comme une ulcère tant  
les plus qu'ils l'ont qu'ils existent. Visc. Scroph.  
après cela se rencontrent une Visc. interne, ce qui est







afferte de gène & de l'écou, soit du scrophuleux, 292  
du gène, du scrophuleux. C'est ainsi qu'on  
l'état de la blancheur de la peau, la mollesse, la  
palme de la face, l'écartement des aillies d'un  
côté ou de l'autre, le scrophuleux &c. Il faut aussi  
avoir égard à l'état antérieur du malade.  
C'est ainsi qu'on en fait l'écou. C'est  
est ainsi qu'on en fait l'écou. C'est  
à l'aspect qu'on présente l'écou.

Examen en particulier des différents degrés de  
gène du scrophuleux des parties molles  
Ulceres des parties molles  
Ulceres des parties molles

On a eu peu de gène gène. On a eu peu de gène  
d'ulceres de ce genre; l'effet a été d'ailleurs par une cause  
précédemment qu'on n'a pas pu voir, ou d'ailleurs  
comme tel, de gène ou comme tel, de gène ou comme tel,  
qui n'est que l'effet et non la cause de la  
maladie. Il en est de même des ulcères d'ailleurs  
qui sont ceux des parties superficielles tout  
dit ainsi, tandis qu'on ne dit pas d'ailleurs  
qu'on ulcères avec l'écou, c'est à dire ceux qui  
les parties d'ailleurs qui entrent dans la composition  
de la face sont gène de sang, qui peuvent  
former des ulcères d'ailleurs.

On doit ensuite avoir égard à l'aspect que  
présentent certains ulcères, tels que l'écou  
qui ont une figure ronde, que l'écou d'ailleurs  
est à dire, en un mot, en un mot, en un mot,  
l'écou en changeant la figure au moyen  
l'écou. L'écou, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire,







diver d'après, qui on donne lieu à la fonte du  
tissu cellulaire de la partie affectée, qui supprime  
déterminer la délimitation de la peau, de telle sorte  
manière que d'après cela, elle se trouve  
entièrement séparée. Les parties sous-jacentes  
dans une étendue plus ou moins étendue qui  
ne peut s'y réunir malgré la compression. S'agit  
d'un cancer d'assez avec des moyens curables.

Cette circonstance a lieu spécialement à l'égard de la lésion au il  
existe. Op de tissu cellulaire grasse, lorsqu'il atteint l'épiderme  
la face, au-dessous de l'incision, au-dessous  
dans les aréoles, aux environs de l'anneau;  
Cela peut également avoir lieu dans tout  
autre partie du corps. On doit s'efforcer  
pour cela s'il se manifeste à un moment,  
dans le cas où un emulsiion peut être, la  
laine qu'il occupe, il s'absorbe d'après,  
si cela a lieu d'après un temps.

Le traitement qui convient dans ces espèces  
d'ulcères est très simple, puisqu'il consiste  
dans la délimitation de la peau, par la destruction  
du tissu cellulaire, qu'on ne peut la prouver  
il faut fonder la peau et enlever les  
cancéres. Pour cela on se sert d'instruments  
tranchants, ou bien de caustiques, mais on  
a préféré de premier par conséquent enlever  
ce qui causait, tandis que par les autres  
au risque d'entraîner la partie profonde  
en les appliquant, on provoque l'ulcère  
pour les régresses quantités.

20. De la Viscérite intestinale.  
Ne pouvant être due à l'affection d'un organe



29) plus en main etoigne, et que par conséquent  
os; mais nous avons maine égale dans ce  
Causa enantant que l'affectum des parties molles  
sans le d'ennuier, tantôt ils sont dus à la  
présence d'un corps étranger, ou bien à la  
suite d'un d'ignité dans la tisse cellulaire  
car à l'anus, etc. Sans aucun d'ailleurs, tel que  
parlant d'écipate de ce d'ennuier tisse, qu'il  
falloit foudre l'intestin rectum, et par conséquent  
comme il causait, mais supposons qu'un  
refasse que foudre un d'ennuier tisse qui  
prolaine à l'intestin, alors il y a une prolaine  
assez considérable, il supprime et se réunit  
peut une fistule ulcère sur l'intestin.  
Cela de foudre observer en passant, qu'au d'ennuier  
même encore que prolaine oryent qu'il y a  
jamais de fistule. Les que extérie, qu'elle  
communiquent toutes avec l'intestin rectum  
il est bien prouvé que cela peut exister  
orvifine.

de l'ay du  
27) Bouche Il y a qd des ulcères fistuleux qui ont si  
grande étendu, que la peau se rompt d'indé  
à portion, ce qui peut produire la mort.  
Pacien qui approché au d'ennuier de la  
est qd une tisse étendu qu'ils d'ennuier  
ce qui foudre l'intestin rectum, par lequel  
parois peuvent se réunissent, qui sans cela ne  
ferment point, sans qu'il y ait une  
communication avec l'intestin du rectum  
est ingénieur. Spécie de prolaine  
ces espèces de fistule, tant par l'aspect qu'il y a



que par suite nous rapporte la maladie, lequel  
dit, qu'il a eu un dépôt considérable qui  
a formé le de suppuration, par lequel on  
convoit que soit formé fente, lequel fente  
est tanté dans son marasme très considérable,  
de plus en à égare au siège du dépôt, tant  
l'ame, soit sous l'écoulement.

Pratiquement

Reconnu il faut tacher d'empêcher la  
consolidation ce qui ne peut se faire qu'en tacher  
de rapprocher les bords ou les parois de la fistule,  
au moyen d'une compression générale ou locale  
d'abord, ce qui n'est point facile dans tous les  
cas, car si, à l'écoulement existant, on  
en fait plus, d'abord en d'abord  
cause de la conformation des parties, puis  
on donne au grand la suite de l'écoulement, ce  
qui est plus large en tant qu'il est  
que les matières écoulees se accumulent,  
ce qui fait qu'il faut en tacher d'empêcher  
et de l'écoulement d'écouler plus qu'il ne faut  
Vale garde cela. Quand il a consolidation  
au moyen de l'écoulement, on ne peut  
l'écoulement qu'en faisant prendre des bains  
Laisser un régime et faire une cure appropriée  
au malade pour prévenir la guérison. On  
ne doit cependant pas l'écoulement qui est une  
personne d'une constitution forte, car dans  
cela on ne doit point l'attendre, car chez elle  
plus que chez les autres de son état. Et tant  
d'écoulement en l'écoulement pas il faut en  
l'écoulement, il faut cependant l'écoulement.



91

29) on se sert plutôt  
pour entretenir l'aiselle, antea  
suffisant d'un procuro le rapprochement  
au moyen d'un trépan quel on applique sur  
l'aiselle, après quoi on rapproche l'écaille  
trou que l'on fixe dans cette position avec  
encore d'une tache d'impression le  
rapprochement au moyen d'ingestion  
fines de dentures irritantes, caustiques à 2 grains  
en électrolysant un peu d'acétate d'arsenic, mais  
cela peut produire des ulcères, car, et  
ce qu'elle peut se développer d'une manière  
trop exubérante.

30. Don Urcosa Colliux.

C'est donc ce nous à eux qui présentent des  
bords durs, cailloux comme au 1<sup>er</sup> et 2<sup>es</sup>, lorsque  
sont dans des circonstances très intéressantes, et  
qui paraissent être la cause de l'ulcère, tandis  
qu'il n'en faut que l'effet sans doute. Il se  
rencontre aussi souvent chez les gens du peuple, des  
causes et quels lorsqu'ils les ont, plutôt qu'ils ne gardent  
le repos, se fatiguent trop, se tiennent debout,  
font mille autres attentions à leur malade.

Il fut un temps que pour les quodians  
craintement l'effet de secours susd'organes de son  
bord. Les moyens de petites de l'opération  
les faisait avec le patient. Une l'ambette par  
99% il y avait de petites dilataions d'alignement  
ce qui d'aurait pu au dégoisement des bords  
de la plaie, mais qui n'est fait plus depuis  
18 qu'à 20 ans; Depuis se trouvent au sein  
d'autres moyens, qui sont infiniment présents

qui donnent lieu à l'écoulement, qui sont. 29<sup>es</sup>  
 l'emploi des émoulinants tel que les cataplasmes  
 de farine de graine de lin. Il faut joint  
 à cela que le malade qui en est affecté  
 garde un repos absolu, parce que l'écoulement  
 naturel qui en est la suite, qui est  
 le sang, est absolu. Il faut que l'emploi des  
 émoulinants soit continué jusqu'à ce qu'il y  
 ait un peu de sang même que les malades ne  
 descendissent pas de leur lit pour aller à la  
 garde robe, mais qu'ils se baillent au moyen  
 d'un bassin placé, puisque le mouvement de l'écoulement  
 descend et de lui-même suffit pour qu'il y ait  
 engorgement des bords de l'écoulement.

4<sup>e</sup> Des Vlcères Varicelleux.

Le 28 du  
 2<sup>e</sup> Brumaire

On donne ce remède à ceux qui sont atteints  
 des vlcères qui entrent dans la composition de l'écoulement  
 lesquels sont engorgés. Ils arrivent spécialement  
 chez ceux qui sont atteints de varicelle, tels que les  
 personnes de Cabinet, chez ceux qui ont trop  
 les jambes pressées du feu, ou la chaleur pendant  
 leur à la rarefaction du sang, chez les personnes  
 grasses, quoique cela ne soit cependant point  
 rare chez celles qui sont maigres.

Causes

Il est de personnes chez qui à la moindre  
 irritation qu'ils ont, ils se développent chez  
 eux, par suite d'une petite excoriation, qui  
 chez les personnes se dissipe en peu de  
 jours, tandis que chez d'autres elle se  
 développe en inflammation qui aboutit  
 toujours en augmentant donne lieu à ce qu'il



299<sup>e</sup> développement. Marcum de arrivant d'un autre  
il faut toujours pour cela qu'il y ait une  
chose d'antécédent, tout est il ne lui développe  
qu'un seul, tandis que d'autrefois il en forme  
plusieurs petites.

figures Au les recamant au pince de profondeur hite  
présentent, qui le plus ardent sont rendus d'une  
certaine manière. Première dont les bords sont  
un peu traités dans 77<sup>e</sup> figure, tandis que d'autre  
ils en laissent passer.

Châtiments Les moyens dont on se sert sont les  
il faut en temps au vu d'un maître au même règle  
d'être lui ce qu'il doit employer, et c'est à  
l'élève le premier à qui l'on doit rien dans  
prendre ce qu'il convient. Il faut d'abord dans  
le commencement appliquer le même des topes  
d'écrits, et que du point et autres moyens  
qui ont à peu de chose près la même forme,  
tels qu'elles, arguant. On fait prendre au maître  
à la partie affectée, capable de donner du  
report aux parties, et que celui d'un de ces  
et autres, puis ensuite lorsque l'élève est en  
partie, faire que la cicatrice est faite, on  
applique au collade un bandage pour  
éviter après que les plaies sont tout à fait  
guéries, puis se guérissent et prendre  
dilatation considérable, sans de nouveaux capots  
de revêtement comme ils étaient. Au dessus les

Bas d'acier plus particulièrement des bas de peau de che  
de chien. On remarque que c'est toute celle des  
amis qui se pèche le mieux à cela.  
Il convient qu'il n'est simplement que  
la longueur de la jambe et qu'il n'est

que la cavité du pied et maintenant, avec cette 209  
est inutile. Comme il venait qu'il s'est  
bien fait, qu'il s'embrasse et soigne la  
languette, il faut que ce soit le chirurgien  
qui mesurera la mesure et qu'il la donne  
lequel doit observer comme un enfant  
point les bras ord. en bas dans les campagnes  
que est presque toujours à Paris, donc  
prendre que la mesure, juste de la langue  
est de la grosseur de la languette, parce que  
qui le fait, se le mesure point par la  
sua la mesure, mais l'un d'eux toujours  
un peu au-dessus de la langue, afin qu'il  
embrasse mieux le membre et soit en  
consequence, il doit aussi indiquer la  
un petit bout de l'index, parce que le bras doit  
se laisser du côté opposé.

Le chirurgien doit en faire usage et  
longtemps, le quel d'ailleurs se trouve  
aussi le de temps; il est obligé même de  
porter pendant toute sa vie, parce que  
ces sortes d'ulcères ne se développent que vers  
le milieu de la vie, vers 40, 50, 60 ans, alors  
c'est la vie ou les parties se trouvent dans un  
embarras.

Comme il peut se faire que l'on soit de santé  
et qu'il soit en état de se faire  
construire, quoique quand même on ne  
peut, mais alors que les maladies ne  
peuvent être évitées, comme ils le  
faisaient et ils savaient que l'on sache qu'on  
peut également en construire de santé, qui  
pour la santé et en bien s'en, que l'on fait  
de la même manière que le précédent, la



201 quel peut également le remplacer,  
50. Les Verrues Cancéreuses.

Les verrues cancéreuses sont traitées par le même  
moyen que les verrues ordinaires.

Il y a encore désignées sous le nom de  
verrues cancéreuses, ce qui sembleroit indiquer qu'il s'agit  
en réalité d'une affection particulière, mais ce n'est qu'une  
façon de parler, ce qui semble tenir à la fin de  
la phrase de cette partie, lesquels sont toujours  
précédés d'une inflammation dans cette partie  
chez qui qui provient d'une certaine manière étendue et  
il s'agit de la même chose, comme au lécithine qui  
plus les petites verrues, dans lesquelles on a  
trouvé cela, paraissent également plus dans

certaines circonstances que dans d'autres, c'est ainsi  
qu'on les rencontre fréquemment au sang total  
aussi est-ce qu'on en a parlé le premier, ce  
qui a fait fait. Surtout en France a eu lieu  
l'association de la verrue et du sang total  
petites verrues, et c'est pour cela qu'on les  
rencontre dans ces deux formes, verrues du  
système cancéreux, qui pour les verrues on ne peut  
en culotter toute la partie affectée, qui est  
la peau de l'épiderme.

Les verrues noires deviennent dans ce moment  
ceux qui se développent au visage, par  
ce qu'on considère pour une verrue cancéreuse  
aussi des autres parties. On trouve les verrues  
dans la forme d'une verrue cancéreuse qui  
prend d'abord une forme d'une verrue cancéreuse  
les verrues qui appliquent dans les verrues



irritantes d'autrefois seigneurant les saignements, 392  
lesquels donnent dans les tumeurs inconstantes  
sous la forme de petite lésion ulcéreuse, giff.  
séparée, d'autrefois point. Mais des circonstances  
ou essent de séparation ulcéreuse, qui se sont  
développées à la suite de petites lésions  
que l'on a observé sur les quels apparaissent de  
suite une petite éruption qui se sépare de nouveau  
et à plusieurs fois de cette manière, donne  
lieu à une éruption ulcéreuse.

Il est en général facile à reconnaître, lignes  
les bords en sont durs, gonflés, giff. rouge  
irégulier, comme découpés. Le fait est souvent  
dans certains cas d'une couleur blanchâtre  
il en sort un fluide de mauvaise nature  
isoreux, qui fait de fait est rouge, que l'on  
distingue du blanc par la couleur. Des éruptions  
de.

Si les personnes qui sont ainsi exposées  
d'ulcères ne font point en vain l'induit  
alors giff. présente une tache marquée, qu'il  
devient giff. très considérable. Il est des  
circonstances, au après avoir acquis une  
certaine grandeur. C'est du visage. et l'ulcère  
et ne cause nullement de douleur aux  
malades. Lesquels sont giff. pour  
mettre giff. chose devant le visage, afin  
de l'empêcher d'être sensible, cette éruption  
est la partie que l'on aime le plus. Il est.

Il faut aussi les ulcères du visage. Traitement  
par les autres parties. La partie affectée par cela un ulcère  
des fuitement branchants et des ostéites,



303

est une caligatote comme on le propose  
puis qu'on la compare que, en l'un des  
ou l'autre fait aucun de la guérie on a fait  
gagner la maladie; dans le premier on  
lui donnait et faut n'en encore faire usage  
des canotiques après, et n'est pas cela pour  
être qu'on n'a point guéri. Il faut mieux  
engendrer le service des canotiques et trancher  
que des canotiques. Si qu'on pratiquerait disoit  
en avoir guéri dans les ulcères, ils sont  
trouvés, sur la nature de la maladie.

Le cas du  
304. Bernardin est une guérie de toutes les  
ou l'autre, et faut n'en encore faire usage  
pour parvenir à guérir la membrane ungué  
parce que sans cela le pus serait capoté  
être apaisé, puis n'est que la guérie  
serait mieux faite. Il faut pratiquer la  
de cause de la guérie et plus encore le cas  
de l'homme, ordonné de produire une guérie  
qui serait difficile à guérir. Il faut mieux  
surgénéral pour les ulcères, faire usage de  
instrumenta tranchante que des canotiques  
parce que l'emploi de ce dernier n'est point  
aussi simple qu'on pourroit le penser au  
abord, parce que son emploi cause souvent  
de grandes douleurs et qu'il lui-même les app  
posés, il couvrent, de manière à ce qu'il  
attaquent les ulcères aussi bien dans toute  
une étendue comme au lieu profond  
surtout ces derniers au lieu de diminuer

font des prodiges. L'annus au fait 384  
est usage, mais alors c'est pour en qui

tant plus considérables et encore pour le  
visage, en ce qu'il, on ne peut trop les  
entendre pour leur peu de volume, puis en suite  
en ce qu'ils laissent une cicatrice moins difforme.

Le Caustique dont on fait usage est celui Caustique de  
Russell par le Côme. Quoiqu'il parait que pour l'un  
quelqu'un en avait déjà avant lui. Il est  
composé de sang dragon une once, sulfure  
de mercure une once, oxide d'arsenic trois  
grains, pour en faire usage on poudrit cette substance  
avec de l'alcali, et l'on en treuve toute la  
surface de l'ulcère. On en met dans un degré  
égal. Il est ord. Vingt quatre heures à l'endure  
son effet, en prenant une escarre plus annus  
considérable, lorsqu'elle est assez épaisse pour  
pousser en l'air toute la partie affectée par  
l'ulcère, on ne le réappique pas de nouveau.

Il est à remarquer que l'usage de ce moyen pour l'ulcère  
présente quelque inconvénient, en ce que  
l'ulcère ayant la figure de déterminer la cause  
il est introduite dans l'ulcère il peut  
se faire qu'il y ait d'ulcère par les  
vaisseaux absorbables et par le sang  
à l'égard de la même manière que l'ulcère  
produit l'ulcère, et est appliqué  
dans quelque cas à la surface du corps.



## Du Cancer

quoique cette maladie a été connue de tout  
 temps, elle n'est cependant point encore restée  
 dans ses caractères. Les Anciens qui ont vu  
 qu'on ne parvenait en guérissant par le moyen  
 des fortes saignées ou bien par l'ablation, se  
 sont trouvés dans leurs opinions justes avec  
 ceux actuels qui l'ont embrassée, tandis qu'il  
 y a deux ou trois cent ans, quelques auteurs  
 qu'on pourroit en croire au moyen de leurs  
 administrations à l'intérieur, capable de détruire  
 la cause, qui se trouvoit maintenant abondante  
 pour se conformer à ce que disoient les autres.  
 C'est particulièrement aux élanables ainsi  
 que l'on en a vu se développer le plus, aussi est-ce par ces  
 que tout ce qu'on a fait dit en partie les auteurs  
 ne leur a été appliqué qu'à celui de cette partie  
 qu'ils ont affecté également d'autres.  
 Il est presque toujours la suite d'un quel-  
 qu'un peut également se développer à la suite  
 d'un élanable, aussi est-ce cela qu'a été l'œuvre  
 de l'ap. Hypocrate.

On n'est pas trop ce que c'est qu'un  
 Cancer, on le conçoit plutôt par ses effets  
 que par son autre chose. Il peut se développer  
 dans quantité d'endroits, mais qu'on s'entende  
 en il se développe, au fois qu'il l'est il se  
 présente toujours la même par tout. Quoique  
 nous disions qu'il peut se développer dans  
 les parties, cependant il n'y en a qu'une seule

nombre, mais celle qui l'inspirement est. 226  
par suite d'un trouble affectif par l'inspiration.

Les Panses comprimees des choses, est  
de la même sorte. Vendant d'un p<sup>re</sup> ichorus  
comme au l<sup>re</sup> dit, qui sege dans la conomie  
et qui ne parait pas. Par suite de l'indolence  
ou d'un p<sup>re</sup> suite d'une autre maladie ou  
p<sup>re</sup> suite, comprimee des Panses, sege, sege,  
puis sans traitement.

puis son traitement.

Il y a que cinq systèmes vis il peut se diviser en  
déploppement, qui sont la peau, le squelette  
membraire, le tissu cellulaire les organes  
sécréteurs, puis qq. les glandes lymphatiques.  
On le confond avec la vie la machine  
la digestion, lorsqu'on se anime dans les mino  
alors. Ainsi pp. pour en donner un exemple,  
au dit le système des laxes, qq'il a comme  
par la membrane muqueuse de la bouche,  
de l'estomac, de l'intestin le, qq'il se agit  
commence par elle.

Elle se agit de

de l'enceinte de la prison pour occuper la place  
qu'occupe l'enduit; certains qu'on l'a  
appliquée la peau du crâne, de la face,  
des aisselles, des cuisses etc.

Des effaires, des amorce.

Le tissu cellulaire y est peu, soignée, exp. Du tissu cell.

ou la remarque -- giff. à la suite d'une

tumeur, lorsqu'on pousse par les ischiotroch.

Pour les membranes muqueuses, c'est à un grand

elles qu'on doit rapporter celui de l'org.

qui commencent toujours par elle, des lèvres,

de la langue, du pilière, de l'isthme,



307

De Cardiac, Du rectum, qui à uiderium il  
commence par de petits tubercles, de la base  
de l'os pubis, Du Vagin, Du Col de la Matrice  
et à cet organe. Il y en a de ces ulcères qui  
s'étendent à la Médecine, en ce que la  
Chirurgie ne peut porter aucun remède  
sur ces deux positions.

Second. Quand l'ulcère affecte les organes de la  
vie primaire. Il est probable qu'il survient en même temps  
des organes de toutes les systèmes qui sont dans la composition  
de l'homme et qu'il n'en affecte point qu'un seul, ce qui  
serait difficile à concevoir. Ceux qui sont  
trouvés affectés à la tête, sont la glande  
lacrimale, quoique cela n'est point encore bien  
prouvé. On comme nous l'avons dit que la  
membrane muqueuse qui le recouvre peut  
en être affectée également; Il est probable  
si elle est enflammée, qu'elle y est la source  
de l'ulcère dans l'orbite la glande de  
l'œil. Des corps étrangers, l'air, le feu, le froid  
bien qu'ils ne sont pas. Les glandes peuvent  
en être affectées, ce qui n'est point encore prouvé  
de tout les praticiens français, malgré les  
de hollandais en rapportant des exemples.  
Il est néanmoins difficile de voir qu'il  
se soient guéris. Sur la nature de la glande  
que les français disent être impossible à  
guérir à cause de la quantité de téguments  
des vaisseaux de la tête qui la recouvrent  
qui croient que c'est quelque affectation  
partielle qui les recouvrent. Comme nous l'avons  
parlé de quelque sorte que de la quantité

Il y a encore les grandes acridales qui sont  
situes dans l'arrière bouche, lesquelles sont  
très susceptibles de prendre un engorgement  
squirreux, de se tuméfier, mais jamais de  
devenir Cancéreuses. A la suite les  
grandes mammaires qui le sont très fréquemment  
chez les femmes, et plus qu'aucune autre partie,  
ce qui donne l'écoulement, qui dure très longtemps  
à être atténué par les corps extérieurement.  
Ensuite en ce qu'elles sont susceptibles de recevoir  
aussément l'infection lymphatique. De la même  
cause la suppression des règles peut encore  
survenir, parant un grand rôle dans  
la conomie, recevant ce qu'on se met à  
devenir la maladie heréditaire. Récemment  
on la trouve encore chez l'homme, et ce qu'elle  
ne sont point susceptibles de se tuméfier  
chez l'homme, et chez la femme; cependant il y a  
autour en rapportant des exemples, lorsque  
sont atteints les scirrhes.

Grand puer ce qui concerne le trape, en  
un lieu jamais au fait, ainsi. Reins le  
Rate, le Pancréas, mais si au lobe de  
très fréquemment atteintes, soit au pôle,  
au. Cardia, que puer et organe.  
de suite les testicules chez l'homme, qui  
ne sont susceptibles presque autant que les  
mammaires chez la femme.

Quand on les glandes lymphatiques que  
ne sont point et les susceptibles de se tuméfier,  
il est presque probable qu'elles ne sont  
jamais primitivement, mais le plus souvent

Des glandes  
lymphatiques



399 ~~Puis~~ cet organe est ainsi ~~fig.~~ qu'on  
voit ~~fig.~~ celle de l'utérus d'un Cancer  
à la suite de l'ovaire. Du sang qui  
cette époque ne paraissait nullement  
affectée que l'on ne pouvait point reconnaître.

Comme le Cancer dépend nécessairement  
plutôt de la suite d'un état d'organe, il est  
des pathologistes qui ont dit qu'il dépend  
de l'engorgement des vaisseaux lymphatiques  
de la dilatation et de la congestion de la  
lymphatique et enfin de la formation des  
glandes lymphatiques engorgées, en disant  
qu'il y avait des glandes de cette espèce  
partout, à la suite il paraît s'en former  
qu'il y en a plus que les anatomistes en  
découvrent, d'après l'état pathologique de  
certaines parties qui en font effectivement  
de nouvelles ou en font croître de nouvelles.

Il y a deux états qui président au Cancer, l'un  
squatteux, l'autre ulcéreux, nous l'avons dit, l'autre une  
sorte d'inflammation chronique, tel qu'on le  
remarque ~~fig.~~ pour le Cancer de la matrice,  
qui n'est point jamais précédé d'un premier  
état, qui se développe ensuite.

On a demandé si c'est dans l'économie  
ou dans le Cancer, ou bien ce qu'on  
nomme le Cancer, de la même manière  
que le Vénérien, c'est-à-dire, le quel n'est point  
plus sensible à la cause que l'autre. Il ne  
paraît point, ce qui a fait qu'on l'a  
dit qu'il se développe ~~fig.~~ dans le Cancer.

apparente; mais il faudroit pour cela que 349  
le fluide ait été transporté dans l'annonie  
d'une manière quelconque, au lieu d'être  
ce qui n'est nullement prouvé; on admettrait  
d'autant plus cela qu'un ne peut voir cancéral  
commencer qu'il pût se développer. Pour-  
cela il ne faut que le considérer que comme  
faisant suite à une autre Maladie, qui  
affecte organiquement une partie, en ayant  
puint égaré à lui primitivement, mais  
secondairement, qui une fois développée  
affecte toutes les qui l'entourent. D'après  
ces considérations, il est admis qu'il n'y a pas  
de Vice Cancéreux dans l'annonie. D'ailleurs  
les praticiens modernes sont assez d'accord  
maintenant, le quel peut se développer tout  
seul, de même que l'édème de la scille  
sans. D'ailleurs il n'y a aucune chose, qui  
suppose à ce qu'on se reconnoisse cancéral.  
produit par une disposition constante dans  
l'organe, d'une manière cachée, de manière  
celle est admise pour la phtisie, lequel  
se développera à une époque de la vie plus  
ou moins éloignée; ce qui le confirme, c'est  
qu'on a vu plusieurs fois un tel affecté  
Il est des affections organiques qui deviennent secondaires  
Cancéreuses, malgré qu'elles n'y ont nullement principal.  
par l'oppression de certaines parties de  
elles, tels sont les des tumeurs fongueuses. Cause de  
des Causes qui donnent lieu au Cancer Cancro.



**B**ientôt intérieurs et extérieurs. Elles se sentent de  
certains, des chutes du- des parties glanduleuses,  
telles que le sein, le testicule, qui par un mouvement  
certain porte des vers de venant 999. Par exemple  
à l'utérus par des pressions faites sur lui, ou au  
le crâne chez 999es cordons de. qui le d'ou  
encore chez ceux qui font un usage abusif de l'usage  
alcooolique l'utérus par l'usage ignominieux d'un  
côté chez certaines femmes, qui le d'ou  
le chagrin, de même que celui de l'utérus  
par la ripercussion de 999es vers, tels que de  
syphilitiques, du Dartreux, Anémies 999. arrive  
par cause sympathique, tel que cela arrive par  
par un effet du sein, à la suite de la suppression  
des règles, au temps critique. Par les causes  
intérieures au point y place cette dernière circonstance  
puis insensiblement à tout lieu de proximité  
qu'il peut se développer spontanément dans un  
organe, de même que nous voyons certaine  
affection organique.

Ce serait peu être ici l'organe d'ent  
du système en général, mais nous n'en traitons  
que parlant de l'affection de chaque organe,  
parce qu'il sera plus aisé alors de simplifier,  
de qu'il y a de manifestations.  
Sans dire l'embarras que quand il se  
présente il a la forme d'un triangle d'un  
certaine inégalité, qui est 999. l'utérus  
un des premiers de la faiblesse ou d'un grand  
terme affaiblir, existant sans d'autre nécessité  
qu'elle est un développement, le quel se fait de  
longues, à une petite sur la partie, au

à une chute. On a prétendu que l'ulcère  
de la douleur dépendait de la compression du nerf  
qui vaient à l'endore, lequel n'est point, car si  
cela était il semblerait que les nerfs ne sent  
point les agents de transmission du sentiment,  
et qu'ils sont susceptibles de douleurs  
spontanées, qu'on ne peut pas admettre, puisqu'il  
y a des parties dans les quelles on ne ressent  
point de nerf et qui sont dans un état  
pathologique, on y ressent de la douleur.

Ceci a expliqué la conversion au cancer par la formation  
d'un squirre en Cancer par la formation d'un squirre en Cancer  
d'un fluide, une espèce de putréfaction, lequel se forme en  
un point tel qu'il était l'ulcère de l'ulcère de l'ulcère  
On peut dire seulement qu'il se passe un  
nouveau changement dans la partie, dont on  
ne peut trop expliquer l'ulcère, qui  
dans quelques circonstances succède à une  
mauvaise cause extérieure, et qu'on attribue  
seule bien affecté, qui est le début de l'état  
inflammatoire et par suite du Cancer.

Le Cancer ainsi développé fait des  
progrès p. un rapide, qui si on n'en fait  
l'extirpation présente dans son intérieur une  
organisation toute différente de celle des autres  
parties; ensuite l'on remarque de petits foyers  
purulents, disséminés dans la partie, qui deviennent  
plus ou moins de pus, et les agents constitutifs  
le cancer accablé par les différences de  
l'ulcère, qui est toujours le même, mais qui  
ne diffère que parce que les petits foyers  
purulents se sont fait au point, qui durent



**23.** Issue au pus. Ces petites pustules qui sont  
constamment de petite efflorescence, se développent plus ou  
moins, qui succèdent ordinairement à la suite de  
l'issue phlogistique qui se fait de l'issue, qui  
dérive souvent de l'issue par la suite et se convertit  
en y en associant les deux, comme il se fait  
en l'issue phlogistique.

On reconnaît le Cancer ulcéré à son aspect  
comme qui présente des bords inégaux, décaillés, qui est  
généralement rouge, tandis que d'autrefois il est couvert  
d'une efflorescence blanche. Méléthée, présentant de  
sanglantes de petites tumeurs fongueuses; les bords  
sont livides, envahies, les bords décolorés,  
le pus qui en sort ne jamais une aspect blanc  
à celui de l'issue ulcéreuse, qui au lieu d'être blanc  
est blanc. Et, duquel se développe une  
deuxième partie, qui ne peut être  
telle de même que celle de la gomme asséchée.  
Il fait des progrès plus ou moins rapides, mais  
jamais lorsqu'il se acquit une certaine grandeur  
ce n'est que dans le commencement que cela se  
renouvelle, ce qui est facile de constater  
les femmes qui en ont gâté de ces candidités  
au sein, au lieu encore pour ceux qui en  
ont l'usage.

Quand elles progressent ils varient en général  
d'après l'âge du malade, de constitution et son  
genre de vie. Chez les personnes jeunes, il en est  
généralement, tandis que le contraire a lieu chez celles  
en âge, ce qui est facile à remarquer dans les  
malades, comme les hôpitaux qui sont destinés  
à en l'usage, au lieu remarquer gâté des femmes.



avec des Cancreux considérables, qui reprennent  
vivent encore long temps, ce qui surprend. Par rapport  
à la constitution des personnes faibles, délicates  
il en fait également plus, qui se trouvent tout à la  
sensibilité, dont est d'une tendresse. Il en fait  
également plus de ceux qui sont mal, qui  
ont du chagrin, qui battent des bras malade.  
Aussi est-ce pour cela qu'on doit être tout  
ce qui tendrait à le faire propager plus les  
maladies qui sont infectieuses. Quand on craint  
du Cancer qui s'en est existé dans le sein, il s'en trouve  
rien existe point, cela ne paraît ainsi, que par  
l'affection de l'opercule qui forme le sein  
de la glande mammaire.

Le Cancer n'est point susceptible de guérir  
d'une manière spontanée, il tend au contraire  
toujours à faire des progrès et à envahir les  
tissus qui l'environnent. Il se propage dans les organes  
d'autant mieux que le tissu est plus mou, est  
pourq. aussi que le tissu cellulaire paraît être  
la voie de transmission. Il est à observer cep.  
qu'il affecte mieux certaine partie que d'autre  
qui sont spécialement celles où il a une tendance  
à se développer en premier, qui commencent  
les uns dit-il à que trois systèmes. C'est ainsi  
que l'un suit toute la mamelle et se affecte  
un peu de temps, qui a été communément  
cette que quand il a lieu à l'estomac qu'il  
affecte bientôt toute l'organe, tandis que la  
mamelle seule, seules qui le recouvrent n'est point  
encore affectée, qui forme une limite aux parties



superiorité; il en est de même de toutes les  
parties, mais on remarque également au testicule,  
la remarque que nous avons faite  
il ne peut point trop se propager il agit sur  
sur les glandes lymphatiques qui l'environnent, en  
bien par l'action du Vénus; aussi est-ce par  
celle qu'il fait opérer très promptement le cancer  
de cet organe, qui dans le cas <sup>corroïp</sup> d'organe fait  
que présente un simple engorgement, il y  
a dans son intérieur de petits foyers répandus  
le Cancer le Cancer est toujours accompagné de la dilata-  
tion d'un des vaisseaux sanguins, qui tient dans d'autre  
à la dilatation <sup>perçoit</sup> d'augmentation de l'organe affecté; de  
des vaisseaux la même manière que cela se fait remarque  
par la stase dans le tissu de la gaine  
d'autre à l'extérieur qui se aborde dans l'état naturel  
présentent un petit volume, au lieu que dans  
le premier cas sont très considérables, les uns  
représentent par suite leur état primitif. Il  
paraît que la douleur est aussi susceptible  
d'augmenter à la dilatation des vaisseaux, car  
cela se remarque. Il y a par exemple qui ont la p.  
puisque ceux qui sont très soufferts ont  
souvent des hémorragies une fois opérée, qui  
est assez difficile à arrêter. Il y a d'autre  
autre à l'engorgement de la glande lymphatique  
de même qu'à qui peuvent être affectés et plus ou moins  
longuement. <sup>gubilité</sup>; en effet il peut se faire qu'il y ait  
des glandes lymphatiques, en effet il peut y en avoir plusieurs, et  
ce qu'on remarque. Il y a par exemple de la dilata-  
tion le Cancer du sein  
jusqu'à actuellement les pathologistes n'ont



puissent être d'accord sur la cause de cet engorgement. 240  
il y a eu différentes hypothèses pour l'expliquer.  
Dans les quelles nous n'entreons point, mais  
nous ne ferons que parler de quelques-unes  
pour en présenter ce qui se passe. Il est qui  
croient que cela ne dépend que d'un transport hypostasier  
du fluide sanguin vers les glandes; d'autres  
ont tenu un grand nombre que cela vient  
que par cause sympathique. Cependant il y a  
quelques faits qui semblent plutôt à faire croire  
qu'un cancer, que par un autre, dans les quels  
il est bien d'entrer un détail.

D'abord il y a 241. Des engorgements parant  
qu'il se fait former une matière purulente dans  
le Cancer, lequel comme l'on sait a une très  
grande tendance à se propager, puis qu'il ne  
suffit que de mettre de la matière purulente qui  
existe, sur une partie saine, pour qu'elle se  
forme dans celle-ci une phlogose, qui appliquée  
sur le tissu cellulaire donne lieu à la carie.  
Maladies qui se développent au bout d'un peu de temps.  
Si cela étoit ainsi pour les glandes si même  
chose devrait arriver, qui cependant ne se  
remarque point, qui d'ailleurs cause indubitablement  
piqueur. D'ailleurs qui empêcherait qu'il ne  
parcoure les vaisseaux absorbans. Existe-t-il  
qu'il est prouvé que ce par cet engorgement  
peut arriver bien sympathiquement, et qu'on  
le remarque pour le développement d'un cancer  
chez un enfant, par l'application d'un moricton  
d'un Cancer, par suite d'une piquette d'animal.



Y 7. Finimus, Finis instrumentis induritis de fluxu  
deletis.

Voici ce qu'on peut répondre à ce sujet.  
Comment, comment les glandes lymphatiques qui sont  
dans le cou, par exemple, peuvent-elles être atteintes par le  
Léger, de glandes lymphatiques Cancéreuses, devenues, elles, cancéreuses,  
lymphatiques. Cette demande n'est point constante, puisqu'on

goff. des glandes et de celles lymphatiques  
sans que pour cela il y ait transmission du  
constituant de la maladie et que cela se fait  
remarque à la suite de la suppression d'une  
glandes, ou la conjonction d'une, qui  
goff. l'avis de suppression plus ou moins  
abondante, dont le plus approche de l'avis de

D'après cela on peut concevoir l'engorgement  
des glandes lymphatiques sans impropriété du  
Verbe. mais cela n'empêche point qu'on ne fasse  
l'extirpation ou enlevant le Cancer, comme on  
le pratique pour celui des mammelles. On  
est convaincu qu'il y a une très grande tendance  
à devenir Cancéreuses. C'est point d'ailleurs  
devient les infiltrations des muscles dans le  
moment des Cancers, comme cela se remarque  
Vg. dans celui des mammelles pour celles des  
Vég. On ne sait pas trop à quoi cela tient  
puisque c'est à présumer que cela vient  
de la compression des vaisseaux lymphatiques

De la diathèse

Cancéreuse.

Signes du Cancer.

On remarque ainsi leur ensemble diathétique



30  
Canceruse, qui lui est particulière en genre  
sorte avec d'autre maladie. Il y a trouble  
dans les Vies Digestives, qui heurtent point  
bien il est est. certaines personnes beaucoup  
le poids est un peu élevé la chaleur générale  
du corps augmentée. Il y a suite à des douleurs  
dans le Cancer de l'estomac, de l'augmentation des  
les Exhalations et Secrétions, avec des troubles  
dérangement colligatif, porté à un haut  
degré (le Cancer) souffre que organe  
pathologiquement, c'est au levait par les os  
qui devint cassant, friables, qui au moindre  
choc porte sur loup détermine une fracture.  
C'est même cette circonstance qui a fait présumer  
à Louis le premier qu'il y a une affection  
général dans toute l'économie dans le Cancer,  
ce qu'il reconnut sur une issue de la  
la première fracture en maintenant au poitrine  
une ou fracture en l'aidant à monter,  
qui ne se causait point malgré les soins qu'on  
prit laquelle est la fracture de la sorte, se  
qui l'étamine, qui après toutes les questions  
qu'il fit, donna qu'elle avait un cancer  
au sein, et une plusieurs fautes articulation,  
parce qu'ils cartilages qu'ils fournissent point de  
extrémités des os, ne se chargent point de  
phosphate calcaire. Il y a un autre changement, l'os du S  
la physiologie et du thorax, avec l'indivision  
dans les pathologies sont bien d'accord  
frimaire



30) Pour les effets, les symptômes qui résultent de la  
diathèse cancéreuse, mais il n'apparaît de ma-  
nière la cause, puisque les uns prétendent qu'il  
y a un transport de la matière purulente  
Cancéreuse dans toute l'économie, tandis que d'autres  
pensent que cela n'a lieu qu'hympatiquement.  
Aussi ceux qui sont de cette dernière opinion  
s'abstiennent du Cancer avec les plus de hardiesse  
tandis que les autres ne le font point, par ce  
qu'ils appréhendent qu'il se reproduise.

La plus ancienne opinion que l'on ait sur  
la diathèse cancéreuse est l'absorption du fluide Cancer  
par les vaisseaux absorbants, qui est transporté dans  
toutes les parties; mais cela n'est pas  
puisque si cela étoit, il lui suivroit qu'il faudroit  
qu'il y eu prout une affection Congénitale.  
Il est cependant des cas dans lesquels les tumeurs  
sont succombées après l'absorption du Cancer,  
mais cela n'est point constant, puisqu'il y en  
a très peu de ceux que cela dépende du transport  
dans le quel le Cancer plonge toute l'économie  
c'est ce que remarque Hg. C'est toute d'une  
maladie de fétide, de l'écoulement.

On voit aussi le Cancer survenir dans le  
sein il arrive, mais cela peut tenir en ce que  
il vient en même temps toutes les parties  
ou une seule de petite qu'elle soit suffite, et  
à son développement dans un seul et en cet  
cela peut tenir à son développement singulier  
entre la partie affectée en premier lieu, qui  
avec elle secondaires, sans que pour cela il y ait  
transport du fluide Cancer dans cette dernière.

au même point de la diathèse Cancéreuse 328  
De suite il n'est point impossible de voir  
dans parties affectées en même temps, ou  
cela sur une même ggg. telle que l'g. le Cancer  
des mammelles et des testicules chez la femme, des  
lèvres et des testicules chez l'homme. Mais que  
l'un en meurt plus que l'autre p<sup>ro</sup>portionnellement;  
sachant que l'g. que l'on étoit p<sup>ro</sup>portionnellement  
en portant à l'acte; On en a un exemple  
dans une de la figure, les quels malgré qu'ils  
sont très considérables cependant l'g. de  
pression ne vivent avec.

Il est extrêmement d'autre que le fluide Cancéreuse  
Cancéreuse si cela avoit lieu réellement p<sup>ro</sup>portionnellement  
être porté sur nos parties sans produire d'effets de l'g. à l'g.  
et de l'g. d'anguine plus forte qu'il a été à Cancéreuse.  
lien, puisque l'g. d'exemple rapportent  
que leur application sur nos parties mène  
à dévorer, tel que sur le tissu cellulaire  
Cancer survient, ainsi l'un à l'exemple d'un  
homme qui en un Cancer des lèvres, pour  
avoir été une Malade qui étoit affectée  
d'un Chirurgien à la langue; pour avoir  
vu la guérison la fluide Cancéreuse; un autre  
indivisible au nez pour avoir respiré l'air  
d'un Cancer de la Scille, remarque sur  
des Chinois le Cancer presque développé, qu'il  
applique du fluide Cancéreuse l'g. à l'g.  
p<sup>ro</sup>portionnellement qu'il peut pénétrer le développement.  
d'un Cancer de l'acte sans diathèse Cancéreuse.



341; Si la Diathèse Cancéreuse existait réellement  
par l'absorption. Du fluide Cancéreux, il semble  
d'après cela, qu'on n'aurait jamais agueri  
du Cancro, parce que dans tous les cas il y a  
par la nature, ce que l'expérience prouve le  
contraire; aussi est ce possible que l'écoulement  
nécessaire par être au-delà du système et après  
une action que pareille. Maladie arrivée, car  
est probable que s'il arrivait être plus tard  
il n'y a point de doute que l'écoulement de Maladie  
n'aurait guéri. On doit d'autant plus  
faire, que si l'on abandonne la Maladie  
à elle-même, le malade en périra toujours  
tôt ou tard. D'après cela, il faut donc en  
le faire, au risque d'être infructueux.

Extrait du  
du Cancro la question du Cancro, ont été traitées  
multiples. C'est aux auteurs à qui nous en  
l'existence des moyens employés pour les  
qui consistent à obtenir au moyen des  
cures et de faire l'ablation par la méthode  
tranchante. Il y a bien en effet les indications  
des praticiens qui ont été de guérir les  
lors même qu'ils souffrent à leur point  
en commençant les pratiques à leur état naturel  
par différents moyens, lesquels sont  
et les autres.

Employés, les premiers sont ceux qui  
à eux. Des secours au cancer. D'autre part  
pour cela de tenir les malades à l'aise.



à braver, non point que cette fontaine  
des maladies, mais toute antipathique, lequel  
est un assein d'ing comme cela au moyen  
de l'eau sulfurée. Et si on fait il a sept  
cette opinion et craint qu'il soit trompé par  
la maladie. Or est d'un incertitude pour  
espérer de voir lequel finit d'un sec.  
durer. portons. Pour les loques laïque,  
la belladone, nous ne pas le voir qu'imposant  
de l'usage de la pierre. Mais l'usage, dans  
l'usage ou l'un était qu'il était comme  
un espèce d'animal assein qui a sept à  
marcher, mais le l'usage de l'un est, lequel  
est même par l'usage de l'un est  
effets finit. Or a encore pour l'usage  
des maladies, lequel a fait finit des maladies  
pour la matière médicale et cette opinion par  
à remarquer des effets différents sur la  
manière d'un être et d'un être, les quels  
d'un être et d'un être, les quels  
est fait être réservé sur l'un est, par  
l'usage finit qu'il est finit. Or a encore  
à remarquer un autre moyen pour l'usage  
de l'un est l'usage de l'un est. Or a encore  
pour l'usage, lequel est l'usage de l'un est  
les maladies d'un être et d'un être, les quels  
marche et est possible, qu'il est finit  
pour l'un est. Or a encore  
le moyen est plus efficace et l'usage  
de l'un est, lequel est finit et finit.



323 usage de ces deux brèves, n'accroque il y a  
certaines indignations, tel que la diarrhée, la  
promoussure, pour ceux qui veulent y faire  
opinion, ce qui n'empêche point d'apaiser la  
la regarder comme hyppocratique. Il y a encore  
le chagrin, la tristesse, les pleurs, la faiblesse  
les affections organiques. De quelle partie est  
quelques glandes hyppocratiques, qui rendent dans  
les cas ci-dessus. Il y a encore les affections des  
du Cancer, plus ou moins étendu. Hyppocrate  
aprouve celui de l'estomac, de l'intestin, mais  
de l'ectotomie; on peut seulement faire de  
fureigations à cette dernière. Quand à l'écoulement  
ou ne peut la faire, en cause de  
l'écoulement de toutes les parties voisines, et d'ailleurs  
Hy. que dans le Cancer du sein, l'écoulement  
des parties molles, les os sont encore; l'écoulement  
de l'estomac, les organes abdominaux, ce qui fait  
qu'on ne peut la pratiquer. Il faut néanmoins  
qu'on soit attentif si l'on peut le pousser  
l'écoulement plutôt que d'écoulement la diarrhée  
à une fois certaines.

Dans les cas où on ne peut point  
tacher de diminuer les douleurs, que l'écoulement  
soit si possible au moyen de la punction  
de l'écoulement, de l'écoulement, et de l'écoulement  
qui n'est point capable d'écoulement, car  
l'écoulement est point d'écoulement. On a  
le Cancer avec des parties calcaires, après  
de l'écoulement de l'écoulement la faculté ordinaire

De recourir l'impression des douleurs que  
l'on donne l'air après l'opération du Scirrhus.  
On applique cataplasme, ou même tige  
qu'on administre à l'intérieur également de  
calmatite, l'huile de dissolutum d'opium  
mélée au Pêta; on lui se sert de la  
Cigue, de la Belladonna, ou de la belladonna,  
avant ou après des dissolutum, ou qu'on applique  
en cataplasmes. Il faut être très réservé  
en usage, sur tous les cas dit.

La tation du Cancer se fait de deux  
manières, ou bien par le moyen des caustiques,  
ou par les instruments. Les caustiques de  
caustiques par le feu ont été employés il y a  
très longtemps par les Anciens, qui s'en servaient  
fréquemment avant qu'on ait presque plus  
usage maintenant, seulement lorsqu'on les  
emploie, sans se servir d'aucun instrument.  
On se sert d'aucun instrument, mais on se sert  
de la pince à la tation de la tation de la  
langue. Quant à l'emploi de la pince à la  
caustique, on s'en sert de deux manières,  
deux manières, on s'en sert de deux manières  
à l'équilibre produisant son effet du centre à  
la circonférence, ou d'une manière insérée  
l'une et l'autre des parties des instruments,  
en ce que comme c'est un cercle, alors  
présentant une certaine épaisseur, l'usage  
oblige de le réappliquer plusieurs fois ce  
qui devient un inconvénient, joint à la



Il faut tout d'abord que l'on se rende compte  
au point de vue de l'ensemble qui est  
l'œuvre de l'illustre demandeur à l'égard de  
l'œuvre est à cause de cela, puis que  
au lieu de détruire le cancer, nous  
l'augmentons, par l'excitation qu'il détermine  
qui ne peut jamais agir sur les racines  
tant profondes. Au même titre que  
ce qui tient à l'œuvre fondamentale, nous  
l'observons. Pour l'implantation de l'œuvre  
tranchante ou aiguë, nous la partons  
à dire qu'un malade le peut en même temps  
au lieu de l'exciter, lorsqu'on la laisse  
quand à la manière de la faire nous ne  
pouvons nous y assiter, en regardant cela  
l'œuvre de chaque organe affecté. Aussi est-ce  
pour cela, qu'on ne peut pas parler en trait  
de l'affection de chaque organe en particulier.  
Il faut arriver tout d'abord à l'œuvre  
pour après établir un centre, de  
à ce qu'il produise son effet et qu'il  
suppression soit bien établie. Lorsqu'on  
l'œuvre peut paraître à l'attachement  
de part qu'il est le gène qui est  
et même peut être il y en a-t-il encore  
il est la pour l'œuvre de l'œuvre  
Cancer ce qui est point, puis que  
il est, il y a encore en cancer dans ce lieu  
qui ne peut être absurde. Il faut l'œuvre  
simplement comme un effet par lequel

226

cinquante

L'union  
 canonique  
 par le mariage.  
 L'union  
 naturelle, vicieuse.



327 / précautions qu'on ait pu prendre, pour éviter  
de la qu'on dit d'ailleurs. Il paraît donc  
qu'il s'agit d'être assez heureux pour ne point  
rencontrer pareille chose dans la pratique.  
Depuis que toute sur les <sup>intelligibles</sup> spéculations qu'on  
soit revenu même à l'opinion ancienne. Et  
l'édifice s'élève par une manière qui n'est  
celle que peut paraître tout être une juste idée.  
Cependant Les maîtres et employés dans les tortes de  
sont comme dans les autres espèces, le repus,  
parce qu'ils s'en sont dits se faire une idée  
jaillies. C'est dans genre d'œuvre qu'on par  
palement employés des connaissances pour  
changer la matière, et rendre tout autre  
caractère, qu'on peut appliquer le canton  
objectif. On peut ensuite faire usage d'un  
contraire que l'on doit opposer dans une  
partie la plus près possible de l'illuminé  
d'indiquer une excitation plus grande de  
affecté; c'est ainsi qu'on dans l'inflammation  
de la pleure, des pneumonie, qu'on applique  
l'excitation sur les côtés de la poitrine, dans  
de la conjonctive qu'on les applique de la  
oreilles, au temple, au sein à l'anus  
dans une pratique un canton au point  
lorsqu'on veut que l'excitation dure longtemps  
que d'appliquer un excitateur, parce qu'on  
conserve longtemps, lorsqu'on détermine de  
vive excitation. Donner lieu à une élève  
superficielle de la peau qui est 99<sup>th</sup> de la

a grande; excepte les cardes on ne nous en est  
plus en possession ne y en avons.

328

Ulcres au troisième Genre.

Je vous prie  
de m'envoyer  
le plus tôt possible  
par une boîte  
locale originelle.

Chapman

corps qui se transportent d'usage, tout en ayant  
 le transport d'entretien par une cause générale  
 de la constitution, au lieu d'une manière  
 sympathique, ou bien encore localement.  
 On ne peut pas déterminer la cause  
 première de cet espèce d'ulcère, c'est ainsi  
 qu'en en remarque après une destruction  
 de continuité d'une partie, laquelle affecte d'abord  
 appartenant à la guérison. Dans le commencement,  
 l'écoulement par la suite, ne fait plus aucun progrès,  
 prend un tout autre aspect qui est de mauvais  
 caractère, les suppurations sont violentes, dans que  
 l'on sache à quel traitement, on en remarque  
 encore. Sur des malades, par leur séjour  
 dans les hôpitaux, chez ceux qui font usage  
 de certaines médications, qui ont du danger  
 de la fatigue, qui sont d'habitude, qui sont  
 débiles, c'est pour quoi on doit leur donner  
 des moyens qui valent. On leur, de leur...  
 on leur leur faire garder le repos...

220 *Lyngbya*

Il en est une qui se présente surtout  
après l'usage d'opium, précédant  
une courte sympathie, et ainsi 99. qui  
est certaine et très grave au début et au  
de l'année, qui 99. ne devient une  
que par la présence de ces ulcères, qui  
quand ils guérissent, laissent une



qu'on a plus d'effort pour les supprimer, au contraire on  
que l'effort s'élève surient dans les affections  
de la Rate; à la suppression des règles, on  
encourirait de ce côté, il en est de même de l'utérus  
C'est pourquoi l'on a déterminé par l'expérience de l'utérus  
ayant lieu spécialement du côté gauche  
Il est plus aisé de reconnaître une déviation  
Signer par la suppression des règles, on se rend compte  
l'infirmité du côté antérieur comme la malade  
celle qui lui est arrivée, si elle jouit d'une  
bonne santé, si elle n'en a une augmentation  
ou bien une suppression de la sécrétion  
fait, transport de ce dernier comme par  
l'écoulement, ce qui peut être un fait répété  
à quoi il faut avoir égard malgré ce qui  
est dit certains auteurs, puisqu'il est  
un peu possible sans doute d'être trompé  
les fonctions, sans qu'il en résulte une  
dans l'économie, que l'on peut considérer  
quelque sorte d'élémentaire mais que la déviation  
C'est-à-dire de la gale. Et dans cette question  
on doit parler de l'écoulement à une déviation  
local, puis bien général; on applique son  
sur la partie des topiques légèrement celui  
en estant au contraire celui qui peut causer  
irritation, à quoi l'on peut ajouter que  
Malade est plutôt qu'un oblique de l'écoulement  
autour du canal, et on voit un écoulement  
chez celle d'une mauvaise constitution

Ulceres ou quatrieme genre. Cuy rapporte tout ceux accompagnés de l'affection organique de la peau, qui durent qq. temps d'une manière permanente et qui sont très difficiles à guérir. Ils que ceux qui succèdent à la gale, ou de suppuration darts, qui ne peuvent point être qq. sans l'affection organique incurable pour l'éducation. Il faut point de l'opérer. Confondre par ces sortes d'ulcères, de petites éruptions qui succèdent à des boutons qui caractérisent ces sortes d'affections, qui ont été bien apprises par les avec ceux qui succèdent à une solution de continuité produite par un corps extérieur, plus ou moins étendus.

1.° De l'Ulceres Syphilitique.

Il survient à ceux qui ont eu la gale et qui n'a point été bien guéri, ou bien à ceux qui l'ont encore, par suite d'une solution de continuité, soit qu'on se soit qq. après l'application d'un spécifique. Or. On le reconnaît par la présence de petits boutons aux environs de la plaie qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui succèdent. Il n'est pas à l'usage de corps gras, dont on se sert, et au lieu de s'y opposer point en s'efforçant de le guérir à la gale, et si elle a été bien guérie, on lui s'en encore, le cas échéant de se présenter qq. fois. Reconnaître au moyen des moyens capables de la combattre. Il faut mieux en général prolonger la guérison, que de s'en débarrasser.



331 La guerre fait de trais, en employant des  
médicaments en grande quantité, par exemple  
cortulle indur, diacurculent de d'opier, en de  
mettre en général de 3. L'usage de ces médicaments  
est en général plus aisé de la guerre si  
est robuste que si elle est ancienne.

D'ailleurs. On employe pour cela le mercure, au  
le soufre, qui peuvent être employés seul ou  
mélange; on se sert plus de celui-ci que de  
quelqu'il pourrait être en usage. Au  
sort du soufre seul, au mélange avec du  
mercure, des grains de corps gras, c'est aisé  
qu'est employé coquant napolitain, dont on  
froite les extrémités comme l'on sait. On  
abuse à tort. Depuis peu on a employé  
pour le même but, dans lequel entre du  
Dindon, du sulfure de zinc et du mercure,  
d'usage. Il est évident qu'il ne s'agit si l'on veut que  
s'insinuer la saume des mains; auquel on  
ajoute qqes grains de jus de Citron, pour  
en diminuer l'ardeur.

Il en est qui servent encore de test de  
mais nous avons fait voir comment cela  
l'écieus, en ce qu'on pouvait en absorber  
par la la mort. On pourrait également se  
de pilules Mercurielles sucrées, pour les  
pressantes qu'on souvenait traités sans succès  
quelles ont la gale, ce qui est difficile à cause  
leur usage.

# De l'Ulcer Dardreux.

332

Ces deux se traitent pas ces sortes d'ulcères  
d'une manière étendue, par ce que l'usage à remède  
comme il y a une affection générale de tout  
le système, qu'il s'ensuivrait des effluves, ou  
qu'il survient d'administrer différents moyens  
à l'ulcère.

Cette sorte de Maladie n'est point en core  
bien connue, en ce que l'affection dardreux  
par elle-même ne l'est point. Elle n'est qu'une  
insupportable de contagion, à savoir qu'il existe  
d'effluves constants avec les personnes, tel que cela  
arrive chez celles qui sont rassemblées. *Effluve* Causes  
survient d'une manière héréditaire, les enfants  
naissent de parents qui en étaient  
affectés. Le tissu de la peau qui est *ulcère*  
qui en est affecté, se voit point insupportable d'un  
être affecté profondément.

Cependant ces ulcères succèdent à une éruption  
dardreux, d'autrefois à une solution de continuité  
des parties molles, produite par une cause extérieure.  
Plus qui se manifestent à la suite d'une éruption  
dardreux, d'autrefois à une grande étendue,  
tandis que d'autrefois ils sont peu considérables,  
succédant dans le dernier cas à la chute des  
écailles qui tombent. On peut les  
confondre avec les tumeurs vésiculeuses, mais alors  
il faut avoir recours aux interrogations du malade.  
Il survient *effluve* d'une manière spontanée,



338

d'autrefois, pour, acquiescent une étendue plus  
 considérable, que l'on a encore appelé  
 phagéduniques.  
 Les lieux où ils se manifestent le plus est  
 visage et les mains, qui me font dire l'hygiène  
 une macule très rapide d'usage circonstanciel  
 Il est une couleur rouge, vive, de manière  
 à dire qu'ils ont une tendance à la guérison  
 que se sent point. Les lésions sont aussi une forme  
 mais, tumeurs, inégales, qui sont en fait  
 douloureuses, tandis que d'autrefois ils le sont, ne  
 de douleur, restant stationnaire le plus  
 étant plus particuliers aux femmes qu'aux hommes.  
 Traitement. Il ne requiert jamais de traitement  
 des médicaments externes, mais une cure  
 des internes, qui sont pris dans la classe des  
 tels que des tisanes amères, le petit lait &c. &c.  
 le traitement est point sucré. L'usage  
 pour qu'il est un peu suspect. Quand  
 quelques matières, on fait usage de l'eau de  
 quels sont les abandons à des mains  
 que l'on traitement est purement interne.  
 Quand on s'agit de lésions qui surviennent  
 les engorgements, quantité de la surface  
 du corps, il faut être très exercé sur la main  
 d'usage. Il faut les faire disparaître, parce qu'  
 sans cela il en résulte des inconvénients. L'usage  
 de la saignée au visage et qu'on n'en abuse  
 les guérissent au service de la lésion  
 d'usage, probablement à tout autre usage

Ulcères Du cinquième genre. 224

Il se trouve d'ordinaire dans ces ulcères, tant internes que  
externes qui sont occasionnés par des causes  
régulant dans l'économie qui influent sur  
tous les systèmes, tels que les Vénériens des - par eux causés  
scorbutiques, les scorbutiques et même la Rachitis interne  
la Périoste diffère des autres, en ce qu'il a  
d'abord commencé par être une Maladie  
inflammatoire.

19 Les Ulcères Scorbutiques.

Ces ulcères ainsi - ce nom à ceux qui sont  
entretenus - ou produits par une cause inconnue,  
qui peut dépendre ou de la température de l'air - Cause  
atmosphérique ou bien de la manière de vivre, et les  
circonstances dans les quels se trouvent les malades  
qui tantôt surviennent chez eux qui sont affectés  
du scorbut, comme chez ceux qui ne le sont point.

Jamais ils ne se manifestent chez les  
personnes proutant, malgré ce qu'on  
a dit anciennement la dors, mais bien à la  
main et excoiation, quoiqu'il soit maintenant au  
sacré et assez bien. Ils arrivent plus particulièrement  
chez ceux qui voyagent sur mer, que chez ceux  
qui se trouvent sur terre; ce qui tient à la  
situation dans la quelle on se trouve, et  
les quels sont obligés de manier la même  
manière de vivre, plus de nourriture des mêmes  
aliments, qui sont des grandes salées; ainsi que  
par la même que les scorbutiques deviennent plus  
considérables chez les personnes la qui ne souffrent  
point du scorbut de terre comme au la



prétendu, qui s'il étoit moins considérable  
 étoit pareil à celui-ci même d'employ  
 qu'il faut pour la guérison, lequel paraît être  
 présumé particulièrement aux approches de  
 l'hiver, et digère au printemps. Au lieu  
 de rester assis, chez celles qui se trouvent dans  
 l'hospice au régime de personnes, qui sont  
 mal dains et du lieu est mal nourri, qu'il  
 n'est point rare de le voir chez ces personnes  
 se trouvent bien et habitent dans les lieux.

Signes

On les reconnoît au ce qu'ils restent toujours  
 dans le même état. Les curieuses sont pleines  
 malades, livides, qui s'y ont touché rendent  
 l'air en même temps qu'ils sont un peu en  
 l'air cela fait dire présumé l'état de constitution  
 qui si au interrogé le malade et qu'on le gué  
 l'ho la manière de vivre, les lieux qu'il a habité  
 joint aux engagements des personnes, l'air qu'il  
 qui sont livides, saignants, aux lésions de  
 les malades qu'on voit de la même manière  
 s'il y a une lésion de l'organe, puis enfin aux  
 lésions en manière de guérison qui se voient sur ce  
 qu'on appelle pétéchies, ou à l'état de lésion de  
 que les malades sont affectés de lésions.

Continuer

Les signes de l'écoulement de la guérison sont  
 de ces sortes d'écoulements, de ces mêmes signes  
 qui conduisent point le lésion. Ainsi il faut  
 faire changer la manière de vivre de l'écoulement,  
 l'air de l'habitation, ce qui ne peut que  
 être prouvé que pour les personnes de lésion,  
 on peut les faire passer de l'écoulement de l'écoulement.

de la le défaut d'acquisition le plus souvent 237  
misquelles en sont toujours le résultat. L'acné  
sabbée. quand aux autres maladies à englober  
ils sont purement impérieux; mais au même  
spécialement les touffes, et sont spécialement  
tirés des végétations, tels sont le défaut d'usage  
le Bécabanga, le Crasson. Ce fait en général  
faire l'histoire de tout ce qui peut aggraver la  
maladie.

## 2<sup>e</sup> Le Vercé Scrophuleux.

Ce genre d'ulcère attaque spécialement les  
enfants, qui n'ont pas encore de dents. Ils se  
trouvent chez des personnes avancées d'âge. Il se  
développe pas seulement dans les glandes  
lymphatiques, mais les médecins croient qu'il  
résulte, qui le croient être produit par les  
crémations de la lymphe, dans le défaut de  
circulation, ce qui n'est pas, puis qu'il se manifeste  
en premier lieu où il se manifeste, au lieu de  
voir qu'il ait une tendance également à affecter  
la peau de la tête, les glandes, les glandes, les  
plus de suite les ligaments, les artères, les veines.

Tant qu'il se soit vu par une cause  
héréditaire, d'autres fois par la manière, (C'est-à-dire)  
manière de vivre, les lieux humides que l'on  
habite, la situation des glandes.

Pour le connaître on le forme si les  
parents n'en sont point atteints, qu'il se  
trouve et cela est souvent le fruit de la chose.  
Qu'il se forme bien de faire qu'il se porte à  
un long et long développement à cette maladie.



338. Avant l'entrée la peau mince, détreinte, relâchée, les yeux larmoyants, les aïeux du nez saillant, les lèvres un peu gonflées, ils ont les épaules dures avec une tache rouge habituelle, qui peut tenir à l'état, laquelle se trouve la membrane muqueuse du nez. On remarque particulièrement chez les gens du pays qu'il y a point rare de l'écoulement d'autre chose. Les enfants se manifestent par l'engorgement des glandes lymphatiques, l'infirmité par l'engorgement de la tumeur cellulaire, au lieu d'être les organes, qui forment des tumeurs, qui surviennent d'une manière lente, puis dégénèrent en ulcères d'écrouelles, les quels ont tantôt une grande étendue, tandis qu'autrefois ils en ont une bien plus commune que de les voir au col. Quelque soit la manière dont ils se manifestent, ils ne guérissent jamais l'aspect de l'écoulement d'autre chose, mais toujours un pectus, les larmes, les yeux, les lèvres, le nez, le plus ou le moins de la nature, ils ne guérissent rarement leur tendance à la guérison. On se voit souvent quelques d'autres signes tels que la rougeur du nez, qui à la fin du nez, qui en lui-même le col au point qu'il y a engorgement des glandes lymphatiques, qui se font pendant l'enfance et se guérissent d'engorgement. Engorgement rarement un peu se comprendra l'écoulement d'autre chose, il se guérissent que du nez au nez ou par les yeux, on s'efforce à employer pour guérir les ulcères d'écrouelles par le moyen d'engorgement, lesquels se trouvent de l'engorgement et d'autre chose de la laryngite.

Francisco  
Quinta.



est ainsi qu'il faut que les capotes aient  
de l'humide, qu'ils habitent sur un sol sec, l'été  
humide, qu'ils ne vivent que d'aliments terreux  
les ans, & non dans les végétaux comme on le  
pense pendant une longue série d'années.  
De l'humidité, qu'il y en a qui sont si faibles  
qu'ils ne peuvent point, au bout d'un an, en faire  
une vie propre, logique et ne vivent que ce  
qui se trouve dans cette classe. Sont ainsi qu'un  
dame ouvre le vin d'absinthe, le Rhin de l'hy-  
anti-tourbative, le amara. So. Il y a des rhumes  
qui font faire usage de liques purgatifs, tels  
que les pilules de Rhubarbe, l'est le dans jours.  
Des fécules sèches sur le Rhin et l'absinthe.  
Sont avec le quinquina, en un seul point im-  
mense. Il y en a encore qui établissent un  
cancer à l'âme malade. D'autres enfin qui  
abandonnent à eux même et par conséquent  
sont spécialement le jeune fille, qui qu'elle  
saurait au moment de sa puberté. Les cas  
sont pour l'essentiel d'après être rempli  
de l'absinthe, pour produire leur effet, une  
point 99. jours, en 99. mois; mais les plus.  
Au cas d'après d'autant plus porte à l'absinthe  
traitement, que l'absinthe, l'absinthe au Rhin de  
diminuer augmentent d'absinthe.

Quand après d'autres par eux mêmes, ils  
accident, et risque d'être, 99. cependant au fait usage  
de l'absinthe, peu que les autres sont d'être, 99.  
pourrait être bien d'être, 99. d'être d'être  
d'autant, plus que la quinquina au Rhin de l'absinthe  
que l'absinthe est difficile à l'absinthe,  
que l'absinthe même l'absinthe, l'absinthe l'absinthe



34. Ils se trouvent donc même au vagin et au pénétrant  
d'ailleurs souvent la cicatrice qu'on suppose n'est  
point aussi avantageuse pour l'individu que l'on  
pourrait croire.

Ils ont une précaution à prendre, quand ils ont  
longo siège d'attente de ce, parce que souvent si  
on s'arrête suite de tenir la tête droite, alors  
peut être remonter de suite au moment de l'écoulement  
et on se trouve dans cet état. On doit savoir  
que toujours l'écoulement n'est pas la même, et  
peut être suite d'une petite lésion et qu'il y a une cicatrice  
assez difforme.

35. De l'écoulement Vénérien.

Cause. On ignore entièrement la manière dont se fait  
l'écoulement du Vénérien et comment peut  
se faire cette éruption. Cette éruption se fait spécialement  
chez la femme. Les membranes vaginales  
s'ouvrent au se trouvent les membranes vaginales  
qu'elles peuvent se faire, quelle est leur forme  
autre manière, et ainsi de suite. que les enfants  
la contractent dans le sein maternel de la mère,  
ensuite indépendamment de l'état sain dans lequel  
peuvent se trouver les membranes chez une individu  
tandis que chez l'autre elle est saine. On peut  
contracter l'écoulement du fluide Vénérien dans  
le moment du coït, sans que pour cela aucun  
symptôme ne se soit manifesté chez eux, mais  
quand le Vénérien était déjà établi, pendant  
le coït, il est apparu que cela se  
plus de femme, à la femme, qu'elle s'est  
par l'écoulement du fluide Vénérien, qu'elle s'est  
produit la dans le moment d'une affection locale  
par l'écoulement qu'il y peut être, et ainsi de suite.



que la même chose n'a point lieu pour l'homme.  
 Les indurités muqueuses peuvent résister -  
 l'absorption du virus venérielle sont tout ensemble qu'elles sont  
 recouvertes par les membranes muqueuses qui - qu'elles sont  
 tout en contact avec l'air, qui sont les conjonctives, l'absorption  
 le nez, la bouche, le mamelon, l'anus, puis de  
 il faut y voir une association à la peau que  
 le fluide vénéreux y sera déposé.  
 Quelque part pour un il s'absorbe, il communique  
 dans le premier abord à produire des symptômes  
 primitifs, et à déterminer une maladie locale  
 le quel sera suite indolente d'abord l'écoulement,  
 et produira ce qu'on nomme la maladie vénérienne,  
 qui est déterminée tout par l'absorption. De l'écoulement  
 au lieu par cause sympathique. Il se fait remarquer  
 spécialement sur la peau, les membranes muqueuses,  
 le tissu cellulaire, les os et q. d. même sur des  
 organes, et qu'on le remarque pour les puerpères,  
 qui dans dans q. d. cas donne lieu à la syphilis.  
 On la remarque également sur les glandes  
 sympathiques, q. d. souvent se trouvent affectées  
 premièrement à cause des vaisseaux sympathiques  
 qui absorbent le virus et qui peuvent le déposer  
 dans elles.

Son absorption par les membranes muqueuses  
 donne lieu chez l'homme pour le canal de  
 l'urètre à la chaude pisse, chez la femme à la  
 blennorrhagie, et les fers que la maladie est  
 locale et qu'il ne se fait qu'un écoulement  
 purulent; lorsqu'il détermine une association  
 comme en même endroit il procure le chancre  
 de l'écoulement. Dans tous les autres endroits où il se

requiert distinction  
 dans l'écoulement  
 remarquer.



~~Des~~ Vénériens, d'autrefois des excrémens, qui sont même  
Venus, poireaux, qui peuvent survenir sans être  
au lieu que 15, 20 jours après.

Sur la peau il se forme aussi des ulcères  
Vénériens, d'ordinaire de petites Verrues ou pété-  
qui contiennent de la Stéatite; puis enfin des car-

Sans les glandes Sympathiques saignent et  
sont enflées, qu'il faut bien distinguer d'avec  
les engorgemens Sympathiques, qui dans le pre-  
mier Dégénération en abîme et constituent ce qu'on  
nomme Chancre avec tous qu'ils suppurent.

Locaux du 15. Primaire Vénérienne. Pour connaître les ulcères Vénériens,  
Il est des questions à résoudre qui jusqu'à présent

ne sont point encore été. Sçavoir de sçavoir s'il y a  
absorption du fluide Vénérien dans l'indolence ou  
s'il se la gomme, ou bien transport au moyen  
de l'absorption, ~~qu'on ne doit pas~~ dans la formation  
puisquelle ne se fait plus que huit jours après  
le coït; si l'engorgement qu'on observe dans les glandes  
à bien sympathiquement au lieu par transport  
du fluide Vénérien. Si tant le chancre n'est  
affecté également que sympathiquement ou bien  
par absorption du fluide dans le cas d'ulcère  
Vénérien exquiescent très essentiel à sçavoir  
le traitant, tant et même point encore.

Si les praticiens ne sont point d'accord sur  
ce que c'est que la gomme Vénérienne, ils la regardent après pour la gomme  
la gomme n'est qu'une maladie locale, mais  
également, qui quand elle est ancienne peut  
détériorer les symptômes de la Maladie Syphilitique  
et cause par suite la Maladie Syphilitique  
aussi est-elle pour cela qu'on ne peut tout, dans







344 Le premier, c'est que le sang parvient à la surface de  
des vaisseaux vivants la masse d'un de ceux-ci l'un  
alors l'un soit par suite cellulaire mou à cet  
affecté de néoplasme.

D'après tout ce que nous avons dit ci-dessus,  
ulcères vénériels sont concurremment primitifs et  
Vulcra consécutifs, des primitifs sont ceux qui arrivent  
Vénériels primitifs directs nés au a été déposés le fluide  
et consécutifs  
Vénériels, tel que ceux qui surviennent aux parties  
de la génération, et consécutifs sont ceux au contraire  
qui ne surviennent que longtemps après par  
affectation de tout le système, tels que ceux de la  
de la Voie du Palais.

Les Ulcères primitifs au contraire ne se développent  
qu'au début de la 7<sup>e</sup> & 8<sup>e</sup> année, qui sont communément  
par des petites pustules qui continuent de la 1<sup>re</sup> à la 2<sup>e</sup>  
puis font des progrès, lesquelles se transforment en  
de sorte d'inflammation qui venant à se résoudre  
contient l'effluve qui se laisse à leur place en sorte  
d'écoulement qui fait des progrès et constitue  
qu'on appelle l'ulcère vénériel, quand se commencent  
l'appetit inégal, décampse, et tout un grand ensemble  
est effluve de ne peut empêcher de se développer  
d'écoulements qui surviennent après aux parties  
de la génération soit au prépuce chez l'homme  
et bien le Vagin chez la femme, après de l'écoulement  
ulcères, qui peuvent survenir dans les affections  
auxquelles on se livre dans le moment de la  
qui après tout est chez ceux qui ont le prépuce  
d'abaissement, au lieu quand le Vagin après  
d'écoulement de l'écoulement qu'ils en sont privés  
Vénériels, par le rapport que l'on a fait



indépendants, puis surtout ils ont une tendance 34  
à leur guérison, car sans cela on pourrait  
arriver précisément qu'ils sont vénériens, ils devraient  
être plus d'une quinzaine de jours, que l'empêcherait  
l'usage du sérum de Galien (sans simplification). Les  
conséquences au bout de certains praticiens dans ces  
circonstances pour en savoir faire la distinction,  
alors ils viennent en eux. Administrer des  
dents. Vénériens que de ne le point faire dans la  
crainte de l'altération des os. Le sérum de Galien,  
ce qu'il faudrait faire en pareille circonstance,  
en ne les administrant point cependant comme  
quelqu'un le fait, car il est qu'il en a une  
un mauvais aspect et qui pourrait en imposer  
pour un vénérien, ce qui n'est pas possible, ce qu'il  
attire la coagulation de l'infirmité, c'est pour quoi  
il faut être de précaution pour cela.  
Des palais, au point de dire dans presque  
tous qu'ils sont vénériens, surtout ils ont été  
précédés de plaques, parce que rarement il n'a  
rien développé d'abord indolent, qui devient  
devenant tellement envahissantes qu'on n'a  
plus les guéris, parce qu'ils ont détruit toute  
la membrane muqueuse; Cela est d'autant plus  
facile que souvent les personnes qui les ont  
ne le disent point, qu'ils cachent leur maladie  
et si elles sont en la réalité.

Pratiquer

Les moyens à employer pour guérir les  
autres vénériens est de leur donner un  
effet lorsqu'ils ont que localement ou en usage  
alors que ceux qui n'agissent que localement, c'est



38. Mais si que l'on peut employer l'ingrédient mercuriel, le  
gaspard sans de la précipitation, en faisant remarquer  
que la précipitation est tellement prompte qu'il y a peu  
peut le ramener au légal, lequel cause la  
dépense de l'argent, que l'on doit épargner pour le  
moyen de l'argent, soit de l'argent, pour le  
moyen de l'argent, dans la ville on peut avoir  
fait l'essai que l'on a fait en l'année 1771, de la  
forme de graine de lin, de la racine de germande  
à la quelle on peut ajouter un peu de sa racine  
pour que les douleurs soient trop considérables, pour  
encore y appliquer un cataplasme. Il faut savoir  
que pendant le temps de l'administration de la racine  
de l'argent, il faut être très attentif à la cause  
constitutionnelle, il faut en même temps  
qu'on applique des moyens locaux d'administration  
interne.

C'est quand on administre à l'interne sans  
les remèdes mercuriels, qui sont employés  
mercuriels, on lui donne les plus et les plus  
se composent de l'abaissement de la racine de l'argent  
des origines de l'argent, à la dose de trois  
grains dans une lixivre de l'argent, qui se compose  
qu'on nomme la lixivre de l'argent, pour  
malades peuvent être employés dans un état  
d'argent, on doit être très attentif, pour l'argent  
surtout, avec le motif de l'argent. On peut  
encore donner le mercure à l'interne, pour  
dissolution de la membrane sanguine, intestinale  
au moyen de l'argent. Remarque très précieuse  
mercuriels sont mis en usage, qui sont  
avec du mercure et du l'argent, au l'argent  
grain, à raison qu'ils donnent une marque

L'usage affecté.  
 On pourroit encore employer d'autres  
 moyens que la muscade pour guérir les maladies  
 phréniques, si l'on pouvoit faire usage de  
 du doré qu'on a fort souvent employé à la place de la lignee  
 de l'insolence, avec quelle on a vu d'ailleurs  
 pour les malades, tantant qu'on les a employés  
 avec de l'alcool.

Дух.

des cartilages.

La Corie consiste dans une érosion de la substance spongieuse des os, qui équivaut à un effet semblable à ce que les alvres font sur les parties molles, qui est différente d'aplasie qui affecte spécialement la partie compacte des os.

Cause.

On peut rapprocher à trois ordres causes, ce qui donne lieu à la Carie 1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> causes. Des causes qui procèdent d'elles, qui quand elles la produisent déterminent son



348 Effection locale, la quelle tend insensiblement à  
Des progrès, 2.<sup>o</sup> par une cause occasionnelle  
l'apoptose, c'est ainsi qu'on la voit arriver  
qu'il existe aucun vice à l'intérieur, au ce qui  
appelle virus, spécialement par l'usage du cat,  
Des pollutions. 3.<sup>o</sup> Enfin par une cause  
existante dans le système, tel que le virus  
herpétique, même le scorbutique, lorsque la  
Maladie scorbutique est portée à un haut degré.  
Ces trois nous arrêtons point à la malade  
dont agissent les deux ordres de causes, mais les  
au premier qui les plus souvent succède à une  
Nécessaire extérieure, c'est ainsi qu'elle arrive  
suite d'un point, qui sans doute ne se développe  
que par le moyen d'une inflammation locale qui  
manifeste dans la partie, qui est la seule man  
prent la quelle la Carie peut succéder à une  
Statue du dehors, ce qui la différencie de  
des parties molles, qui jamais ne survient dans  
qu'il y ait eu une altération de continuité dans  
parties.

Elle peut se manifester de deux manières, la  
Séparément à la suite d'un point qui a lieu dans  
partie, en ne se faisant voir qu'à la superficie  
de l'os, d'autrefois à la suite d'un gonflement  
qui est devenu plus ou moins considérable,  
qui est la cause la plus ordinaire, après l'être  
entière ramollit, et l'importe comme elle agit  
elle se développe toujours lentement, que l'on  
pour prévenir lorsqu'il existe depuis longtemps  
qu'il se forme à la superficie un dépôt d'une  
lente sans s'en apercevoir.  
Lorsqu'ils ont été déposés proche la superficie



du corps, surtout de ceux qui ont cet air  
l'air qu'ils ont traitée lorsqu'ils sont profondément  
glacés, de plus forte à une distance plus ou moins  
éloignée de l'endroit en formant la même tumeur  
qui sent de même <sup>ainsi</sup> que par eux la respiration,  
au lieu que l'air au-dessus qui dans le dernier  
cas constitue comme les autres d'un aspect  
des dépôts en général, ceux qui nous nous par  
congestion tel qu'un, en un exemple par  
de la cellulose épaisse, dont nous parlerons  
en ne traitant.

Il est bon de faire remarquer que toutes  
les fois qu'ils ont leur siège près de l'endroit  
affaibli le sinus qui donne passage au pus, ils  
sont toujours plus fâcheux, en ce que l'air tend à  
par effusion et ne gagne l'endroit carie.

La Carie est plutôt envisagée comme les  
anciens le faisaient, présentement, qui croient qu'elle  
vient de la carie, que par le contact du pus  
sur l'os affecté, qui vient le résultat d'un foyer  
purulent formé, tandis que les praticiens  
modernes admettent l'écoulement, et admettent qu'elle  
admettent cette opinion, on se rendrait compte  
également de même, on fait l'écoulement d'un  
dépôt le plus possible, de même que ceux  
qui ont leur siège proche les grandes cavités,  
non point pour épargner la Carie d'une part,  
mais bien pour empêcher la diminution des  
os par la suppuration sur eux; d'autre part non  
plus crainte qu'il ne pénétrât dans les cavités  
paris, et par conséquent que le pus à plus de tendance  
à sortir au dehors, mais dans la crainte que  
l'air est plus relâché, car on en a 99. exemples.



Signes

350 On reconnaît la carie dès qu'à la situation qu'occupe l'affection, puis du temps une éruption qu'elle s'est formée.

Quant à la situation qu'elle affecte elle est ou près de l'utérus ou comme dans les autres cas, au loin. Elle est ou dans un dépôt sans congestion, sans l'ancienneté, ou a lieu de la présence de tout le fait que l'affection existe depuis longtemps, qu'elle peut être froide, grise, brune, qu'il pourrait se faire également la confondre avec un dépôt froid, qui également se forme d'une manière lente, et en général à peu de chose, tantôt le fait qu'on s'est trop tardé de se préparer avec une préparation mercurielle. ~~Observation faite~~ il y a déjà longtemps. Si l'on avait de l'incertitude sur l'existence de la carie, on pourrait dans le cas de l'ancienneté l'absence est un peu considérable, y introduire le bout d'un doigt, se qu'on s'en peut passer la langue ou bien encore avec le bout de la langue qu'on fait connaître les irrégularités de l'os, au lieu même son état de qualité, puis que q. s. elle pénètre dedans.

Traitement

Puisque la carie à une grande tendance à faire des progrès, et qu'elle est souvent entée par une cause interne, son traitement est en deux basses parties. D'abord on doit chercher à la détruire par des moyens locaux; puis par un traitement interne.

Le traitement interne ne doit être mis en usage que lorsqu'il y a q. s. d'une cause interne qui l'a causée, au lieu qu'il l'entretenait.

que le Vénérien, le Scrophuleux, le Scorbutilique. 261

Le local que l'on est en usage à pour-  
voir de cautérisation on nécrase la partie affectée,  
dont la nature doit ensuite faire la séparation  
au moyen de l'excubation; les moyens qu'on  
emploie à ce sujet sont plus au moins puissants  
suivant que le Carie est plus étendue et quelle  
fait p. un de progrès. Lorsqu'elle fait un  
progrès lent on a recours à des moyens  
spirituels par où elle empêche d'effranchir les  
parties à l'écart, qui sont au les cautères  
plumacaux qui en sont insupportables, tel que de  
l'alcool, l'eau mercurielle, une dissolution de  
potasse caustique de la nature de collirge, et  
d'alois. Toutes ces substances produisant un tel  
excitement dans la lésion on les applique,  
qu'ils peuvent faire changer la Carie en  
cicatrise. Dans le Cas où elle aurait fait un  
tel progrès qu'elle ne seroit point apte à faire  
plus la détruire, il faudroit avoir recours  
à l'emploi du Caustère actuel, que l'on  
applique à une, deux ou trois fois plus au  
moins, suivant les circonstances, offrant pour  
cela avoir soin de mettre les parties à l'écart et  
de garantir les parties saines avec des moyens  
suffisants; Il y en a qui seroit de l'ingérence  
il faut éviter de l'usage de petits cautères  
de Carie, en rugissant de l'on met un  
peu d'au moyen de la rugine. Lorsque l'on  
est emporté exsiccation sèche on applique



Ordonne des emolumenta selon son mérite, et selon  
l'usage en général le plus utile à l'usage pour  
la Carrière mais comme suivant chaque partie  
affectée exige quelque modification alors nous  
avons par conséquent les lois qui en sont  
attentes, suivant l'ordre anatomique, en observant  
toutes fois que nous examinons ou cela les parties  
des os longs, en ce que la carie succédant  
plus tard la ce qu'on appelle l'os blanc,  
alors nous en parlerons en son lieu.

Cette loi suit chaque partie affectée

De l'Os du crâne Les os du crâne sont assez fréquemment lésés  
de Carie surtout le coronal, soit à la suite  
de carie, ou bien de dégénération sénile. Nous nous  
en servons y appliquons les topiques irritants toutes les  
fois qu'elle est peu profonde, car si elle était  
plus profonde, il ne faudrait pas se  
plus se servir de cautère actuel, ou avec grand  
circonspection à moins que ce soit qu'elle  
légèrement lorsque même toute l'épithème des os  
est devenue affectée, parce qu'elle pourrait produire  
l'effet de la carie et le Carie, pour  
distinguer la mort, comme on le verra dans  
l'usage d'autres recourses dans ce cas, qui est  
parfois les autres os des os longs affectés  
inférieur du tibia, à l'apex du fémur le seul en général  
qui les aient employés tous en même temps  
sur une personne qui avait été délaissée de  
tous les praticiens, lequel avait plusieurs heures  
sans être opérée. D'autres auteurs ont cité  
encore des exemples.

Parmi les os du Crâne, il y a encore l'apophyse 53  
mastéoïde qui est très fréquemment soumise à  
la Carie qui survient assez fréquemment à  
Députa De l'oreille, laquelle occasionne ce vice  
douloureux; elle est d'autant plus liée qu'il s'y trouve  
à son intérieure une grande quantité de cellules.  
Voyez comme il n'y a d'autre chose à faire  
que ce qui nous avoit indiqué.

Dans le nombre des qui occupent la face, les 54  
os unguis sont d'abord séparés, qui à leur même  
temps que la fistule lacrimale, qui succède à  
la solution des larmes, ou au catarrhe de la membrane  
unguis des conduits lacrimale, qui a été enfoncée  
longtemps avec cette dernière. Lorsque la carie  
a lieu, souvent elle commence au même temps,  
en sorte la cause que les produit le fait du  
l'os et la membrane dans le même instant. L'os  
qui survient de fait en partie circonstance, a  
été très récemment mis en usage, et l'on en  
en cite un exemple, nous y reviendrons en  
parlant de la fistule.

Les os après de ces le deviennent 55, qui os par du  
quand cela arrive, et quand dans tous les cas la Carie 56  
succède à ces os de l'oreille, 57, cela est  
vu encore dans l'affection de la membrane  
unguis nasale. Parvenant au point que  
chose, parvenant obligé de traiter la Cellule  
comme étant affectée de Carie, alors celle  
guérit la Carie est également, qui l'ait  
transférée à la place qui y est.





en parlant des articulations.

360

Mais ne parlerons point également des dents, qui peuvent en être atteintes, ou ce qu'on en fait, des dents, d'une manière particulière retranchée de la mâchoire, qui n'y aueit pas d'un autre côté de la mâchoire, ou faisant remarquer quelquefois lorsque cela arrive jamais elles n'ont les mêmes usages que les autres, et, nous disons nous en parlerons en parlant de l'affection de l'appareil gastrique.

Vient ensuite la Carie du Larynx, dans Du larynx nous ne traiterons qu'en parlant de l'affection de la hyoide. De cet organe, auquel nous joindrons la hyoide, dont les autres nous presque point en parler, ou que l'on ignore.

Le Sternum peut également être affecté De Sternum de Carie et même y est plus exposé qu'une autre, et, suit à cause de sa position qui est de travers, et de sa forme extérieure, par les os. Des os du Sternum qui se forment la base du thorax, qui ont fait développer les os du thorax, et y a point d'autres os que ceux indiqués pour la qu'on a dit à dire les os des os spirituels, puis l'appropriation des os des os actuels; qu'on repense en général à mettre en usage les os de l'os, cependant avec tout sans que cela arrive de cause la mort, puis qu'on a des exemples de personnes qui ont été guéries.

De Cotes Les Cotes sont rarement affectées de Carie, cependant qd. elles en sont atteintes malgré



67 *De l'os du crâne, qui quand elle arrive à l'extrémité supérieure  
est à l'extrémité postérieure, s'étendant au-dessus  
est à l'extrémité antérieure, qui est à l'extrémité supérieure  
d'une fracture produite par les plaies de crâne après  
laquelle il y a une élévation des côtes, l'os  
peut guérir de service des costigues, dans la cavité  
au-dessus et d'intéresser les pommus et par là d'être  
des accidents; c'est dans cette élévation qu'il y a le plus  
point douloureux plus que cette opération, de l'os  
à faire, et que la partie dans cet état est douloureuse  
très faiblement; C'est pour cette fin que les malades  
le font servir qu'il faut le faire, au-dessus l'os  
est de l'os, et de la région.*

*Des vertèbres* Les vertèbres sont très fréquemment affectées de  
carie, à quoi on dit premier état d'infirmité postérieure  
des côtes, qui sont tellement costigues qu'elles sont  
presque toujours ensemble. Cette maladie arrive  
dans plusieurs manières, tantôt sans qu'il y ait aucune  
goutte d'os, une tumeur, un ramollissement  
qui amène qu'elle se déclare, donne lieu à une  
dépense dans le tissu cellulaire, tantôt sans aucune  
tumeur, cela à l'extrémité qu'il y a affectation  
de la colonne vertébrale, par le poids du corps  
et donne lieu à la carie de l'os, à ce qu'on  
appelle maladie de l'os, sans aucune tumeur  
la maladie d'os, au-dessus en core (Pithuité)  
La carie des vertèbres par l'os, au-dessus  
et au-dessous la ne dépense l'os, sans qu'il y ait  
donne lieu à ce qu'on appelle dépôt par

Pangostie, qui sont communés à tous, que par ex.  
Ces pas fussent à une distance plus ou moins  
éloignée. De l'indroit où il est formé tel que l'épave par-  
telle des vertèbres à l'aine, au lieu qu'il y a des premiers cailloux  
cela ne sautait à l'esprit que l'on reconnaît au la-  
vageant. Cela offre des difficultés, car l'la. Borge  
nous le fit observer à la charité, par un homme  
au moyen d'une tige que l'on porta dans l'aileron  
de l'aileron; ceux par pangostie sont plus fréquents.

Aucune cause est plus fréquente par les causes  
causes que la masturbation, mais tant-ils-  
plus fréquents chez l'homme que chez la femme, que  
toutes autres causes sont les occasions de tels.  
que les virus vénériens, scrophuleux, le coqueluche  
même la syphilis, de causes qui produisent des  
Maladies dans l'oséum, comme par les  
Dartres, Galles, etc.

Cette Maladie peut affecter les vertèbres -  
Cervicales, Dorsales et Lumbaires, mais spécialement  
les deux dernières régions, qui ne font développer  
peut-être d'abord intérieurement, en même temps que  
les apophyses transverses, qu'en général la maladie  
est adhésive, d'abord on ne peut qu'une  
l'immobilité de la Colonne qu'on appelle la Colonne  
ou les ligaments commencent à se former d'abord,  
qui donne lieu aussitôt à la formation  
d'un dépôt, dont le plus souvent on voit réunir en  
certaines quantités, entre les vertèbres  
et d'abord entre les parties dans le bas.



Signe de la vie animale, qui par le mouvement  
entre les viscères et vient se manifester dans  
des endroits différents, tantôt c'est à la marge  
de l'anus, d'autres aux lombes, puis ailleurs il  
tient des moments le trajet des vaisseaux iliaques  
et vient se manifester à l'aine (au lieu même d'un  
de fasciata), et dans cette circonstance forme le  
dépôt par congestion, que l'on peut comparer  
avec les dépôts froids en ce qu'ils ont précédé  
précédés d'inflammation.

Signe La présence du pus dans un endroit  
d'amples point indiquer par congestion et  
y a carie aux testicules ou bien ailleurs. Mais  
pour cela assure égale aux signes qui sont  
précédents et auxquels ils sont. Au premier  
d'une personne quelle souffre depuis longtemps  
aux reins d'une manière d'ague, quelle a une  
maladie fébrile, quelle est liée à la  
masturbation, qu'elle a un peu de saignement  
de suite sans aucune douleur, et saignement  
dans la partie alors avec tant de douleur  
que c'est au dépôt par congestion, jusqu'à la  
fin que présente la peau, quoiqu'il paraît  
se faire qu'un dépôt, encore comme  
l'on fait de grande quantité, telle chose avec  
herve, au lieu d'un dépôt froid. On ne peut  
peut-être la herve, de se représentant quelle  
disparaît lorsqu'on la comprime, que la  
malade est dans une position horizontale  
qui apparaît lorsqu'il se met debout, ou

Lorsque l'écoulement sanguinolent est venu  
recommencer, l'écoulement du sang s'est arrêté, et l'on a vu  
un lappet atypique paraître. De quelque manière qu'elle  
ait lieu, le sang qui insart est de bonne nature  
et coagulable, le quel ne cause aucune douleur désagréable,  
qui continue à paraître pendant quelque temps  
ou même temps que la constitution du malade  
est presque entièrement changée; mais au bout d'un  
certain temps il prend un mauvais aspect, devient  
sérus et les forces s'abaissent, de telle sorte que  
la maigreur et le marasme se manifestent, qui  
donne lieu à la mort, qui arrive au bout d'un  
temps plus ou moins éloigné.

Pendant que le pus continue ainsi à couler au  
travers l'ouverture, l'air s'introduit dans tout le  
trajet fistuleux et parvient jusqu'à l'endroit où se  
trouve le sinus de l'os, le quel paraît avoir  
des effets pernicieux dans tous ces points. Mais  
personne croit que la chose est telle, car on voit  
souvent il dans que les malades succombent dans  
le marasme, une maigreur extrême? On a dit  
et à cela que ~~ch~~ l'écoulement du sang et le transport du  
pus dans l'économie, au moyen de l'absorption  
qui s'en fait, il est à présumer que cela a  
pour résultat de cette manière, comme nous l'avons  
indiqué ailleurs, puisque si l'absorption suffisait,  
il est plus à présumer qu'elle suffirait pendant l'écoulement  
que le pus se trouva en grande quantité avant  
que l'écoulement soit arrêté; il est plus probable



300. Je pense que cela tient à une cause sympathique

Car comme on a vu les diphtères parcourent  
l'il faut aussi en effet qu'on s'en lie à l'épuration du  
les diphtères par  
congestions qu'on ne guérit point la source de la maladie  
puisque c'est la carie qui la forme il faut bien  
essayer de la faire, puis qu'une part en  
supposant qu'on l'inspire, que le pus sortit en  
effet, cela ne empêchera point qu'il se forme des  
Cratements quand même pendant ce temps le tragus fût  
de fermerait un certain espace, qu'il serait  
obligé de souffrir de nouveau il faut mieux  
laisser la nature en faire l'ouverture elle-même,  
parce que l'accès de l'air est toujours nécessaire  
les diphtères de cette nature. Il est bien sur que  
l'on pourrait se permettre de le ouvrir, c'est à dire  
celui on la peau se transporter trop amassée et  
l'on soupçonnerait qu'il se fit une trop grande  
d'organisation dans la partie. On se servirait pour  
cela d'une lancette, après la quelle on pratiquerait  
une petite ouverture, après qu'on a appliqué  
un petit emplâtre sur l'ouverture une fois le pus  
sortit, crainte de la pénétration de l'air dans le lieu.

Il est deux autres moyens dont on pourrait  
se servir qui seraient préférables, qui sont de  
une seton et l'autre l'usage d'incisions.

Il faut indépendamment de tout cela soutenir  
les forces du malade, par du bon restaurant, et  
des aliments et l'usage de sauge, pour l'usage  
à supporter l'état dans le quel il se trouve, puis  
tous ceux qui sont affectés sont indiqués.



comme devant muer, puisqu'il n'y a aucune  
chose à faire, en faisant observer que tous ces  
qui bruyent en avoir guéri le sont beaucoup  
par la nature de la maladie, puisqu'il n'y a aucune  
exemple de personnes qui soient guéries de Paris  
de la calomnie épinière, puisqu'il faudrait pour  
qu'elle se passe, qu'on puis pousser y appliquer  
les caustiques actuels, et désorganisant tout ce qu'il  
y a d'affecté, ce qui est impossible à faire vu  
la situation qu'elle occupe.

### De la Gibosité, ou Maladie de fût.

Elle consiste dans le gonflement et le  
ramollissement des vertèbres, qui peut en affecter  
une seule, ou bien deux ou trois, que l'on peut  
reconnaître par la seule inspection de l'épine,  
en la palpant comme nous le dirons, comme  
dans ce cas elle doit paraître assez de saillie  
pour servir de support à tout le poids du corps, alors  
dans ce cas il y a enflure de l'épine, dont la  
concavité est en devant et la convexité en arrière,  
ne pouvant arriver sans que la vertèbre ne se  
trouve un peu comprimée au lieu lésé, donc  
il n'est pas rare qu'il y ait un changement  
dans l'exercice des fonctions des parties qui  
se trouvent au-dessus de l'enflure comprimée à  
cause des nerfs qui passent et rendent que dans  
certains cas produit la paralysie des extrémités  
inférieures, et même celle de la tête et du  
tronc, ce qu'on attribue à l'interposition



364 Des excréments fécales <sup>de rétention</sup> de la vieillesse; Ils sont même  
causes la mort, en influant sur toute l'économie  
dans le cas où l'on y remédie point de bonne heure.  
C'est qui en admet la meilleure description  
dit qu'elle affecte spécialement les vertèbres du  
col, dorsales, qui forme une tumeur dorsale  
comme nous l'avons dit, dont on peut compter  
un nombre des vertèbres qui se trouvent affectées  
la saillie des apophyses épineuses.

chez qu'elle  
survient

Causée

La gibosité affecte spécialement les enfants  
qui aient éprouvé chez eux qui sont des enfants  
qui peut arriver chez des personnes mêmes âgées  
en âge sans qu'ils soient affectés du vice de l'os  
~~de l'os~~ qu'on sache à quoi <sup>l'os</sup> se rapporte. Bien qu'il  
ce soit point quelque qui peut la produire. Au  
rien d'écouler aucun signe avant-coureur tant  
qu'elle n'est point manifestée. Chez les enfants  
où elle commence à se faire voir, on remarque  
qu'ils ont une difficulté à marcher, qu'ils ont  
le repos, qui leur cause une gêne inférieure vers le  
point de la saignée, dans lesquels ils éprouvent  
de petits pincements, qui ne cessent que lorsqu'ils  
s'arrêtent en marchant. Dans le cas où l'enfant  
a besoin à examiner pour savoir s'il est  
atteint, il faut voir s'il y a de la douleur au  
moyen de la tact, toutes les vertèbres les unes après  
les autres.

Quand qu'elle n'est point encore arrivée  
il n'y a encore des signes au plutôt accablés  
que nous dit qu'elle existe, mais ne fait pas



des progrès ils se manifestent, qui ne finit que 504  
le paralyse à lui, l'humidité ne passant plus, signes  
de l'asthme, le vomissement, alors se voit plus  
manifeste des escars gangréneuses au sacrum,  
qui déterminent l'apoplexie, qui dans ce cas  
à lui approchant de même que dans les autres  
paralysies.

Il pourroit se faire que l'on confondit  
cette maladie avec le Rachitisme, ce qui seroit  
faux pour le traitement, que l'on ne comprendra  
point, cependant en faisant attention que les  
enfants affectés de cette dernière affection présentent  
un aspect de langueur dans toute la saignée  
qu'ils ont les articulations très grosses par le gonflement  
des extrémités des os, lesquels pourroient se gon-  
fler, si l'on leur imprimait une pression de  
compression tandis que la Gibbosité ne présente  
pas cela.

Quoi que la Gibbosité soit une maladie très fréquente  
fautive, qu'on a vu un petit nombre de personnes  
qui en savent quelque chose, cependant elle l'est moins que  
la Carie de la colonne vertébrale, puis qu'on ne voit  
point de cette dernière, qui fait mourir de l'autre  
d'un temps plus ou moins long.

Les moyens à employer contre cette maladie,  
consiste dans l'usage des excitants qui font l'usage  
par l'usage de l'opium, que l'on suggère ses amis,  
le quel on administre, mais qui ne réussit que dans  
paralyse des extrémités inférieures, qu'on ne regardant  
point comme un remède en faisant passer  
rien n'est qu'un effet, produit par l'usage des



56. *Unguentum*, au moyen de la compression de la malle qui  
est à présent que l'usage de ces unguents  
ont inféré tant d'avantage. *Silicium* pour être  
la physiologie moderne l'aurait fait faire, si le  
apport ne lui fait. Ils agissent sans doute en produi-  
sant l'évacuation du fluide morbifique qui produit  
cette maladie, ou bien sympathiquement, mais  
qui jamais ne redonne à la colonne épinière,  
d'extension qui lui est naturelle, malgré que les  
vertèbres peuvent bien <sup>prendre</sup> une forme, *Parati* nature  
font ne font que <sup>usage</sup> quasi *Silicium* et de  
cancer, *Unguentum*, qui agissent d'une manière  
mais jamais assez en que l'effet en est trop grand  
et doit être de servir de caustique fait avec la  
potasse caustique, préférablement avec la *Unguentum*  
au pratiqué avec l'instrument tranchant, son effet  
est plutôt *Unguentum*, qu'il fait comme  
dans l'usage dit, au moins quinze jours, pour  
supprimer l'usage, *Unguentum* de *Unguentum*  
tant est dans l'état qui survient. On peut  
faire usage du *Unguentum*.

On le place ord. proche du lieu affecté,  
plus près qu'il est possible. Dans les premières  
ont une *Unguentum* que deux, l'une de chaque  
qui par le *Unguentum* redonne *Unguentum* l'adapte  
soudite qui survient au *Unguentum*, sans pouvoir  
que la colonne redonne. *Unguentum*, comme on  
remarque assez souvent chez les enfants, en un  
temps qu'ils expriment une force et vigueur  
malgré l'usage du *Unguentum*.

de même, alors on augmentait le nombre de 367  
Canterea, on s'attachait à les faire mourir  
jusqu'à ce qu'ils fussent au point  
du lieu allalade, qui étoit sans doute ce que deux  
n'avoit pu produire, un nombre exact de l'espèce.  
Il seroit inutile de vouloir chercher à  
redonner la direction droite de la colonne  
épinière, parcequ'on ne pourroit que produire  
un mauvais effet, ce qu'on auroit en soufflant  
que ce seroit peine inutile que de faire  
tant que le allalade existe, puis ensuite quand  
le malade est guéri, on ne pourroit trop le  
faire dans le lieu qui étoit malade, sans causer  
quelque chose. Il faut pourtant convenir que  
par les effets de la nature, qui impressionne  
des forces, de la Vigueur, qui certaines souffrances  
sont devenues presque aussi rares. Il en est de même  
à voir être mais cela est rare. Il en est de même  
la allalade ne guérissant point fait de  
un contraire des progrès, alors la carie est  
empêchée des progrès et a donné lieu à un  
des défauts par conséquent, de quels les malades  
sont morts.

Carie du

Le Sacrum de même que le coccyx, se Sacrum et du  
trouvent exposés comme tout les autres os, à la Carie.  
Carie, qui y arrive en même sorte plus souvent, parce  
parcequ'ils sont exposés à être atteints à l'action des causes  
corps extérieures et que les os dans une chute  
faite sur le dos, ou bien par suite d'une  
escarre gangréneuse qui arrive par la situation.



368 *horizontale* que les malades gardent avec l'absence  
fièvre putride. Elle est *grosse* chez les gens  
du sexe par le *scrophule* qu'elle contient à dire  
séquelles fies et à le montre qui sont les plus  
suspens l'avis de *deputa* considérables et de Paris  
par suite de ses *deputa* quand elle ne peut  
rien qui une fois qu'elle est portée à une certaine  
point le *scrophule* se trouve entraîné en devant  
l'action des muscles qui sont si insensibles, c'est  
certainement l'avis de *deputa* dit ailleurs.

C'est le *scrophule* qui n'est superficielle, qui  
se en son *scrophule* pas affecté, s'appliquant la  
peut en faire l'application et s'appliquant  
appliquée de *deputa* plumeaux, quand elle est  
elle est considérable et en peu profonde et  
nécessairement recourir à l'application de l'application  
de son qui la porte avec l'application, lequel  
l'application de *deputa* au plutôt de l'application en  
la *deputa* affectée de Paris. L'application faite  
la *deputa* se faisant, à la fois elle envoie résister  
à la position naturelle par sa solidité, de l'application  
est à remarquer que la nuit envoie résister  
chez les *scrophules*, par des *deputa* qui se  
dans le *scrophule*.

Quand à la *deputa* des *tubercules* de l'application  
au la nuit à résister par suite d'une *deputa* qui  
succède à des *deputa* faites sur elle, la nuit  
qu'elle n'exige point d'autres moyens que  
l'application.

# Des Maladies de quel qu'organe.

en particulier

Chacun y rapportera les affections de q<sup>u</sup>elques systèmes, parmi lesquels il faut que soient entièrement appartenantes à la chirurgie, tous ceux de la peau, auquel nous joignons le système épidermoïque et dermoïque, que nous considérons séparément anatomiquement, du système cellulaire. Nous réunissons ces deux systèmes comme faisant deux systèmes, c'est à dire l'artériel, et le venseux, sorte de peau que nous distinguons, qui est l'organe intermédiaire, de quel nous ne faisons point, auxquels nous faisons succéder le système absorbant.

*Supplément*  
Il y a encore d'autres affections de système, qui appartenant suivant le lieu qu'elles affectent, à la chirurgie, ou à la médecine. Sans savoir quelle elles sont, nous en parlerons en traitant des appareils de fonctions.

## Affection du système artériel. 22<sup>e</sup> février

Il sembleroit peut-être que l'on eût dû en parler tout de suite des affections du système artériel, mais qu'il importe peu par le quel on commence, comme elle se fait insensiblement, il nous paroit plus convenable de commencer par les dernières.

Il nous y comprendra toutes les différentes espèces d'angor, qui ont lieu à l'artère et toutes les dignités, en faisant abstraction partielle de l'artère pulmonaire, en ce que d'une part de



37. Les artères sont y tout extrêmement rare et que de l'air  
elles sont du ressort de la circulation.

Idé que l'on doit se former du système  
artériel, avant que de parler de ses affections.

Ensemble du système artériel, peut être con-  
sidéré comme une suite de canaux appartenant les uns  
aux autres, dans le quel de quel tant haut que  
peut être le système artériel, se termine, représentant par la suite, qui part du  
ventricule gauche ou du cœur, qui se va à la  
de lui et le partant dans toutes les autres.

Le transport au système capillaire, au quel  
finissent les branches artérielles, les quels nous  
suivons au décroissant jusqu'à. Au au dit  
point croire pour cela quand au dit qu'ils  
décroissent, que cela est pris à la rigueur, au  
seul fait entendre seulement que les artères  
d'un calibre sont plus petites que celles d'un  
plus grand effet, jusqu'à ce qu'on les considère, et  
considérable dans un point que dans un autre.

par rapport au diamètre, ou au leur diamètre  
unus différents que pour un même fait.  
On peut considérer l'ensemble du système  
artériel comme représentant un espèce de canal  
la base et au système capillaire et le d'un  
au cœur. Cela ne peut être pris ainsi, que  
parce que le diamètre de toutes les divisions  
artérielles est plus considérable que celui de la

épaisseur des parois artérielles varié par  
rapport à l'âge et l'individu et quand on a  
considéré les uns avec les autres; un effet  
croit qu'une artère part. qui a un diamètre  
considérable, aura des parois plus considérables.



qu'une, <sup>parfois</sup> cependant l'autre à l'autre, fig. les images 89

comparées à l'orte ne donnent une preuve.

Quelque soit le diamètre des artères, toutes ont trois parois, 1<sup>o</sup> il y a l'externe, qui n'est de qu'un seul  
qui n'est qu'un tissu cellulaire très tendue, 2<sup>o</sup> une autre formée de

qui est au dessous, qui forme à l'extérieur les artères.  
L'existence de leur épaisseur, dont la structure  
est inconnue, que les uns ont dit être musculaire,

d'autres tendineuse, 3<sup>o</sup> une intérieure très mince,  
qui est luisante, qui se trouve la plus fine par

une fluide unique; en dans cette dernière  
qui se forme les plaques osseuses qu'on remarque  
89/89 Dans l'épaisseur des parois artérielles, laquelle

tenue se continue dans la tunique du cœur,  
d'un côté gauche toutes jouissent de l'élasticité  
de l'autre de contractilité de même espèce, mais

cela est très peu marqué; les deux intérieures  
se cassent aisément plutôt que de se prêter un  
peu, car cela se remarque la respiration très difficile,

qu'on les lie, on leur qu'on les injecte, on leur  
que l'externe au contraire prête

Les artères recevant le sang du ventricule  
gauche, qui le pousse dans les artères capillaires,  
mesurent point pour cela dans un état de tension

et de plénitude, qui en une autre dit que  
dilatant et se contractant produisant le sang,  
capillarisation au contraire des physiologistes, que

89/89 qui ne point, qu'une  
résulte que d'une espèce de locomotion qu'elle  
éprouvant de part du cœur qui l'entraîne  
dans le mouvement de la pulsation, une nouvelle  
colonne de sang, qui se fait sentir dans



89. Vaines à l'artère, ce qui n'arriverait point si elles étoient  
pas pleines de sang. Au point où se trouve le cœur  
au le sang se trouve quelle dans les artères, à une  
piston de l'étringle, qui pousse le sang dans  
dans cette dernière, dans des tuyaux qui regardent  
de toutes parts. La quantité de sang qui se trouve  
passe dans l'artère n'est point encore bien déterminée.

### Des Anévrysmes.

Malgré que les artères soient composées de  
trois tuniques au parois, que parvenaient elles  
doivent être chaque d'elle exposée à des effets  
différents, cependant jusqu'à présent on a considéré  
leurs affections d'une manière générale.

Le état d'anévrysmes employé dans des  
cas différents pour désigner des affections qui  
des affections qui sont bien différentes. En effet  
il sert à nommer une maladie du cœur dans  
qu'elle il se trouve assés augmentée de volume  
que l'on peut rapporter jusqu'à un certain point  
de la dilatation, au elle augmente intérieurement  
de volume dans le moment de la systole; en fait  
d'inflammation & de rupture tant soit que cela est naturel, tandis  
qu'on le cœur au contraire cela ne l'est point. En fait  
différentes, ensuite pour annoncer une affection des artères  
spécies d'anévrysmes.  
qui par la manière dont elle a lieu est caractérisée  
différentes. Les trois premières d'annonciations différentes  
caractérisent ce qu'on nomme Anévrysmes d'artères  
sans, puis d'artères. Les Anévrysmes sans sont  
encore de trois espèces, il y a la primitive au point  
le causant occasionne au point de la systole le sang  
au l'artère artérielle. Les d'artères sont d'artères



De deux sortes, internes et externes. Elles ont lieu quand les parois internes sont rompus, celles-là quand restent les deux externes fait que les différents artères n'admettent point, qui a été indiqué par l'alleu, que se produisent les communications qu'on nous ont prouvé.

On donne ord. comme pour théorie des anévrysmes, deux significations qui se trouvent que ne sont pas les mêmes, la première, d'abord que l'on dit la dilatation des artères, ou une tumeur formée par le sang artériel, contenue dans les vaisseaux, se voit et s'applique à l'ap. d'autres affections chirurgicales. Il en est de même de ce qu'on appelle fistule des parois artérielles, car que l'on dit de mot à mot, pour désigner une affection du système artériel, puisque ce mot peut s'employer dans quantité de maladies. On peut qu'il y ait du mot anévrysmes comme pour l'ap. d'autres maladies, qui s'appliquent au la médecine et même singulièrement au la de progrès pathologique substatogique. Dans ces derniers temps, de petit ouvrage à un qui s'occupe à faire une différence de quantité de diminution imprimée dans l'artère qui devrait par eux-mêmes faire connaître la genre de maladie.

Voici l'ordre que nous adoptons pour les anévrysmes, sachant bien que Dilatation dans la dilatation des tuniques artérielles, anévrysmes dans les rapports à des dilatations.



Dans la première au second rangée celles qui  
 consistent dans la division des parois artérielles  
 telle qu'il arrive par un instrument tranchant  
 qui donne alors lieu au sang de s'épancher dans  
 le tissu cellulaire, nous avons vu en recouvrant  
 parce que nous en avons parlé en traitant de  
 de chaque système sanguin, que ce sujet  
 répété et que nous avons dit, méthode que les  
 praticiens ont suivie avec une coutume de nécessité.  
 Dans la deuxième se trouvent rangés les cas  
 en faisant attention que les anévrysmes variqueux  
 ou ce que je nomme dilatation veineuse par  
 communication artérielle, sera traité en partie  
 des Varices.

1<sup>er</sup> Genre  
 Dilatation  
 artérielle.

Maladie  
 du système  
 artériel.

- 1<sup>re</sup> Espèce. Dilatation de  
 trois tuniques artérielles  
 ou anévrysmes vrais.
- 2<sup>e</sup> Espèce. Dilatation de la  
 seule tunique interne par  
 suite d'une érosion de la  
 tunique interne.
- 3<sup>e</sup> Espèce. Dilatation de  
 la tunique interne par  
 destruction des deux autres  
 par cause quelconque  
 (Anévrysmes mixtes).
- 4<sup>e</sup> Espèce. Érosion de la  
 tunique interne des parois  
 artérielles; rupture et  
 par suite Hémorragie.
- 5<sup>e</sup> Espèce. Suite d'une  
 érosion imparfaite  
 de la tunique interne  
 ou caillots qui se forment  
 momentanément; ou  
 faux anévrysmes.

2<sup>e</sup> Genre  
 Anévrysmes  
 artériels.

Des anévrysmes par dilatation des parois artérielles.  
Dilatation anévrysmale de la 1<sup>re</sup> espèce, par 375

Ille envenime dans la dilatation des tuns - Selon Du  
tuniques artérielle, qui se rapporte à ce que 2<sup>e</sup> 3<sup>e</sup> écrivait  
les anciens nommaient Derrisime vraie.

Il est bon d'observer que l'on ne doit entendre  
par anévrysme, que la dilatation locale des tuns  
parois des artères, pour distinguer cette affection  
d'une autre, dans laquelle toutes les dérivées  
sont disposées à devenir au plutôt à l'exclusion  
une dilatation générale toutes en même temps  
cas qui a été observé par quelques auteurs en assez  
petit nombre de fois à la suite, ce qui  
lien cependant devant il y a apparence  
aux deux je fus au premier à l'ord tunc tunc  
en ce que l'un des artères, supposées  
tant des membres qu'en tunc, y arrivant  
des tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc  
fist nécessaire d'y appliquer la main pour  
l'écoulement, qui a l'ouverture capsaire  
parce que la personne en moule, je trouvais  
comme je l'ai vu présent tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc  
artères dilatées & qui s'écoulaient d'un tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc tunc

Des anévrysmes peuvent être locaux, ou  
généraux. Ce qui n'est qu'un nombre d'autres art  
qui dépend d'une disposition dans lequel  
le tunc  
ce qui constitue ce qu'on nomme dialthèse  
anévrysmale mais dont on se sert pour expliquer Causes des  
anévrysmes de  
ap. Différences chirurgicales.

Causes qui donnent lieu aux anévrysmes cette espèce



87) En rapportant le degré d'infirmité des vieillards  
y sont moins exposés que les personnes adultes.  
2.° à la constitution, ils sont plus fréquents chez  
l'homme que chez la femme, qui sont tous  
aussi à la constitution, mais au contraire des uns  
quels ils subissent, qui comme l'on sait sont plus  
exposés chez l'homme que la femme. 3.° Antiquité  
quoique nous ayons à remarquer qu'il est des personnes  
qui y sont plus exposées les uns que les autres  
expliquent cela ne peuvent point se faire  
convenir chez un individu. On croit en général  
que les personnes maigres y sont plus disposées  
que les grasses, qui tiennent à ce que la texture  
cellulaire qui se compose de artères, ne les empêche  
pas car quand il y a de la graisse en certaine  
quantité. Aussi l'on remarque bien rarement  
les personnes grasses. 4.° à la constitution de  
l'air et à leur conformation, qui sont des  
moins de certains types réelles.

Jamais les anévrysmes n'apparaissent dans les artères  
supérieures du diamètre des Radiales et Cubitales  
tandis qu'ils sont bien assez fréquemment dans les  
d'une stature plus considérable. Apparaît que  
que l'on a dit auparavant à la Mammaire  
au sein et laisse impuissante par celles de la tête  
qui paraissent des battements de cœur à la  
tension fortement sur la région pectorale. Il est  
aussi que quelques uns sont peut-être également fréquents  
dans toutes les artères, celles des Cavités y sont  
sujettes que les Supra-ombilicales. Il y a également  
la différence dans leur fréquence, même les artères  
supérieures d'ordre les inférieures; Distantes les artères



aucune n'est plus capable que la propre <sup>artérielle</sup> 11  
de suite la radiale et cubitale puis la caroté-  
tiale, humérale axillaire brachiale et la  
fémorale.

On agitenda et c'est à dire que les praticiens  
tiennent pour certain, que les artères sont d'autant plus  
exposées à être affectées d'anévrysmes qu'elles  
présentent une courbure plus ou moins forte.  
A la vérité ce fait est dépendant au premier abord,  
mais cela n'est rien moins que démontré, car  
pour la preuve, c'est qu'elles ne sont point  
altérablement pleines de sang et d'air, tandis  
qu'au contraire, elles sont toujours remplies  
par lui (le sang), ce qui en d'impuise c'est par ce qui en  
seque diminue la physique, qui cause que impossible pour  
toutes les fois un canal et tortueux le sang artérielle des  
d'un fluide qui est pure épaisse de la artère courbe  
résistance et est réduite dans la progression  
mais la même chose n'arrive point dans les  
canaux qui jurent des artères vitales ce  
qui l'expérience démontre très bien. C'est à  
ce fait qu'il faut que l'on s'attache celle de la cause de  
la mort.

On rapporte encore comme cause d'anévrysmes,  
la pression du tissu cellulaire aux extrémités  
des artères. C'est celles qui sont trouvées au tronc  
y sont plus exposées que celles qui sont placées  
sur les os, même celles qui sont formées au point  
d'insertion. On a dit encore que les os se rompent  
et se déforment, dans les endroits où elles passent et  
disparaissent par leur dessèchement, qui s'opère  
au cours du sang. Il paraît maintenant d'ailleurs  
qu'un lien de ces artères elles augmentent de  
diamètre, qui sont celle du Diaphragme, du



378 Muscle grand oblique abdominale du tronc  
adducteur, et du soléaire. Finissons admet  
désormais cette opinion, comment expliquer la  
fréquence de l'asthénie de la papille? ou peu  
profondément que la papille tend à une contraction  
abandonnant qui s'oppose à une irrigation de  
la tunique interne, antérieurement quelle part  
de cause dans les fortes contractions de la papille  
qui peut causer la rupture des parois tertiaires  
puis à une augmentation paulière, ce qui fait  
quelle entraîne l'augmentation d'une manière  
par les parties environnantes.

Le second. Après cela, les causes des Asthénies  
et frénétiques paraissent assez nombreuses, que la plupart  
pathologistes ont décrit avec soin, qui peuvent  
soit être arrivées un peu vaguement, tandis  
est d'autres maladies, parmi les quelles il n'est  
peut occuper d'origine, rien connaît pas.  
Les causes qui paraissent les plus probables  
sont des causes papillaires, les plus probables  
fréquentes qui peuvent donner lieu à ces  
ténues internes se composent. On a d'ailleurs  
l'attraction de la tunique cellulaire et de la gaine  
environnant les artères, fait indiquer par les  
peut être cause d'asthénie? Il paraît qu'en  
de la tunique et l'artère, elles se pénètrent et se  
démontrent les expériences faites sur les animaux  
vivants, faits spécialement Desaut et de l'art  
prélatives. En effet si c'est elle, au moins  
occasion d'un enroulement à la tunique de la papille  
de l'épave, ténue sur les artères, antérieurement  
se trouve l'artère, d'ailleurs, ce qui l'explique  
mellamment d'ailleurs.  
On peut réduire les autres causes d'asthénie



à trois espèces, 1<sup>o</sup> Au ralentissement de la circulation capillaire; 2<sup>o</sup> Au mouvement augmenté du canal du sang, par celle du canal 3<sup>o</sup> Enfin une obstacle quelconque, qui s'oppose à la progression.

1<sup>o</sup> Le ralentissement de la circulation capillaire ne paraît point être cause d'anévrysme, telle que dans celle qui a lieu par la température de l'atmosphère, en ce qu'elle porte sur toute l'arterie.

2<sup>o</sup> À l'égard de la force augmentée de la contraction des fibres cela ne paraît point non plus bien démontré, en effet, l'anévrysme se voit qu'il puisse agir localement sur les parois d'une artère, au moyen de l'impulsion qu'il communique au sang, puisque ce dernier est également poussé par tout, avec la même force. Macgregor a observé que les personnes qui avaient l'usage de l'hercule, étaient plus exposées à être affectées d'anévrysme; Il y a lieu de croire que cela devoit démontrer, que ce n'est pas l'usage de l'hercule à qu'on s'est exposé, mais l'usage bien à la maladie qui en a été l'emploi, laquelle peut avoir précédé une érosion aux artères, qui alors recevant dans cet endroit le sang également avec force, s'élèvent et dilatent les parois qui ne sont point affectées de la maladie, ce qui arrive principalement dans les passions fortes, ou la colère de.

3<sup>o</sup> Pour un obstacle au canal du sang; ceci est bien prouvé par ce que l'on voit d'ailleurs, l'impulsion la même dans l'artère, tel que dans celle qui a lieu à la poitrine, ou dans celle de l'estomac, que l'on trouve au



de sans danger. - Goutte se plaignait les ans  
qui y résistent chez la lignée, par l'action  
de la substance muqueuse et solides qui compriment  
l'artere thoracique. Il y a bien de pressions que celle  
d'un platat d'un terriblement. Au 2ème  
des courbures de l'estomac et ventres par suite  
de compression qui résistent certains vases, tel que  
l'aortique pour les fœtales.

Ces pressions  
une artère  
est affectée  
d'anévrysme

Il y a des temps marqués pour une artère  
qui se dilate, pour produire un anévrysme. Mais  
commence d'abord la dilatation dans tous ses points  
qui une fois qu'elle a pris un certain volume  
continue à le faire, au lieu seulement d'un  
côté, et d'un côté. Il y a que la dilatation s'arrête  
de dilate, qu'en arrière, et non en devant à l'endroit  
de la résistance que les parties de l'artère  
cet endroit, elle augmente pour s'élargir  
en gros, qui tantôt à une forme oblongue  
d'autrefois ronde. Il y a une fois que l'on  
caractère de la maladie. Une fois que l'on  
est prêt à autant qu'elle se dilate, alors  
dans l'intérieur qui sont en quelque sorte fragiles  
se rompent et il ne reste plus que l'extérieur, qui  
n'est point susceptible de se rompre. Ceci  
arriveroit à cet effet, cette époque de la maladie  
en ce que la tumeur fait tout de suite l'effet  
propre, qui arrive au moment où l'on  
y pense le moins, tel que l'g. à la suite d'un  
choc au d'un passion, qui a été envenimé  
à l'endroit affecté, qui par ce qui a été  
augmenté d'une manière subite. La circulation  
qui alors forme une tumeur que la maladie  
des progrès une partie ou un kiste - l'artère



qui a communication avec l'intérieur de la tige 581  
par une petite ouverture. Ce Histi fait.  
plus ou moins de progrès, laissant différents  
circonstances, c'est ainsi que dans l'immobilité  
que gardera la personne qui se porte qu'il  
ne fera point, tandis qu'au contraire si elle se  
donne du mouvement, quelle ait des passions fortes,  
qu'il s'opère de.

La présence de l'histi dans un individu, ce que cause  
déterminer par une pression, qu'il s'agit de  
les parties survenant aux infiltrations de cause  
à la base, à la hauteur, et à la partie des os  
voisins, par compression des vaisseaux lymphatiques.  
dans ces cas. Quant à la cause, il peut être bien  
ce fait que la cause qui les fait déterminer,  
agissent au même temps sur les os. Lorsque  
c'est la tige frotte qui est affectée d'ostéisme,  
alors il y a difficulté de respirer par la pression  
qu'elle exerce sur les parois, au moyen de la  
valve augmentée. Elle n'est pas seule à agir  
que la frotte que par elle-même, car  
autrement elles ne peuvent point, puisque les  
os traversent également et qu'ils font fonctions  
comme d'ordinaire, qui devient à un certain  
volume se rompt, en donnant lieu à la  
tête du long et déterminant la mort dans  
tous les cas, qui arrive au bout d'un temps qui  
ne peut point désigner.

Quant aux adhésions des membranes, elles  
peuvent se terminer de deux manières, elles  
sont susceptibles de se rompre également et  
le plus tôt, au moment où les malades  
sont le moins, par suite d'une légère



388 **Phlogose** - qui se forme aux parois artérielles,  
liée par une compression faite dans le  
lieu alors au sang de s'épancher, qui s'écoule  
dans les têtes collatérales en formant une tumeur  
très considérable. Mais tout est susceptible  
de guérison spontanée fait observer maintenant  
chirurgiens qui ont traité de ces affections et qui  
en citent des exemples. Cette chose n'est rien  
par la dilatation des vaisseaux collatéraux, qui  
trouvent au-dessus du lieu affecté, qui reçoivent  
au sang de passer en aussi grande quantité  
se fait par l'artère, ce qui arrive d'autant  
que la collatérale est plus ancienne, qu'elle  
le cou du sang, comme il avait lieu de  
temps que celle arrive les caillots qui se forment  
dans le fût se dissipent peu à peu, à mesure  
que l'artère diminue d'importance, qui réduit  
à un petit volume forme un petit corps  
d'aspect indurci, en forme de ganglion, qui  
subsiste sur canal.

On remarque que les choses sont devenues  
aussi par la disposition de la tumeur de  
acide de l'artère qu'elle contient, qui se  
disparaît, puis par la pression du fût se  
et la résorption de la circulation.

**Locu du** **28** **francière** **formica** qui par la tumeur continue des artères  
elles peuvent prendre différentes formes, selon  
où qu'elles ont le plus de, qui est dans  
sans la direction de l'artère.

Lorsqu'elles ont pris un certain point  
il n'est guère possible de dire le lieu où



artères ont été piquées au-dessous, ce qui est  
cependant qq. d'intermittent à savoir pour le  
traitement; le effet supposait que ce soit l'artere  
osculaire qui l'est, que la tumeur au-dessous  
ait acquis un certain volume, alors seulement  
le saignement, qq. cela est cependant très essentiel  
pour le traitement, puisqu'il si elle est intermittente  
au-dessus de l'endroit ou prend naissance la  
musculature profonde, il est probable que la  
mort sera le résultat de la ligature, tandis  
que le contraire pourrait être si ce n'est  
au-dessus, en ce que le membre inférieur pourrait  
encore recevoir assez de sang.

De l'artere de la 2e espèce par la  
Dilatation ~~de la tumeur~~ de la tumeur  
celle qui a lieu par suite de la rupture de l'artere par  
des coups techniques internes, ou il y a dilatation <sup>de la tumeur</sup> ~~de la tumeur~~ <sup>de la tumeur</sup>  
de l'artere par suite de rupture, en formant  
une espèce de kiste.  
Quoique cette espèce d'artere n'est pas  
guère rarement, que la rupture se produise  
point, cependant qq. fois il y a rupture  
mais alors forme un kiste, ayant lieu par la  
rupture de l'artere, ~~la tumeur~~ <sup>la tumeur</sup> <sup>la tumeur</sup>  
reste dans le tissu cellulaire, ce qui n'est pas  
puisque il n'y a point de rupture de l'artere.  
matériel, comme le prétendent quelques  
puisque si cela était il y aurait infiltration  
de sang dans ce tissu. ce qui est  
remarque inutilement, qui dans pareille



884 c'est l'absence formelle de ce qui a pu être  
faite constructif. Voilà l'omission d'un  
un des points les plus probables qu'elle a lieu  
de fait remarquer particulièrement à l'égard  
propre, qu'on est venu à l'écrit, la  
que l'on croit être présente par une force  
contention de la parole seule. C'est  
qui en rapportant des exemples de la  
éth. éth. Sabatier et Deschamps, le fait qu'on  
lieu de l'absence, sans possibilité de preuve.  
Le second cas qui dispense d'aucune  
de la deuxième espèce, on a vu qu'un  
même motif externe, peut être une  
qui se développe dans les deux langues  
c'est la découverte: on l'a faite qu'on  
derniers temps, par les progrès de l'anatomie  
pathologique; ce que les anciens n'ont nullement  
qui sans doute en est la cause la plus  
que l'on croit être produit par le  
Vénérien, quand une fois se guérissent  
Vénérienne à l'écrit. C'est sans doute à cela  
doit le grand nombre d'anémisme que l'on  
trouve chez ces personnes, qui sans doute  
peut être produit par la reproduction  
quelques fois par la reproduction  
C'est ce qui fait sans doute dans qu'on  
ce qui est, que la cause que l'on  
à l'écrit, en même temps l'écrit l'écrit  
circonstances, puisque l'on voit un  
que le bien est l'écrit, les neufs de l'écrit



affecté, au point de ne pouvoir tenir l'organe en place 85  
membres, puisque malgré qu'on enfoncé  
l'opération le malade ne laisserait point.  
Quelques praticiens anciens ont déjà dit  
que les affections péricardiques sont  
occasionnées par l'anévrisme.

+ Destruction des  
dents autres, par  
causes quelconques

Qu'éprouve de 3e espèce par la  
dilatation de la tunique artérielle interne, suite d'une  
cause compréhensible dans celle-ci, elle qui est  
bien par la tunique interne, suite de la  
Vérification de l'écoulement de la membrane, agit la  
alors nommée anévrisme interne. C'est  
l'écoulement qui se fait par la tunique artérielle  
interne, elle-même, qui se fait par la tunique artérielle  
de l'écoulement des artères de l'écoulement, en  
disant les tunique artérielle. Elles ne sont point  
donnés par la plupart des pathologistes modernes,  
cependant ces observations sont toutes semblables  
les anévrismes, d'ailleurs on ne saurait la possibilité.  
Après avoir considéré chaque espèce d'anévrisme, figure des  
anévrismes, en examinant leurs figures. Ces anévrismes  
d'abord qui appartiennent à la dilatation des  
tunique artérielle des artères, on les appelle  
anévrisme vrai, sont presque incommensurables  
les premiers moments, lorsqu'ils sont placés  
extérieurement, à plus forte raison formés  
profondément comme ceux qui sont reconnus  
de la tunique artérielle, au lieu qui se trouvent  
situés dans l'intérieur des cavités, on reconnaît  
les anévrismes lorsqu'ils commencent à se faire  
viennent, à une tumeur circonscrite, 99. 100.



l'artere qui dans  
 l'atténue l'ischémie - à celui de l'artere qui  
 change par la couleur de la peau, -  
 le plus saillant, qui devient plus considérable  
 lorsqu'on la comprime au-dessous du lieu de  
 l'artere, que dessus. La mesure qu'elle fait des  
 battements, détermine un autre caractère de la  
 qui tient à l'augmentation de l'abaissement  
 de sang qui se trouve continuellement. -  
 ou l'augmentation de l'ischémie.

méprisage. Malgré tous ces signes, il paraît  
 pourtant en reprenant qu'un simple cœur, qui peut  
 faire de gros battements pour un anévrysme, ou d'un  
 anévrysme pour un gros. Les effets qui  
 du premier ne paraissent point être les mêmes  
 que le contraire - au-delà d'un point de la saignée  
 qui paraît d'arrêter l'ischémie la mort, par  
 lequel, le sang sortant en grande quantité  
 à rien dans le moment de l'ischémie; par  
 ce que en citant des exemples, le plus le  
 recourt et qui a eu lieu il n'y a point de  
 temps, et l'ischémie. D'un anévrysme au  
 que l'on fit à l'hôtel Dieu. Ce qui  
 servit à faire distinguer un anévrysme d'un  
 anévrysme, est le changement de la couleur  
 que le premier semble éprouver, tandis  
 le second en éprouve un comme ne se  
 tout ce que nous avons dit jusqu'à présent  
 ne concerne que les anévrysmes supérieurs.

178. Cependant nous dirons quelque chose de celles  
qui existent dans les ossements du corps, que nous  
pourrions jusqu'à un certain point dispenser  
certaines appartenant à la médecine. West 27 <sup>principales</sup>  
impossible lorsque ces espèces d'artères  
sont développées jusqu'à un certain volume  
qu'elles puissent servir, en se gonflant avec une  
grossesse trop considérable, que les artères  
collatérales qui partent de celles-ci en elles se  
trouvent, risquent de suppléer à leur fonction.  
Il n'est point de même comme l'on voit  
que par les veines, puisque la veine cave  
inférieure peut être altérée comme on  
voit à des exemples, dans que pour cela la  
circulation soit interrompue, à cause des  
comme quelle a avec l'âge et d'autres.  
De toutes celles qui se développent à l'intérieur, plus  
il y en a, et comme qui sont plus fréquentes  
que celles de la Crosse de l'aorte, très rarement  
on en remarque à l'artère aorte pectorale  
et abdominale. On voit qu'elles se développent  
à mesure qu'elles augmentent en volume, elles  
seraient peu à peu les parois des viscères  
qui leur sont contigues, N. celle de la poitrine  
recouvrant les pommelles, puis s'étendant contre  
les parois antérieures, et s'étendant peu à  
peu le sternum, et se fait par la suite  
montrer à l'extérieur, par l'intermédiaire des  
léguments, qui sont absolument les mêmes



389 no de l'os des membres. On ne peut point  
à guai en les reconnaître tant qu'elles ne sont pas posées  
les reconnaît à une certaine grosseur, qui est alors  
le fait par la dilatation ne peut de la point d'au  
par les battements qu'on ressent, qui sont  
isocore au grand, à l'irregularité de l'écoulement  
au palpitation de l'os. D'aut au en  
se rempant une fois qu'elles se font vaines  
à l'écoulement. Parvenue à un volume considérable  
elles peuvent se rempant, dont le sang qui  
coule dans ce cas s'éparpillant dans la  
fistule et même dans les cellules  
voisines, qui dans pareille circonstance  
sont dirigées de la mort.

On reconnaît celle de l'intérieur de l'abdomen  
au moyen du tinctif, qu'appliquant la  
surface parais de l'abdomen, qu'il ne faut  
pas lui laisser impasse par les battements  
de l'artere abdominale et les jugles qu'il  
ce que chacun de eux peut sentir, l'artere  
est point très grand, l'artere est placée  
une position horizontale.

Etaitement

Pour les fois qu'elles sont considérables, on peut dire qu'elles sont  
elles se sent d'abord existant par les  
intérieures, on en peut dire autant par les  
extérieures, toutes les fois qu'elles sont en  
position au la charge ne peut que  
apparten de qu'on en a bien si l'os  
apprenant, l'opérateur est toujours très





390

exteres qui sont considerablement distantes  
 pour le caillot sanguin puissent se réunir  
 en un seul, puis que d'ailleurs leurs <sup>longues</sup> branches  
 dans qqes vaisseaux tant de sangues, & que les  
 caillots sanguins qui existent se dissolvent  
 pour les saigner; on se sera bien que celui-ci en  
 diminuant la quantité momentanément, se répare  
 par les saignées puis qu'il se reforme, & qu'il  
 se résorbe, pour la solution continue, & pour la  
 et intestinale, ce qui fait qu'il n'est point aussi  
 facile de le faire qu'il ne l'est de l'urine  
 Cependant mon sieur Sabatier en rapporte un  
 exemple à la méthode de Valart, qui a vu  
 ce genre de cancer virulent, lequel guérit  
 une anévrysme de l'artere axillaire; mais il faut  
 remarquer qu'elle n'est point et ne doit point  
 qu'on le fait à cela, que l'emplâtre de tereb.  
 astringente dont il fit usage, cela qui a été  
 fait avec d'attention.

Secundo  
 28. première  
 2.° pour les  
 internes.

Les moyens qu'on emploie pour guérir  
 les anévrysmes arteriels sont qu'on applique  
 trois, les astringents, la ligature, et la cure  
 Il y a d. ces trois genres qui continuent point  
 par lesquels ne peuvent être guéris que par la  
 d'un malade, car celles qui ont le sang  
 de maladie, Il y en a également d'autres  
 les quels il s'applique point, qqes places  
 supposément à cause de leur qu'ils ont  
 proche du tronc, les qu'on peut voir qui  
 leur à l'artere axillaire, ou à  
 et crurales qui d'après cela rent en deux



traitement des internes. Les artères qui - 291  
demandent l'amputation du membre, sont  
autres celles qui sont accompagnées d'infestation  
des membres, de l'oreille, mais au cas où les artères se  
trouvent perforées à grande distance (ligamentaire)  
les uns cependant, et il faut en citer quelques exemples,  
où il fut obligé d'opérer, et circonstances qui  
ont été observées à Paris.

Il y a même des pathologistes qui disent pour  
qu'on, qu'il faut même faire l'amputation  
du membre quand on a l'infestation, mais que  
rarement on en obtient des succès, ou qu'elle  
gauchement simple du membre et fait pour  
les malades: mais il faut faire attention que  
sans qu'il y eût eu de succès, sans qu'il y eût eu  
aucun succès obtenu, au très peu, tandis que  
d'autres l'ont vu le même succès, et d'autres  
puisque plusieurs autres en citent des exemples,  
ce qui se voit encore tout à l'heure, d'ailleurs  
en supposant qu'on fit l'opération sans succès,  
il se voit trop si l'on voulait faire l'amputation  
du membre dans le cas où on en a vu un  
de succès la gangrène.

1. Les applications topiques ne réussissent pas. La machine  
quand on se voit on ne peut point mettre en topiques  
usage d'autres moyens, et qu'il faut recourir  
infructueux. Mais pratiquer n'en a fait autant.  
usage qu'on en a fait. Qu'on le qu'on a fait  
pluie et même un peu de succès, qui se  
voient agir que par la vertu qu'ils ont



392 De ressu, erispu les parois artérielles en raison  
beaucoup d'usage, mais aucun praticien n'a  
cette assuiv. ~~est~~ de leurs effets communs. Ils  
sont tous astringents, ~~tels~~ que le vin de raisin,  
l'acide laqueux de tartre, la glace etc.,  
appliqués d'une manière continue, joints  
aux médicaments généraux administrés à temps  
qui leur doivent être longtemps prolongés  
leur employe doit être usé en usage  
un très grand nombre de fois joints à  
tant requi attention le vin de tartre dans  
le vin affecté, desquels on peut espérer  
tous les avantages, en ce que d'une part ils  
sont joints les astringents, au même temps  
ils qu'ils empêchent les productions de sang  
qui fait qu'on doit les employer lorsque  
il y a un excès dans l'insensibilité de la  
sève.

2. De la compression qui agit sur la plus  
méthode qui lui ait, cependant elle peut  
autant employer que la ligature, et requi  
d'après la manière dont on l'applique qu'on  
doit se garder d'en faire usage. Elle se fait de  
deux manières immédiatement, et indirectement  
celle-ci n'est point autant employée que celle  
en ce qu'il faut pour la faire mettre les  
artères à découvert, et dans pareille circonstance  
il faut faire les ligatures, qui sont  
très bien le vin de tartre, puisqu'il



qu'on se p[ro]p[ose] et d'oblitérer l'artère de la 398  
coudre par un cordon fibreux.

Quoique la compression ne soit point  
aussi avantageuse que la ligature, cependant  
on a recouru de bons effets dans les derniers  
temps et sans nous arrêter à l'immédiate  
qui est celle qui est mise la plus en usage, on  
se rappelle plusieurs succès qui regardent obligés de  
mettre des parties à découvert. Il faut donc  
la faire comme il convient que l'artère soit  
suffisamment placée, qu'elle ait un point d'appui  
suffisant, afin que la pression qu'on exerce sur  
elle, ne soit point absorbée par les parties  
molles, et qu'à quand il y en a, lesquelles  
la font tant qu'il y a lieu de craindre la  
gêne par l'état de compression dans lequel  
elles se trouvent, comme d'ailleurs au site des  
membres, la quelle pour être faite exige toujours  
l'emploi d'une machine plus ou moins compliquée.  
Elle doit être continuée long temps, jusqu'à ce qu'on  
produise le bon effet. Lorsqu'elle a été  
faite que de suite par la pratique d'une opération  
d'ailleurs la compression qu'elle exerce n'est pas  
aussi aisée à faire, par la cause de l'indolence  
qui est devenue plus dure.

On peut faire la compression médiate au point de la  
de trois manières différentes, 1<sup>o</sup> sur le lieu même dans lequel  
affecté, 2<sup>o</sup> au dessus, 3<sup>o</sup> au dessous.  
1<sup>o</sup> On peut la faire sur le lieu affecté, 1<sup>o</sup> sur le lieu  
lorsque la tumeur n'est point considérable affecté.



212  
94 J'aurais il sans quelle c'estoit au-dessus lorsqu'elle  
l'attendoit au-dessus de la porte de la  
et par la donnee lieu à l'issue du sang.

1  
Lorsqu'on va à l'espèce de la Campressine de la tête  
29 Primare est elle faite au-dessus du lieu affecté; qui est  
2. Celle faite toujours avantageuse. en elle même, en ce qu'elle  
médus

peut en l'occurrence le lieu, en effet qu'elle distait  
faire le plus près possible de l'attitude, quand  
elle pourroit être faite à une distance de là,  
pourvu qu'elle soit toujours continue, qui est  
le point de vue dans tous les cas autant qu'elle  
en ce qu'elle même point de vue elle-même  
comme au-dessus de la tête, qui sont toujours  
très essentielles pour le passage du sang, et  
que l'homme en ce cas toujours est, et ne  
peut point s'abandonner. Malgre quelle  
soit flambée en dessous. Depuis plus années  
comme on en a vu des avantages dans ces  
derniers temps, il n'est point mauvais que la  
pratique ne soit un peu plus attentive  
ne l'étoient il y a quelques temps. En effet  
elles sont de l'avantage, elle sont  
être l'acte, puisque en l'absence de la tête  
lucis, d'autant plus qu'elle s'élève au lieu  
avancé par la que si l'on croiroit qu'elle  
au point de la tête à l'attitude et le rapport qu'elle  
peut encore y faire, est que la tête même en  
augmentation de volume est dans la signature  
de manière. Sans un sûr de l'attitude par la  
d'être l'attitude dans quelques cas.  
la même les inconvénients quelle

présente avec des avantages, au point qu'elle 306  
disparaissent, ce qui pour les anciens ~~était~~  
fait attention, ce qui le cause même, c'est  
que si l'on vient à examiner la cause qui  
augmente la tumeur lorsque le sang y passe,  
on s'est bien aperçu que ~~l'effet~~  
plus de sang y passe plus qu'elle se fait,  
puis que cela ne paraît tenir qu'à l'effet que  
le sang fait le pousse de lacte, chose qui  
ne peut arriver si elle n'est pas par les artères  
collatérales, mais qu'il sera en trop petite  
quantité.

Lorsqu'en la pratique il en s'agit que

quantité.  
Lorsqu'on la pratique il ne s'agit que  
de saigner son sang, son appétit, son membre,  
afin que la circulation se fasse également  
dans les parties, non comprimes, et ne fait  
la saignée qu'une saignée lente, graduelle et  
continue de suite, car il ne s'agirait pas  
cela que de la faire fortement, ce qui ferait  
tout le suite un caillot sanguinolent les  
collatérales, et interromperait le cours du  
sang, que ne doit être que graduellement  
afin que les collatérales puissent s'adapter  
peu à peu à la saignée, la saignée est bien

peu à peu  
faible ce qui arrive à mesure qu'elle est tirée  
forte et qu'elle s'essie, les battants de  
la machine s'ouvrent d'assez loin l'un  
l'autre avec force, cela se diminue à  
mesure qu'on se rapproche que le diamètre des  
actes se rétrécit qui étant porté à un certain  
point fait par lui-même ainsi que les



395

B. J. F. 1888

3.<sup>e</sup> Feuille  
Du Dessous le lieu affecté  
3.<sup>e</sup> Feuille  
fait au dessous du lieu affecté, qui n'est  
mise en usage que par la répression qui  
fait Baobab le peu et de la ligature  
dans un endroit, qui n'est mis en usage  
qu'un très petit nombre de fois, dans les  
compréhension et dans la signature. Peu est  
fait qu'on s'entretient que l'écriture est  
aussi compréhensible, ne pouvant plus donner  
passage au sang et à l'écriture, car l'écriture  
peut l'écriture orner et l'écriture qui  
ne pourrait point faire la signature.  
Dans les deux circonstances au lieu en  
occasion de les mettre en action, on les  
ce qui se passe, le peu au lieu de l'écriture  
de quelques arguments considérablement et  
fit de petits progrès qu'elle s'écrit et  
dans le lieu par ce moyen s'écrit et  
sang, qui détermine la mort. La signature  
qui se fait par le peu fit tout de  
progrès en si peu de temps, que s'écrit  
que possible circonstance n'arrive alors et  
après l'écriture s'écrit à la manière ordinaire  
c'est à dire une signature au dessus de la signature  
et l'autre au dessous.

Comme par cette circonstance même 397  
que par la rupture de l'artere, peut être  
que si ces deux moyens soutient la ligature  
phidopie ou plutôt lesaie d'intellectuel  
parties elles réussissent, par conséquent les parties  
ayant plus de résistance ne se compriment  
peuvent aussitôt, permettent au caillot de  
se former et l'obliteration aussitôt peut être  
cure, d'autant plus que si on demargine  
qu'un on a évité quelquefois de faire  
de la compression, alors on la distendrait.

3. 2. a. Ligature inartérielle par elle 3. 3. ligature  
même avantage que la compression, qui fut  
mise en usage par Paul Bégine l'apiculaire  
fois, en effet, fait par la suite mettre  
les parties à découvert, qui fut abandonnée  
puis, mise en usage par Guillenot.  
C'est

On peut la faire de trois manières en effet de la  
différentes, au dessus ou en dessous, au dessous, ou en  
dessous, au dessous ou en dessous en même temps.

1. Celle au dessus, comme nous l'avons 1. 4. celle au  
de l'index, a été mise en usage, comme l'avons la  
seule fois, qui ne peut être contournée  
lucide, qui probablement ne sera mise en  
usage si elle est que très peu.

2. La ligature de la tumeur au dessus et au dessous.  
au dessous l'autre, la méthode ordinaire, qui  
le comprime de cinq temps, en effet.





manières différentes, & à quelques distances du  
lieu affecté, après qu'on a fait une incision  
à la poche, & l'on donne issue au sang, qui  
est abondamment maintenu, & qui constitue  
dans ces opérations, puisqu'on veut en mettre en  
usage la méthode ordinaire 2.<sup>o</sup> l'incision  
est faite à une distance égale à celle précédente, ou bien  
un peu plus éloignée, sans interrompre l'écoulement.  
Cette méthode a été mise en usage la première  
par Paul il y a déjà bien longtemps à  
l'artere brachiale, & on en a eu de très bons  
succès, & elle a été cependant recommandée  
par les pathologistes ne s'en est  
point attirée l'attention, & qui cette aussi d'ailleurs  
l'état dans lequel se trouve l'artere, qu'il y a  
eu de la difficulté avec quelle facilité l'on a pu  
en même temps l'arrêter, & pour  
l'artere en Angleterre, dont le premier cas fut  
dans le creux du bras pour l'artere poplitee,  
après avoir enlevé toutes les parties qu'il contenait  
à l'occlusion, & le second également pour la  
même artere, mais au-dessus de la brèche  
opératoire, du tronc de l'artere, qui  
pour cela fut faite ligature, mais d'autant  
les anes étoient plus serrés que les autres, on  
n'eut pas de succès.

Et toutes ces deux opérations réussirent, & qui  
depuis qu'elles furent faites, l'on s'en est servi,



400 un assés grand nombre de fois, surtout de la  
manière dont Robtson l'a faite, aussi en s'en  
prochant d'abord la méthode de Hunter, seulement  
en la modifiant, puisqu'au lieu de faire quatre  
ligatures on n'en fait qu'une maintenant, qui  
devrait plutôt être appelée la méthode de Robtson,  
mais que c'est lui qui en est l'inventeur, & que  
ce n'est pas faite que pour la bronchie, qui en  
est plus maintenant qu'on la fait, & qu'elle  
peut servir pour toutes les autres artères.  
On pourroit si lui montrer de la méthode de  
Hunter et de Robtson, disant le bien en un  
mot.

Celle de Hunter est presque la seule qui est  
mise en usage dans les pays étrangers, tandis  
qu'elle n'a été faite que par Robtson en France par  
M. Robtson, Deschamps et Filleul, & par  
M. Deschamps, tandis que d'autres fois elle  
a pu être faite par d'autres, tantummodo  
est un corps dur, fibreux qui obtient l'artère  
sans la mettre en usage il en a d'autres  
les avantages qu'elle présente donne la possibilité  
de la faire, il n'y a rien à dire à la facilité  
plus facile que celle-ci, puisqu'il ne s'agit  
que de faire une incision de, et de faire la  
ligature, de la manière qu'on le fait d'habitude  
de dire, du bien que pour l'autre il faut  
non seulement différencier les parties de l'artère

Démontre les muscles, les nerfs &c. puis on fera  
même l'angulation du membre tantôt 404  
tant qu'il y a carie & là, qui sont certainement  
les plus faciles, ce qui se peut faire par la  
méthode d'Amel ou de Pott.

Si l'on a eu égard aux parties qu'on  
intéresse dans cette dernière, certainement  
il n'y a point de doute qu'elle soit préférable  
pour le malade car il y a encore des <sup>incisions</sup> ~~postérieures~~ <sup>encombrantes</sup>  
collatérales de l'os. Mais si l'on a égard <sup>à</sup> l'opération  
au rétablissement d'un bon du sang, il n'y a  
point de doute que la méthode ordinaire  
l'emporte; en ce que d'abord on ménage le  
de collatérales capables de donner passage au  
sang, tandis que l'angulation dans l'autre  
étant faite on ne distend plus aucun vaisseau  
il est au bien affermi, alors on interrompt  
par là tout le cours du sang qui pourroit  
y passer ensuite est que le sang dans la  
tranche de l'os se résorbe dans la  
tumeur et y erupit d'une manière qu'on ne  
peut pas par l'afflux du sang au même  
des collatérales, voir elle est de la même manière  
en cet exemple, que parvenant dans  
le premier abord avec l'opération, ce qui est point  
avantageux et abbe que l'on résorbe d'autre  
moyen.

pour pratiquer l'opération de l'angulation de l'os



Après la méthode de Band, il se voit différens suivan  
le lieu ou on veut la pratiquer, puisque g<sup>g</sup> g<sup>g</sup>  
ne se fait le plus ord<sup>e</sup> que sous l'artere d'aperte,  
maniere ou se peut la faire également dans tout aut<sup>e</sup> endroit.  
suivant l'endroit.  
L'endroit.  
L'endroit.  
Il faut en général faire une grande incision  
qu'une petite, parqu'on est plus à l'aise à faire  
ce qu'on fait. On se fait l'incision d'aperte  
après avoir enlevé d'abord par les muscles  
et le nerf, qu'on est obligé g<sup>g</sup> de couper l'artere  
d'aperte ou en fait la ligature, au moyen d'une  
sonde que l'on passe au-dessous, qu'en général  
on peut aussi aller à faire que d'aperte  
ordinaire, au moyen d'un petit trou de l'artere  
avec cette dernière, parqu'elle se trouve g<sup>g</sup> plus  
profondément. On passe ord<sup>e</sup> trois ligatures  
dans tout comme sous l'artere d'aperte et l'artere  
à faire la ligature.

On a remarqué qu'après ce qu'il fallait la  
pratiquer. On a remarqué déjà dit que la tumeur  
était considérable, plus vite et plus difficile,  
parce que dans pareille circonstance les artères  
collatérales se trouvent plus dilatées, ce qui permet  
alors à la circulation de se rétablir plus plus  
facilement. Il ne faut pas cependant attendre  
le moment où la poche a été réouverte par  
la rupture, ce qui serait un accident fâcheux.  
Il suppose qu'on puisse faire l'opération.

l'émulsion, il est en préparation à faire; § 93

Il faut d'abord faire faire au malade, la diète <sup>manière de</sup>  
des simplifiés un grand besoin au moyen <sup>procéder à l'opér.</sup>  
de deux autres liquides, le tranquillisant de l'émulsion  
les résultats de l'opération; l'écoulement et ce q. d. faire  
de la tumeur une compression appropriée  
avant, afin de faire prendre au sang une certaine  
quantité d'artère collatérale, en plus grande quantité;  
afin d'empêcher la dilatation; on peut encore  
appliquer sur la tumeur des ligatures  
astringentes. Tout cela préparé, il faut de  
suite venir à l'opération tant requise en suivant  
parce qu'elle est comme instrument; l'écoulement.  
Les instruments dont on se sert sont en métal.  
quantité, qui sont de q. en distance, une seule  
de femme pour l'écoulement, autant d'autre  
chose qui peut équilibrer; la pression d'artère dans  
le cas où l'on voudrait l'émulsion, des aiguilles,  
des ciseaux, des ligatures, des charpie, des  
compresses; des bandes; on doit aussi avoir  
un tournevis pour arrêter le sang.

Arrivé au moment de l'opération, on  
doit faire place le malade dans une  
position convenable pour opérer laquelle  
diffère en général suivant le lieu affecté  
de la tumeur de la prostate, l'écoulement  
doit être situé sur le côté droit, par le moyen



494 la renvoyer

Supposé qu'on veuille quérir, voici ce qu'on  
fait. Il faut commencer par dire les  
circonstances, ensuite dissimuler les motifs et les  
causes, que l'on doit d'après une situation  
générale de voir, dont ce qu'il y a de dans  
les circonstances tellement opposées, qu'il est impossible  
de le reconnaître dans la même situation ce qui  
arrive tout tout pour la papauté, quel que soit  
dans ces cas une même situation, quel que soit  
à la division des choses lorsqu'un est  
conduit, on les dit en passant que dans  
certaines années, dans certaines de la grande  
on fait qu'on la voit, telle que nous la voyons  
est pour la loi de l'Écriture. Et c'est  
les occasions de l'Écriture de l'Écriture  
à l'Écriture, on le fait, mais on ne  
de deux piers, pour piers d'un piers  
dans son résumé, on ne peut pas trop, mais  
par piers d'un piers d'un piers, circonstances  
dans son être, on ne peut pas trop, mais  
qui est pour cela une décision de deux piers,  
L'Écriture de l'Écriture est une des plus  
compliquées et des plus difficiles à faire, pour  
laquelle on est obligé de passer bien  
de temps pour l'Écriture.  
Le piers d'un piers d'un piers d'un piers  
on ne fait l'Écriture en commençant d'un

en dehors et de bas en haut; à l'autre bout 105  
soit en plus ou moins grande quantité de  
même que les caillots qui s'y trouvent contents.  
On ne doit ~~pas~~ faire l'incision de la  
peau qu'après avoir fait arrêter le  
sang, soit avec le tourniquet qu'on applique  
sur l'artère à un lieu plus ou moins  
éloigné; ce qu'on doit faire avant tout, qu'on  
seul aide dans quelle circonstance fait avec  
les doigts. Le sang étant arrêté au lieu de  
plaie pour l'opération au moyen d'une éponge  
puis l'on procède à la ligature de l'artère,  
que l'on exécute avec des aiguilles unies  
chaque d'un fil, le quel étant double  
fait qu'on est point obligé d'y revenir  
plusieurs fois. On applique ordinairement  
en quatre du côté du sang, dont une  
seulement sert à lier l'artère, tandis que  
les autres servent de ligature. Volantes, qui  
est celle qui est la plus inférieure. Au  
en place également une cinquième au-dessus  
de la division, pour arrêter le sang qui  
viendrait de la portion d'artère opposée  
au sang, celle seulement qui y répond est



l'autre sert de ligature d'attente  
que l'on pourrait s'en passer, puis que  
l'on peut la pratiquer sans en passer les  
fils sont réunis au moyen de ce qu'on  
nomme unet du chirurgien, qui fait un  
différent d'anciennement, puis qu'on s'en  
fait double ou la fait simple. On comprend  
dans la ligature tout ce qui paraît de l'artere  
arrivée, ligée, ou plutôt malade.

On se sert de fils au dessous de l'artere au  
d'aiguilles, les quelles on varie. Dans deux fois,  
il est maintenant on ne s'est plus que de  
celles inventées par Deschamps, l'autre  
de celui-ci.

Second. En faisant la ligature telle qu'on la fait  
3. Chapitre maintenant, il peut arriver que le sang ne  
arrive, parce qu'il peut se faire qu'on n'ait  
puint la ligature, à cause que les artères se  
trouvent qu'il est un peu assés, ou bien même  
que de l'état point par les plumes, puis qu'on  
lorsqu'on les fait, tel qu'on en a vu le mouvement  
usage du. opératoire de l'arrivisme à l'artere supé-  
qui est obligé d'amputer la cuisse pour  
pourvoir à l'artere. Ce sont ces circonstances  
qui ont donné lieu à l'invention d'un  
artere, ce que fit M. Deschamps, l'autre

peut se servir en nombre suffisant d'artères  
dedans, une pour la partie de la tête. 407  
correspondant au côté du cœur, l'autre pour  
celle du côté opposé, qui est un effet de  
l'organisation artérielle, en ce qu'il  
appartient les parties de la tête.

Lorsqu'on coupe les artères il ne faut pas à quoi on dit  
trop serré, parce qu'il pourrait empêcher l'écoulement  
parois, ce qui ferait changer le but que l'on a en liant les  
le propose, de même qu'il ne faut point aux artères  
plus pas assez serré, parce que le sang pourrait  
sortir et s'écouler d'après cela tenir un juste  
milieu. Observations après avoir fait la  
ligature des artères à la suite d'un anévrysme,  
il faut en travers à l'endroit où se trouve  
cette dernière, ce qui paraît difficile au premier  
abord, qui est à être remis en usage dans  
ces derniers temps, par de Guérin,  
se passant avec une rareté par le moyen  
d'un anévrysme survenu à la suite d'un plaie  
artérielle, qui a empêché la suppuration de  
ligatures, en ce qu'on dit, il les artères se  
retractent et par là l'on évite de les  
trouver exposées dans les parties molles.  
Mais il est point prouvé que les artères  
se retractent, ce qui n'est nullement



498 c'est-à-dire avec ce que pense les physiologistes  
modernes. D'ailleurs il est si évident que  
on le faisait et qu'une hémorragie survenant  
il serait très difficile de traquer l'extrémité  
de l'artère, pour en faire la ligature de  
nouveau, par la raison d'être plus haute

peut-être  
Une fois les ligatures des artères faites, on  
place les bouts de fils dans un petit linge  
après les avoir ramené, que l'on place de côté  
de la plaie, afin de les traquer l'autre côté, de  
ce cas on leur serait obligé de faire de nouvelles  
ligatures, au lieu de serrer celles qui sont faites.  
Cela fait on pose la plaie mollement sur  
un linge blanc point comme on le faisait,  
anciennement, ce qui se fait avec la charpie,  
les compresses et les bandes s'étendent au place  
le malade dans son lit, de telle manière  
que l'on puisse voir la plaie en cas de besoin  
à volonté. On a soin d'appliquer de chaque  
côté du membre des anneaux de caoutchouc  
qui se trouvent un peu chauds, afin de  
lui conserver la température, qui convient  
mieux dans pareille circonstance que des  
compresses trempées dans des liquides chauds  
passagiers et refroidissent, aussi est au  
usage de ne plus lui servir  
Cela peut servir ce qui arrive, la

Susceptibilité animale du nombre change  
phénomène physiologique qui s'est vu continuellement  
de rappellé qui se fait au moyen d'un état à l'autre qui  
d'engourdissement dans lequel il tombe, lequel s'engourdissement  
se voit au lieu des autres de la susceptibilité. L'explication  
ordinaire, en donne une particulière, qui n'est  
que la perte de la vie, ce qui est une  
chose bien surprenante.

Il peut faire ensuite qu'une hémorragie se  
manifeste par la rupture d'un vaisseau, un hémorragie  
parce qu'elle n'aura point été bien liée, ce  
qu'on reconnaît au sang qui se fait voir, qui  
n'existerait pas ailleurs, et ne faudrait cependant  
puiser dans la même impulsion par une hémorragie  
sang, produit par la division de vaisseaux  
capillaires. Si réellement elle avait lieu, il  
n'y aurait point d'autre partie à se dire que  
d'expliquer tout de suite le sang, pour  
inspire le besoin du sang, après qu'on  
est la place à découvrir et l'on se le lie  
si elle n'est point été assez au lieu de la rupture  
à être rangée alors au lieu de nouveau  
au moyen des ligatures d'ailleurs qu'il faut  
alors se le rendre car précédemment.  
Il arrive qu'il y a tout fait fait avec la



Après de vain possible, ~~les~~ on est obligé de  
répéter plusieurs fois la même chose, sans  
qu'on puisse cela de l'ignorance de  
la circulation on se

Gangrène. Si au lieu de qu'on jure la circulation ne se  
est allée point, alors le gangrène se manifeste,  
qui s'annonce par l'état de stupor du membre,  
par son engorgement, par la couleur livide  
et la présence de petite phlogose. M. Lavoisier  
indiqueraient que par le défaut de la circulation  
soit capillaire ou générale, par la ligature  
encore des nerfs, malgré ce qu'on dit  
par les praticiens, comme Borrel et autres, les quels  
pour appuyer leur sentiment, citent qu'on a vu  
à la vérité il peut se faire que dans certaines  
circonstances si cela se cause primitivement,  
au moins elle y aide qui s'en tirent  
la ligature. Des petites phlogoses, sans qu'on  
sache à quel point. C'est des cas où il y  
a que paralyse, qui s'agit continue d'insensibilité  
liée, tandis que d'autres fois elle disparaît,  
à laquelle la gangrène survient. Elle paraît  
suivre toujours le sphacèle qui est formé  
dans ce cas, parce qu'il y a toujours ligature  
des fibres au même temps que l'artere, qui





414 qui se méprisent sur la nature  
de l'affection, que l'on ne reconnoît pour  
venant même de l'expiration, que l'on croit  
être un dépôt sanguin, par lequel plusieurs  
incisions furent pratiquées, à l'inst. de Darnes  
sang au fluxus issue, qui sortit à chaque  
puls, mais qui se reproduisoit de nouveau.  
Ce n'est qu'après avoir <sup>été</sup> découvert la  
partie au moyen d'incisions et de dissection  
que M. Boyer reconnoît l'ulcère en  
question, lequel étoit de même nature que  
celui indiqué par Sat, qui sont au nombre  
de deux au trois exemples, qui soit une  
fois le même cas au même temps que  
l'affection en question, ce qui sembleroit qu'il  
se seroit formé au même temps.

En matière d'empyème, pour cet effet  
traitements d'ulcères, sont les mêmes que ceux indiqués,  
c'est à dire de mettre l'abcès à découvert,  
d'ouvrir la poche sanguine etc.

Il étoit formé des Ulcères de la ~~poche~~ <sup>poche</sup> par  
monstrueux. Suite d'une question insupportable  
une plaie artérielle et hémorrhagique du caillot qui  
se voit de même nature que le précédent,  
supprimé par suite de la chute d'un caillot  
sanguin qui s'étoit formé consécutivement à  
une plaie artérielle.  
C'est à l'abcès et à l'ulcère que l'on doit d'avoir

413  
s'éclaircissent sur leur espèce, tous d'étant joints  
cela. Du même accord, l'effet s'effectue. <sup>oppression de</sup>  
voies qu'ils parviennent à la bien arrivée, <sup>et s'élèvent</sup>  
mais qui tombe dans une contrainte à celui  
de Schubert qui est maintenant celui d'après  
de faire les pathologistes, qui dans le moment  
au fillet d'un des explications il en a  
sujet, tous au contraire étaient pour lui, le  
quel disait que l'effort de la suite d'une  
plaie artérielle, qu'elle parviendrait qu'elle par  
la formation d'un caillot de sang. Dans le lieu <sup>Cause</sup>  
affecté, déterminé par la compression qu'on  
y ferait et qui devrait soutenir une tumeur  
suffisante pour qu'il se forme et contracte  
des adhérences; Ce qui fut adapté si possible,  
ce fut dans cet intervalle il trouva dans une  
pièce anatomique, une artère qui avait  
été divisée d'un bout, qui était la  
crurale, à la quelle se voyait un caillot  
de sang qui maintenait le lieu divisé.  
Schubert tout en adaptant qu'un anévrysme  
de cette espèce parviendrait à former par suite  
d'une plaie artérielle, au moyen du sang qui  
passerait par le lieu divisé, par lequel  
caillot de sang que l'on supposait par la  
compression, ne parviendrait le sang à presser  
d'un anévrysme dans le lieu, une que une  
fois que l'un ne sera plus exercé, l'autre



118  
L'homme court un temps plus au moins long  
venant à un plus contracté au sein auant  
d'adhérence qu'il en avait avec les capillaires, et  
le sang passera par le point divisé, et qu'il  
dans des efforts plus ou moins longtemps  
continues, et s'ouvrira dans le tissu cellulaire  
voisin, en produisant ce qu'on nomme Anévrysme  
sans contusion.

Il n'y a que les artères un peu considérables  
qui se forment parce que les petites venant  
à être divisées après la seule compression  
les artères suffoient par un obstacle leur canal se  
les affaissant et faisant contracter des adhérences  
entre leur parois.

à l'isthme  
forment le  
plus  
Nul part elle n'est aussi fréquente qu'à  
l'isthme de l'artère Brachiale, parce qu'elle est la seule  
et la seule à pouvoir être atteinte par les  
laissées au moment des saignées, que c'est elle  
elle en est préférablement faite la compression  
parce que d'un part on l'aite toujours de  
pouvoir y remédier par elle, puis que l'on  
à être divisée par la faute d'un malade  
à drosser du chirurgien celui de garder  
bien de dire qu'il l'a divisée, qui l'a contractée  
l'employait tout de suite qui par la rapidité  
craindre que le malade ne presump qu'une  
chose ne lui dire qu'il s'en garde bien de  
bras dans le creux, de faire aucun mouvement  
craindre qu'il a l'air de craindre un



un eczéma par lequel à desu la lésion, 1193  
qui en fait l'autre circonstance au la motture  
à dénouer et l'acupuncture la lésion; qui  
au contraire lui recommandait de ne pas faire  
de mouvement, il paraît de faire qu'il n'est  
d'écarter qu'au bout de plusieurs années. Alors  
le malade étant prêt à se lever, se lever  
tout ses traitements, la lésion que la pratique  
est très différente. Le celle ordinaire,  
ce qui détermine au bout de peu de temps et  
même quelques jours la lésion de l'acupuncture.  
A l'éczéma sans complication, se font  
reconnaître par les mêmes signes que les lésions  
par les quels on ne peut en faire la distinction  
que par les signes qui ont précédé, 1194. pour  
celui du bras, on apprendra que la lésion  
à été lésion il y a quelques temps, 1195. pour  
temps après il est lésion une lésion considérable  
dans le lieu piqué de. pour la lésion, que la  
malade soit piqué au la tête par un instrument  
et que par un clou, une aigle. C'est  
par là seulement qu'on peut en lésion faire  
la distinction.

A l'éczéma reconnu, les moyens à employer  
sont les mêmes que ceux indiqués précédemment.  
Surtout comme l'éczéma est affecté de  
par les artères, on peut appliquer très près  
la ligature du point d'éczéma, afin de pouvoir



416 <sup>Beaucoup de</sup> <sup>7 clirore</sup> <sup>les plus de collatérales possibles.</sup>  
De l'artere Querrisima suivant les  
parties ou elles s'enveloppent.

1. De l'artere Querrisima pour servir à l'artere  
Carotide sacculée primitive, qui a bien dans cette  
partie du tube artériel toujours par l'artere  
ce qui constitue celui qu'on appelle artere  
de la respiration. On peut faire l'opération  
sur cette artere, malgré qu'on n'ait aucun sang  
en ce qui n'y en ait aucune qui soit plus  
favorablement placée, par exemple pour la rendre  
tout d. suite à l'écoulement en incisant les ligaments  
Il peut être pratiquée celle que l'on dit de l'artere  
qu'elle ne donne aucune branche artérielle dans  
cet endroit, ainsi on peut faire celle de la  
méthode ordinaire, à l'abri d'une ligature  
une au dessus, l'autre au dessous dans l'intérieur  
de la tumeur, ce qui est d'autant plus facile  
à faire qu'il n'y a point de collatérales capables  
de rétablir le cours du sang.

On ne peut trop s'étonner pour quoi tant  
les pathologistes aient été jusqu'à se méprendre  
sur la pratique, tandis qu'ils l'ont faite avec tant de  
parties où il ne se peut douter d'artere  
pour ainsi dire que celle dont on fait la  
ligature, qu'on a tant bien de présumé sur  
d'autres points pour la constitution, de l'artere



les membres, tandis qu'on a point les mêmes  
membres à proximité pour la tête, 479  
puisqu'on d'autre artères y vont, qui sont  
la Carotide du côté opposé, puis les deux  
Vertébrales. On est d'autant plus fondé à  
tenir qu'il est prouvé sur les animaux  
vivants qu'on peut faire la ligature des deux  
carotides, sans que la mort en soit le résultat.  
On prétend que c'est l'Ordre vicat de la  
théorie sur l'homme.

De la Sangle de la

2.° La Sangle de la tête, tant qu'elle n'est point sortie  
de la puitre, elle est inaccessible aux moyens  
chirurgicaux; Une fois qu'elle l'est après avoir  
traversé les os, on ne peut pas trop dire  
qu'on puisse y pratiquer l'opération, en ce qu'il  
seroit très difficile de faire la ligature, de  
lente est qu'on suppose qu'on puisse la  
faire il y a tant lieu de penser qu'elle  
ne résisteroit point, en ce qu'il n'y a pas d'artere  
capable de porter le sang au bras; Il y a bien  
les Scapulaires, mais il n'est pas facile de les  
faire. On ne peut point non plus faire l'opération de l'Arrière  
de l'Arrière par la Sangle axillaire, en ce qu'on  
la fait sur ou la également à rendre la Sangle  
de l'Arrière, en ce qu'il n'y a pas plus  
collatérales qui puissent porter le sang que



418 pour la précédente, - cette opération la pratiquée  
une fois, a été incisée le grand pectoral en  
le divisant en deux parties, ce qui permit de  
découvrir l'artère sans plus de difficulté pour  
en faire la ligature, que l'on fit au-dessus  
d'un anneau affecté, qui ne fut point suivie de  
succès, l'ouverture s'ouvrit de nouveau qu'il  
y avait un des nerfs de compris dans la  
ligature, appartenant au plexus brachial, qui  
ne peut guère éviter. Cette opération fut déjà  
proposée récemment par des auteurs d'ailleurs,  
sans savoir si elle réussit, au lieu d'être  
dans la ligature tantôt des nerfs et d'autre fois  
point.

Le sort la suite une fois à la manière  
ordinaire qui ne fut point suivie de succès,  
en ce que le malade mourut entre les mains  
d'illuminés. Ce sont d'après toutes ces  
considérations, que les praticiens actuels disent  
qu'ils n'y a point de remède pour ces sortes  
d'aneurismes, lesquels exigent faire l'amputation  
du bras dans l'artère d'où elle a lieu, pour  
guérir le malade, ce qui a été vu une fois  
en pratique.

De l'humérale. Parcourt les artères vraies au lieu  
à l'artère humérale, qui sans ce rapport  
présente une chose insérée à l'artère axillaire,  
qui est très exposée à être affectée de cancer



qu'on sans cause suffis. On peut tantôt lorsqu'il y a  
aut lieu la compression et la ligature, qui  
venant à oblitérer l'artere, n'empêchera la  
course du sang, qui pourra se faire par les  
arteres collatérales, qui sont les courantes.

Les arteres Radiales et Cubitales sont très de la Radiale  
peu exposées à être affectées d'anévrysmes, par Cubitales  
cause de leur situation plutôt de l'axe, qui  
quand elles viennent à avoir lieu de développer  
est d'une manière spontanée. En cela se  
existent en même temps à tant de l'axe,  
qui quand elles ont lieu ne présentent rien  
de particulier. On peut facilement en guérir  
en ce que s'il n'y en a qu'une, la circulation  
ne se trouve point interrompue dans le  
membre, et faisant la ligature de.

Les Anévrysmes des Arteres iliaques sont de l'iliaque  
communs l'apertures déjà dit, du ressort de l'iliaque  
elles apportant à la circulation sans la  
légitime nous avons dit que c'est au secours  
de l'opérer une fois.

La Crurale peut être affectée d'anévrysmes de la Crurale  
dans une très grande étendue. Depuis l'origine  
crurale jusqu'à son passage au travers de  
celle du troisième apophyse. Allant au dessus  
de celle là elle est incurable, en ce qu'elle  
peut y rien faire, s'ils n'allaient que jusqu'à  
ou phasait y avoir une compression,



1210 partant ailleurs au point y pratiquer la ligature  
De la poplite. Il n'est aucune histoire qui soit plus exposée  
à l'asthénie. D'ailleurs on ne la pratique que sur une  
l'œuvre dit, et presque jamais de faire, parcequ'elle  
n'est point par la position qu'elle a  
être attachée par les corps extérieurs tels que  
les instruments tranchants. C'est l'œuvre  
qu'on a faite les méthodes de l'asthénie et de  
Desaut, qui quand on les pratique au point  
les faire la plus basse possible pour enlever  
les artères collatérales, qui sont les artères  
de la cuisse. Sans faire l'opération de l'asthénie à la  
manière de Desaut, au dessus de l'ouverture  
aproné pratiquer de l'asthénie ad ductura pour  
l'artere poplitee il faut qu'elle soit faite la  
plus basse possible de l'asthénie. Elle se  
pratique de la manière suivante. Après avoir  
appliqué le tourniquet au dessus de l'artere  
crurale le chirurgien se place de côté et  
examine le lieu où il doit pratiquer son  
opération, qu'on se convainc qu'il est possible  
un battant de l'artere, comme il finit les  
ténuement avec la bistouri, dans l'ouverture  
dans l'ouverture approchant, cela fait il divise  
le tissu cellulaire qui se trouve au dessus,  
ce qui est le nerf poplitee à découvrir  
le muscle Sartorius, lequel grand psoas  
de diviser la première de l'asthénie dans le  
second si l'artere est en l'asthénie, si elle

était précédemment observé, ou est qd est obligé, 42  
de le diviser en traverses. On voit en effet que  
les artères à des battements, en la même  
un peu si l'on veut, et l'on en fait l'application  
qui est plus facile à traverser que le système qui  
est le caduc, à cause de sa pulsation.

## Affections du système veineux.

Les affections de ce système, consistent dans  
la dilatation des veines qui forme l'affection  
qu'on nomme varice, que l'on distingue en deux  
espèces, 1<sup>re</sup> et tumeur variqueuse et en Varices  
proprement dites. aneurismatique

1<sup>re</sup> Les tumeurs variqueuses aneurismatiques  
ont point jamais été curées, elles ne le sont  
pas que depuis le commencement du siècle  
dernier qui furent décrites par les premières  
par Guillaume Hunter puis décrites par  
Jean Hunter qui furent traitées par  
Anglais, jusqu'à ce qu'un certain  
médecin parut en France, qui depuis a  
été pour un très grand nombre de personnes  
Veine basiliq. avec tumeur brachiale qui  
est le cas d'ailleurs que l'on peut le plus  
facilement guérir en même temps  
l'on spécialement dans les saignées de bras.  
Elles ont point été plus abondantes.  
Jean Hunter prétendait que cela ne pouvait  
se faire par la division de l'artère en même temps  
Comment q.  
de forme



444 que celle de la veine dans l'instant que l'on  
pousse, ce qui alors ~~est~~ <sup>est</sup> une communication  
entre ces deux vaisseaux, qu'une se sépare d'un  
point, le sang artériel passe dans la veine et  
constitue alors la maladie, pendant que la  
dissipation de la parois catéctique de la veine se fait  
et l'on voit qu'il est réfuté cette opinion  
en prétendant que si la chose existait aussi le  
sang suffirait dans le tissu cellulaire et  
fermerait une anévrysme sans causer de mal,  
disant que cela peut arriver sans aucun état  
extraordinaire. <sup>Il y a</sup> qu'il peut résister qu'à l'action  
et la veine n'est tellement redoublée à l'écarter  
qu'une ouverture de communication existe, ou  
admet qu'il en soit bien mieux cette opinion  
que la première. On pourrait encore dire à quel  
d'une autre manière, c'est que l'hy. l'écarter  
ayant été au point de l'écarter de la veine  
mais le sang ayant formé un caillot dans  
l'ouverture, celui-ci bouchant celui-ci ne peut  
plus y passer. Mais l'hy. par une cause quelconque  
venant à s'écarter dans la cavité de la veine  
l'écarter. Alors le sang qui dans la veine et  
déterminera la maladie appelée anévrysme  
sans que communication s'en suive, tandis que  
le sang s'écarter n'est pas dans le système artériel  
parce que la première anévrysme au second, un  
anévrysme au quel il ne peut résister, qui  
lui est communiqué au moyen du canal. <sup>Il y a</sup>  
l'état au de traverser l'écarter la détermination  
la veine, jamais on n'y remarque les signes que  
présente les anévrysmes, la quelle peut <sup>être</sup> <sup>propre</sup>

signes



en reprenant son ancien état.  
On reconnoît cette maladie à une dilatation  
siemens qui est très considérable, existante depuis  
au plexus du bras et à l'avant bras, survenue à  
cette distance plus ou moins éloignée de l'épave  
au lieu où pratiquée une ligature, si on  
indroit, ayant une condensation, l'insensibilité  
la lèvre de la main ne change point la  
cavité de la peau, faisant sentir un petit  
bruit lorsqu'on l'inspire un mouvement  
dondulation. Arguant que lorsque le bras est  
abaissé et qu'il reste dans l'immobilité, disant  
l'écoulement lorsqu'il est élevé, qui est le signe  
le plus certain que le malade fait qu'il ne souffre  
qui disparaît même entièrement, lorsqu'on fait  
une compression dessus, au-dessous de l'endroit  
de la communication des deux vaisseaux, qu'il  
donne lieu à la chose inverse lorsqu'elle est  
faite au-dessus. Si dans pareille circonstance  
la rupture de la veine venait à avoir lieu,  
sans s'élever dans le tissu cellulaire  
il en résulterait une infiltration sanguine.  
Cette maladie n'est point très fréquente, les  
malades la supportent sans grande incommodité,  
et qu'elle fasse peu de progrès.  
On ne peut guérir que par l'ablation  
de la communication de communication, ce qu'on  
peut peut-être avoir lieu alors, ce qui est dans  
tous ces cas obligé de faire la même opération  
que pour les anévrysmes vrais. Mais c'est là  
l'opération qui fait peu de progrès, que







avec, ainsi ne vient au jamais au sang  
Du sang dans les artères des membres. 415  
supérieurs.

Si la circulation séminal ne se fait pas  
aussi bien que l'artérielle, la nature semble  
l'avoir favorisée d'une autre manière, en effet  
il existe dans l'intérieur des veines, de petits  
replats en manière de sautoir, qui s'opposent  
à ce que le sang rétrograde, en action musculaire  
la favorise aussi l'op, comme nous en avons un  
exemple, par ce que nous voyons dans les  
saignes du bras, qui par la contraction des  
muscles, le sang s'écoule avec l'op plus de  
facilité, voyant ainsi que ce n'est en telle  
longueur d'ait qu'il ne soit pas bien. C'est la  
preuve encore, c'est que jamais on ne voit  
arriver les varices, que dans celles (les veines)  
qui se trouvent au-dessus des aponeuroses des  
membres, par conséquent dans les ligaments,

les varices sont encore différentes d.  
autres, en ce que jamais elles n'arrivent  
particulièrement, avec ces dernières le font à  
moins qu'il n'y ait une disposition aërienne,  
lesquelles au contraire sont toujours multiples.  
Elles ne se sentent jamais bien que dans les  
caractéristiques féminines, ou au moins aux  
membres inférieurs et au cordon spermatique.  
On en voit point ou plus qu'il y ait  
quelque des parties féminines, ou dans les  
autres, ainsi les veines peuvent elles,  
représentant ce sens au sein, au bras d'un  
côté par un écoulement, tandis que les artères



12  
Le législateur punit, mais que l'usage d'y a  
rapture de plusieurs langues.

Cause. Elles ont lieu de deux manières, 1<sup>re</sup> spontanément  
chez les personnes déjà avancées en âge. Elle  
le manifestant de l'accommodation qui se fait chez  
elles; puis chez celles qui sont plethoriques d'après  
replétion. 2<sup>de</sup> chez celles qui ne se rendent  
pas compte de l'indisposition des personnes de cette  
de l'âge, puis celles qui approchent de l'âge de l'âge  
en ce que la chaleur d'une lèvre à une lèvre  
du sang, l'altération qui leur donne que l'homme  
au changement de température, cela se  
doit sentir de l'âge pour les parties intérieures,  
car la peau est en expansion, car il est facile  
de se reconnaître.

Au lieu d'habituer ce corps dans les trois  
stades, ce qui a lieu pour que dans la vie  
cette infirmité dans l'état de l'âge, pour la  
personne qui souffrant de cette infirmité, elle  
a pu avoir lieu à l'amblyopie, de manière  
à former une tache blanche, qu'il aurait pu  
paraître, la forme et le volume qu'elle formerait  
imprimer par une hernie. Elle n'est  
point été accompagnée (de tache) de l'infirmité  
l'acquisition à la circonférence, qui disparaît  
au moyen de la pression.

Entretien Les dilatations veineuses sont très fréquentes  
attendant la simplicité qu'est le corps humain  
ce qui leur donne une grande extension.  
On des exemples d'oblitération de la veine  
cette infirmité, elle s'abaisse. La 1<sup>re</sup> en  
cette infirmité, un exemple, dans la cas le  
sang circule dans les anastomoses qu'elle  
a pour la partie supérieure, laquelle



La Dilatation du puer. <sup>par la pression</sup> ~~suppression~~  
ce qui fait que la circulation s'arrête  
très promptement interrompue. Cela n'arrive que  
par une cause mécanique, qui l'empêche  
et suppose à ce que le sang aille au cœur.  
Il faut guérir les ailes ismies, il faut  
arrêter les causes qui le produisent. Traitement  
Hg. Dans celles qui sont causées chez une femme  
par la grossesse, il faut employer <sup>un traitement</sup>  
une pression bien exercée sur les seins, non  
presque aussitôt l'accouchement ayant eu lieu  
elles disparaissent. Ce n'est que chez des  
personnes qui font peu de mouvements, qui  
sont sténosées, au lieu de recommencer de  
l'exercice de faire quelques légers travaux qui  
puissent leur donner du mouvement, ou leur  
exercer une compression au moyen d'un  
bandage sur tout le membre, ou se servant  
pour cela du ruban ou guêtre à enrouler  
au vif la ferme, d'après même au sang  
au moyen d'une pression mobile, après quoi  
on exerce une compression sur tout le membre,  
ne faisant point pour cela comme les anciens  
le faisoient une ligature indurée et au-dessus  
de la ferme et maintenant toute issue au  
sang. Il y en a qui ont fait même usage  
du caustère actuel, après avoir mis l'écharpe  
laxine, mais ce moyen est abandonné.  
Affections du Système Absorbant. <sup>Second</sup> 12 Névroses.  
Les Maladies de ce système se distinguent  
en celles des vaisseaux lymphatiques, puis en  
en celles des glandes du même ordre, qu'on



H. B. *monumet auumumet glanda conglobata*  
Des Vaisseaux 1<sup>o</sup> Les Maladies des Vaisseaux lymphatiques  
ne sont point encore bien connues, qui si on  
parvient à les connaître, il est à présumer  
qu'on verra qu'il ont le Danalogie avec les  
Vésicales, c'est à dire qu'elles sont causées par  
la stagnation de la Lymphe dans eux.

Des Glandes 2<sup>o</sup> Celles des Glandes consistent dans leur  
engorgement, dont on ne connaît point  
l'effet quelle est la cause. On ne sait pas  
si elles sont sympathiquement, ou lymphati-  
quement, une cause isolée, partie de celles qui  
est dans la nature phlogistique. On peut supposer  
celles-ci V.g. dans la piquée d'une partie  
par le moyen d'un instrument qui sera imprimé  
dans l'épiderme, tel que cela se voit dans les pustules  
chez les personnes qui se piquent avec des  
qui est prit par de temps après d'un engorgement  
dans les cellules. Dans ce cas il n'est point rare  
voir une ligne saillante à la partie intérieure  
du bras, produit par un vaisseau absorbant  
qui est douloureux, accompagné d'une légère  
phlogose.

Il n'est point rare de voir des glandes  
sympathiques dures, squilleuses, quelquefois  
piérescentes, qui ne le sont d'ailleurs que par  
l'âge, dont on ne connaît que la cause  
l'absorption cadavérique, ou l'expulsion de la  
partie les fonctions dans l'exercice  
meur, qui est plus affectée que celle  
de l'absorption.

Les engorgements sont un peu rares, les  
causes en sont lentes, les effets sont lents.



celles qui se fermentent par le  
suppuration les 2<sup>es</sup> au contraire sont malades  
dans les sujets scrophuleux ou ils restent  
long temps stationnaires. Mais dans celles qui  
se fermentent dans l'effusion purulente,  
comme on le remarque assez souvent à  
l'aiselle, dans le Cancer du sein.

Il se passent dépendant de différents causes. Causes  
essentielle dans certains cas, 1<sup>re</sup> Sympat.  
dans d'autres, 3<sup>o</sup> Cause par l'application  
d'un fluide dilatoire. 4<sup>o</sup> enfin par  
une cause générale avec la fièvre.

1<sup>re</sup> Cause. Il n'est point affectée spontanément, essentielle  
comme dans les temps chauds, chez les  
personnes qui suent trop, dont la sueur est  
acide et piquante, et qui le voit dans certains  
personnes aux Aisselles. C.

2<sup>o</sup> Quelquefois il se voit bien sympathiquement, sympathique  
et qui par la pique d'une partie par un  
instrument imprime d'un fluide dilatoire, suffit  
pour le produire. Il est des sujets, chez qui  
l'application d'un caustique, d'un irritant,  
d'un agent qui agit dans ce cas d'une  
manière siégeique.

3<sup>o</sup> Par une cause dilatoire. 4<sup>o</sup> autres sont par causes  
1<sup>re</sup> l'usage des Miacres putrides, en faisant  
usage de viande crüe morte de charbon,  
ou bien chez les quels l'usage de corrompu,  
très-puissant. Cela se voit encore sur les  
ilôts qui dirigés dans les amphithéâtres  
même à la viande corrompue qu'ils  
se font avec une esquisse adoucie, d'aut au



439 ne peut trop déterminer la manière d'ag-  
graver les dispositions qui se trouvent à la simple  
application de la pierre infernale sur le  
lieu piqué. La simple application d'un  
fluide virulent appliqué sur une partie  
où se trouvent des membranes conjuguées, peut les  
déterminer. 440 Enfin ils peuvent dépendre d'une  
disposition intérieure, qui quand ils arrivent en pareille  
circonstance produisent le plus souvent des  
gangrènes, ou pour le moins des tout faits  
de gangrènes.

Quelque soit la manière dont nous con-  
cevons ces engorgements, dans la plupart tant que  
les vaisseaux déterminent par résolution, les autres  
par suppuration assez promptement. D'autres enfin  
de cette dernière manière le font à une distance  
assez éloignée, tel qu'on le remarque dans les  
glandes salivaires.

Signes

De quelque manière dont se forment les  
engorgements des glandes lymphatiques, ils  
manifestent plus ou moins promptement, qu'en  
certains cas, ce soit en effet de sorte qu'un  
corps avec la peau qui tantôt est à l'écaille  
de l'ulcère superficiel, tandis que d'autres fois  
on ne saurait point trop les exprimer d'un  
intérieur, qui ont lieu d'une manière  
bien opposée.

L'adhésion de la tumeur cellulaire au  
peau, paraît dépendre de la turgescence de  
tissu. Il paraît que quand l'hyperémie  
se fait promptement dans les vaisseaux lymphatiques  
ils se déterminent assez promptement par résolution  
tandis qu'au contraire lorsqu'elle a été



La Suppuration en est la suite. En Suppuration #37  
quels soient suivis de Suppuration, la suppuration  
ne fait rien plus au mieux qu'il faut qui  
on ne fait point l'incision, se fait  
elle même.

Pour traiter est sorte. De d'après, il faut traiter.  
une douleur avait égale aux causes qui  
les ont produit, mais encore à l'affection  
locale. Lorsqu'on peut reconnaître la cause  
ou l'acte de la suppuration, en même temps  
qu'on applique des moyens topiques sur la  
tumeur. Fig. Dans ceux qui sont déterminés  
par le virus vénérien, il faut non seulement  
administrer un traitement anti-vénérien à  
l'intérieur, mais encore suigner la tumeur  
par ce qui lui convient. Dans ceux produits  
par la piquée d'un scapule, on voit d'après  
d'une piquée dont vient de d'après, on voit  
qui est mort de mauvaise maladie, il  
faut tout de suite cautériser l'endroit piqué,  
parce que si on ne le fait point, on se gêne  
impie point engorgement des glandes  
mollasse, s'il est piqué aux doigts, le piquet  
doit qui se formera dans le piquet  
attrapé, instrument, d'après très longtemps  
sans guérir.

D'après ce que nous avons dit de l'incision  
de d'après, il faut fil. le furment qu'il faut  
que la suppuration se fasse lentement. Les d'après  
avec les instruments tranchants, l'usage  
le contraire dont avoir une s'il se fait  
parvenir lentement, est à dire à faire avec



432 La pierre acide

Lorsque les engorgements des glandes lymphatiques, dépendent d'une disposition à l'écéphaluse, il faut employer ce qui cause une parité circonstance, et faire abstraction que le traitement intérieur est du ressort de la médecine, tandis que tout ce qui consiste dans l'application des remèdes topiques, est du ressort de la chirurgie. Ils dépendent d'une affection sympathique, telle dans le cas de cancer du méat, peut chercher à le guérir; On le voit, M. dans qq cas, lorsqu'un ligament au sein, temps qu'on entre la maladie occasionnelle, et que pour le cancer du sein.

Leçon du  
15 octobre

Affection du système nerveux

On a beaucoup trop exagéré les maladies, à quoi certains ont peut-être fait attention, à la rigueur on est affecté que d'un très petit nombre les qu'elle bristantes, ont été le signe d'écéphaluse.

On rapporte les maladies qui affectent le système nerveux à deux sortes de névralgies, 1.° dans les ganglions; 2.° dans ce qui constitue leur état pathologique, à ce qu'on appelle convulsions, nausées, en parlant d'une autre manière.

De la  
Névralgie

1.° La Névralgie d'innervation implique par elle-même l'existence d'une affection des nerfs, d'après laquelle des douleurs se font sentir, soit qu'il y ait une autre affection du système général ou qu'il y ait une



de préférence, puisque chaque an a ses lois  
et ses usages. C'est pourquoi les nerfs de cette  
affection, changent dans leur structure, de manière  
à présenter une organisation différente. Je me  
appelle avoir traité il y a deux ans, un élève  
en Médecine qui avait le nerf cubital blessé  
de manière à rendre tous les doigts lorsqu'il  
appuyait dessus, pour le quel j'employai des  
vésicatoires, tels que les Moxas qui vésicèrent sans  
guérir, qui peut être est dégénéré en névralgie  
Les nerfs qui sont les plus exposés sont les  
nerf frontal, Maxillaire Supérieur et Inférieur. Les nerfs qui  
peuvent se trouver en sautoire que les nerfs - y sont les plus  
rapports par les nerfs Chaudes par le premier exposés.  
Le Cubital est le plus exposé par le bras, puis le  
sciatique le plus exposé et le Sciatique. Quant à  
du nerf sciatique, on doit savoir longtemps  
et malade toutes sortes de différents. En effet,  
une longtemps souffrance la névralgie sciatique,  
la douleur Rhumatismale et l'élévation  
spontanée des nerfs. Il y a guère parmi les  
affections de ces nerfs que celle faciale qui  
est du ressort de la Chirurgie. Parmi toutes les  
autres elle est de la Médecine. Je ne sçais  
Aucun ouvrage qui traite mieux de l'affection  
de ces nerfs que celui fait par M. Chaudes le  
quel est rassemblée plusieurs maladies sous  
un même cadre, auxquelles on a fait  
sauf, jusque là. Il n'est pas encore bien  
la névralgie. Cependant on croit  
comme dans la névralgie  
qu'elle consiste dans la compression  
certains fibres, ou bien causée par l'impulsion

Causes



428

Le 1<sup>er</sup> est supposé sur la surface du nez  
 Elle arrive très rarement chez les enfants  
 elle se manifeste plutôt chez les adultes  
 par un effacement chez les femmes que chez les hommes  
 Dans les sujets tendus que dans ceux qui  
 ne le sont point.

Signes

On ignore entièrement ce que c'est que la  
 dans la nature ou la cause plutôt par des  
 symptômes qu'ailleurs. C'est-à-dire lorsqu'il y a  
 de la fièvre tant et par des périodes régulières  
 tandis que d'autrefois ils ne le font point.

Lorsqu'ils se font souvent fréquemment, ils se  
 font souvent par des douleurs extrêmement fortes  
 dans les os affectés, qui se propagent avec  
 extrême rapidité dans les os voisins (ou ils vont  
 rendre qui au bout sont suivis de mouvement  
 convulsifs involontaires, et qu'on le remarque  
 pour les os de la face, dans ce qu'on appelle  
 tique d'Alcibiade, qui est causée par l'affection  
 du nerf maxillaire supérieur, on l'a remarqué  
 qu'il y a un léger gonflement, on remarque  
 dans cette maladie un dérangement dans les  
 sécrétions tel qu'on le voit pour celle de la  
 dans l'affection du nerf facial, dans la sécrétion  
 des larmes, qui se font qu'il y a abondamment  
 même les larmes lorsqu'elles sont irrégulières  
 Symptômes les douleurs sont très vives.

Traitement

On est rarement parvenu à guérir cette  
 maladie d'une manière radicale, malgré les  
 moyens que l'on a employés. On a même  
 un peu de soulagement. Plus dans son  
 usage sont la cautérisation, car elle procure  
 une sécrétion de suite d'adiposité d'après  
 de l'huile, les os, les ossements, et toutes les



substances irritantes la section. Au cas où 135  
la cautérisation et la section de nerfs, groupés  
les nerfs pris à divers endroits. Il faut même lorsqu'on  
les fait dans le lieu même affecté, qu'on en  
entre par conséquent plus tard de guérir la  
maladie, ce qui n'est point facile à faire car  
on n'a un exemple connu la strabisme  
orbitaire du maxillaire supérieur, puisqu'il  
peut se faire que la maladie soit dans le  
canal sans orbite. Cette affection rare  
elle même n'est pas fréquente, puisqu'il n'y  
aait des personnes qui vivent avec elle  
longtemps, qui sont seulement guéries pour  
toute fois, qu'on a vu des douleurs de temps  
à autre, lorsqu'ils sont par intervalle. Cependant  
il y en a qui sont mortes, toutes les fois qu'ils  
avaient algie accessoirement de douleurs très fortes.  
Des Ganglions. Andanne en a vu à de  
petites tumeurs qui surviennent dans la gaine  
des tendons, adhérentes extrêmement à ces tendons  
cellulaire qui les environnent. Accompagnées de  
petits dépôt ou foyers purulents au-dessus,  
au-dessous, qui au lieu de se dissiper  
laissent des ganglions des tendons de la main  
que l'on a vu encore exister à la partie  
antérieure et inférieure de la jambe à la suite  
au dos et même à la face, qui persistent 99<sup>th</sup>  
disparaissent par une pression exercée dessus.  
C'est ce que j'ai observé il y a 99 ans  
page 110. Dubuis, qui avait son siège dans  
le nerf médian, au point je puis me rappeler  
au nerf cubital, lequel en 1799  
à l'époque, qu'une femme de 36. et 37 ans



portant, encore le caude, qui qu'on rache  
reimant de la division de l'ensemble qui  
ne durent point longtemps, la tumeur est  
approchant du Volume d'un haricot et d'une  
figure oblongue.

Signes

Tout est en petits corps sans du Volume  
d'une sole d'ongle, tandis que d'autrefois  
maines au de la recanoit qu'on y en par  
Série de Symptômes qui les accompagnent  
qui sont des douleurs plus ou moins dantes  
mais jamais aussi vives que par la suite  
qui augmentent les qu'on les compriment.

Craintures

des applications topiques appliquées sur  
ne fait aucunement pour les qu'on idem  
produisent même qu'un effet. Mais  
d'autres moeurs que d'ou faire l'opération  
manière faite les Malades qui risquent, ce qui  
facile en mettant les parties d'impact.  
les cas où ils présentent des difficultés  
catéques (sanguine), on se conduira  
comme pour toutes autres espèces de tumeurs.

Leçon du  
14<sup>e</sup> cours

### Affections du Système Cellulaire

Toutes celles qui s'attaquent sont du ressort  
la chirurgie, et sont bp plus nombreuses  
qu'on la pense jusqu'à présent.

On peut rapporter toutes les affections  
au Maladies à deux classes. 1<sup>re</sup> En celles  
qui consistent dans les dérangements des fonctions  
2<sup>re</sup> Dans les dérangements des affectations org.

Dérangements  
de fonctions

1<sup>re</sup> Le tissu cellulaire se trouve dérangé  
dans les fonctions car. Hg. Dans les tumeurs  
et dans les obstructions. Il y a cependant des  
parties où il y a en même temps car. cellulaire







439 Grandes masses de rapture se réunissent  
en donnant issue au fluide, au moyen  
petite ouverture, glandes nomme basiphères  
et manchures. Au pifère ces dernières,  
ce qu'il est intéressant d'envisager les parties; par  
dans cette circonstance, l'ausant il s'arrête de  
essayer à l'end insérées qui sont réunies  
glandes. C'est pour cette fin que l'on doit  
faire les plus éloignés possible les uns des autres.

Locale La locale est celle qui se lie à une  
une partie déterminée, qui porte presque  
toujours le caractère essentiels; C'est pourquoy  
il ne faut pas la confondre avec la glande  
puisque certaines parties ne peuvent être  
que cette manière, par ex. les paries,  
bras, que l'on pourroit la rendre pourvue  
tandis que l'autre occupera celle qui  
sage hy. aux rampeaux, aux boucles.

Altérations organiques Les altérations organiques du tissu  
peuvent dépendre d'un trouble dans les fonctions  
qui sont plus multipliées que la pathologie  
l'ont fait, ce qui est dû à la glande seule le trouble  
longue avec l'absence d'activité, dénommée  
assez improprement, ont bien une nature différente.  
Cependant les rapportes à quatre espèces  
il y a ce qu'on appelle l'urpe, 1.° l'urpe,  
2.° les lanciers antistie, 4.° l'urpe il y a une  
de trouble qui approche de l'urpe lanciers  
qui est lanciers de sa nature. On peut encore  
y rattacher des hydrations qui se développent

Des langes 1.° Les langes consistent dans une accumulation  
de graisse dans le tissu cellulaire sup.  
quantité, qui peut se développer dans les



parties du corps ou il y a de la chaleur, comme HAO  
au cerveau, et au plexus. Ils ont été  
observés en premier lieu par les chirurgiens. Ils  
existent en une espèce d'accumulation générale,  
tandis qu'il en est d'autres qui sont  
limités par des limites dans leur  
extension, tandis que les autres s'étendent  
70 Les tumeurs sont des tumeurs formées des tumeurs.  
Dans le tissu cellulaire, au de l'extérieur, dans la  
même masse, dans la même, dans la même  
forme dans l'intérieur, dans la même, dans la même  
certaines organes, car le fœtus. La tumeur, qui est  
elle-même une espèce de tumeur particulière.  
qui est formée dans le lieu où elle se trouve,  
ou en fait très fréquemment, presque toutes  
les tumeurs qui s'observent au col tout de cette  
nature.

71 Les tumeurs cutanées, qui, d'après leur nature  
sont distinguées en tumeurs, tumeurs, tumeurs,  
qui en fait s'observent, ne sont point dans la  
tissue cellulaire, elles sont formées dans d'autres  
organes, car le fœtus, les ovaires, ces derniers  
sont fréquemment affectés. Elles ont une poche  
plus ou moins caractéristique, qui tantôt est  
résistante, tandis que d'autres fois elle ne l'est pas.  
On les nomme tumeurs lorsque la tumeur est  
semblable à une dissection de graine  
de guinea, et tumeurs lorsque il ressemble  
à du miel, tumeurs lorsque ce n'est que  
la tumeur. Les tumeurs ont en une opinion  
comme les tumeurs, dans la manière dont  
manière jusqu'à présent, dans la manière dont  
les tumeurs, dans la manière dont  
les tumeurs, dans la manière dont



H.M.

car c'est par son organisation que l'organisme se termine  
en tel ou tel nature, lequel déterminant la cellule  
où il se forme, elle-même au même point, tout  
concerne la même chose, cela peut se faire, il s'en  
suisse admettre qu'il se développe avec affa-  
iblissement, qui par sa nature produit  
fluide qui contient la même substance, se trouve  
au même, au lieu de la distinction d'individu

locus du  
15' d'âge

l'ensemble  
sanguin.

hydrotique

1.° Celles qui ont une teneur sanguine  
sont assez rares, et l'organe dit en ar-  
rêt de l'ensemble à l'observation de l'ensemble.  
D'autre part, on voit encore l'ensemble  
3.° Enfin il y a les hydrotiques qui ont  
aussi une teneur très rare, lesquelles sont  
susceptibles d'acquiescer au volume assez considé-  
rable, pour faire naître à l'existence de corps, qui  
dans le cas d'arrêt, et réunis en groupe  
vigilant et puis, en tant que l'ensemble  
de l'ensemble, il y a plusieurs traits, au-  
de perfectionnement de l'ensemble, une teneur  
à la partie antérieure du col, qui génère  
à la respiration, qui avertit son propre  
sur la trache, et l'ensemble, qui avertit la même  
quelle cause la mort de l'ensemble, ou en  
le fluide qu'elle contient, s'épanche dans  
et cette dernière, se voit par l'ensemble  
cadavérique, qui se voit, qu'une réunion  
Après avoir considéré ces différentes  
de l'ensemble, nous allons en examiner l'ensemble  
Savoir elle se voit l'ensemble d'une  
les parties où il y a du tissu cellulaire, et  
se forment spécialement dans les mêmes  
graisse abondante, et il est de remarquer  
en l'ensemble, fréquemment à celui du corps

De

pastent ailleurs, dans  
être formés qui par de l'âge  
de grande par le temps ~~de l'âge~~  
Quand jamais autant que les ~~autres~~  
qui par le temps de l'âge ~~de l'âge~~  
par suite de l'application ~~de l'âge~~  
d'une. Quand aux Hites il met qui ~~de l'âge~~  
un très grand développement.

Souvent elles arrivent sans qu'on ~~de l'âge~~  
qu'on s'en est du, tandis que d'autrefois elles  
sont la suite de contusions faites à une partie  
Lorsqu'elles sont superficiellement placées  
il est impossible de ne pas les reconnaître, ~~de l'âge~~  
que par le temps de l'âge, mais il en est  
pas ainsi pour celles qui ont leur siège dans  
l'intérieur des cavités, ayant leur siège dans  
la tige cellulaire qui s'y trouve, tel que p. ex.  
pour celle qui existe entre les fessières de  
l'isthme, pour celle qui concerne l'abdomen, ou  
bien même q. ex. dans les parois. Ici occasion  
de voir une de l'abdomen d'un ~~de l'âge~~  
qui en marque, pour la quelle diffèrent  
elles en sont ~~de l'âge~~, qui se méprennent sur  
la nature de l'affection, qui à la vérité n'est  
nullement facile à reconnaître. Si on parvient  
à les distinguer dans quelques cas, on peut  
q. ex. qui se rapportent à l'affection de l'abdomen  
Mais seulement ce qui peut se faire,  
est que jamais les loupes ne se forment que  
dans les endroits où existe de la glande, et la  
plus particulièrement à la tête qui en est  
puist un volume très considérable. Les ~~de l'âge~~  
anciennes peuvent reprendre un peu



elles seignent de soit un Albâtre affluant  
un bien un Albâtre, qui admet l'un que d'après  
l'usage de l'un, qu'elle continuant cela est  
impossible que d'autres souffrent en rien  
l'un que l'autre.

Les Maladies sont au facteur pour  
saines, elles ne le deviennent qu'après  
d'altération et la position qu'elle est, il y a que  
le Malade qui peut être, ce qui tient à la  
dégénération d'une cause dans quelques cas.

C'est à dire différents malades pour  
d'abord les malades, dans l'infirmité de l'un  
les malades, des quels on a pu tirer grand  
effet, ce qui tient à ce qu'il n'est point de  
premier de changer au statut de faire d'un  
une affection organique, par l'emploi de  
des malades, de manière à guérir la cause  
de l'un que nous ne pouvons point expliquer  
en diagnostic en appliquant. L'essence d'un  
d'un malade au malade ou matière qu'elle est  
par le moyen d'un malade, ou l'un pour  
saines, les quels comprennent d'un malade  
chose un malade que les malades, en ce que  
une espèce de malade au malade encore agissant  
des malades, employés d'une manière que  
fréquente malade pour celui qui est d'un  
l'un malade le malade, en ce que ce malade  
l'un malade les malades du malade, peut déterminer  
une malade et par là l'un malade  
de l'un que cela a l'un pour les malades  
l'un malade.

02. On a enfin pu se procurer  
la ligature, la trépanation et l'ablation. On  
a dit qu'on pourroit faire usage de la  
première dans les tumeurs à long pédicule,  
qu'on pourroit faire usage de la seconde que  
dans cette circonstance, et dans celle  
qui s'en suit, pour faire une incision  
à l'endroit de la tumeur. Dans le cas où il s'agit  
trop court, si la tumeur étoit portée  
là, il faudroit autant faire l'ablation  
tant de suite que de la trépanation. Ainsi  
on ne fait plus que se servir de la trépanation  
de la ligature, à cause de la douleur  
qu'elle détermine au Malade ainsi  
que le gonflement qui survient ce qui  
fait qu'on se désigne plus spécialement  
de suite à l'ablation, ou à la trépanation. On  
fait encore usage de l'ablation.

La coupe  
de la tumeur

Ablation de la tumeur qui consiste à  
faire une ablation, ou bien la trépanation  
à l'état d'une manière différente  
une tumeur en fait une incision  
circulaire autour de la tumeur, et  
qu'on en la coupe à l'endroit de la tumeur  
qui se fait en trépanation. L'autre circonstance  
est au moyen d'une simple incision  
antérieure de la tumeur, pour enlever  
légèrement, qui est l'effet de la trépanation  
d'après elle, d'après qu'on en fait l'usage.



1926 cella la col d'arsenica en present.  
P. luteus d'aproposada unanimitat

cellula col. double en précédent.  
 Ces sortes d'opérations m'ont paru  
 faciles à faire, avec certitude  
 cas de difficultés représentant à cause  
 du rapprochement trop avec le paracéphale  
 cas. l'ord. sont trop fixés, q. n. p. les  
 retrancher, au q. d. l'écriture se perd  
 V. l'ou écrit. Aussi d. c. dernières se perdent  
 sont se d. opérat. très délicats à faire, telle  
 q. celles q. ont l. ligne au col, ou à d'ant  
 endroits, q. demandent à ceg. les respect  
 q. l'op. V. l'ou les traversent. Q. à celles de  
 colonnes q. adhèrent fortement aux  
 gros V. l'ou aux os, l'ont 99 ff. alligé  
 pour faire l'amputation au squelette  
 une trop q. d. partie au recouvert.  
 100 ff. alligé. Division des

On est g. obligé d'insérer les  
témoins avec les annexes, malgré que  
les lois provinciales attendent d'être  
grandes. L'acte, g. le réunissent bien  
difficilement qui se fait alors suivez  
les cas originaux. Quand on est g.  
obligé de les insérer, la rédaction  
est d'office.

De l'amputation. Lorsqu'on veut faire l'amputation d'un membre, on le protège d. l. manière suivante. On place le malade, placé et ceux malade, ainsi que les instruments, chaque bandes de. On doit d'abord attirer l'attention de ménager le plus que



[illegible]



144 L'incision d'induration en longueur et qui  
se traverse dans le sudroit au ille d'indur  
sans s'ele laisser d'une cicatrice difforme  
sur des paupieres, est pour effacer son  
est endroit au l'effort toujours d'une  
incision transversale, en faisant le plus  
pres du nez.  
Est que les bords se réunissent mieux. Vaincu  
faite, il est assez facile de le retirer, surtout  
de quoi on réunir les bords, en évitant le plus  
qu'il est possible d'inflammation, qui si  
elle venait au la Disposition, l'opération

### Affection de l'organe cutané.

Il y a deux principaux autriches, l'une  
en neustant, que présentant de la diffi  
dans leur structure, qui sont l'epiderme,  
le poil, les ongles, dont nous parlerons en  
traitant de l'affection de ces organes.  
Quoique l'epiderme présente l'indifférence  
d'après le chorion dans leur structure, cependant  
lorsque l'un est affecté, l'autre l'est aussi de  
suite peu de temps après, avec aussi de  
exemples dans les corps, les aiguës et autres  
affections qui sont en même temps du chorion  
de la chirurgie et de la chirurgie, lorsque le  
seraphule, le dartre, le scorbut, la peste,  
le scabie, le ruzarole, Cependant l'indifférence  
plus spécialement de ces deux derniers  
tandis que la chirurgie l'opère plus souvent  
des premiers, sur les quelles se trouve



point, en ce que nous nous en sommes fort  
occupés. Dans le traitement des ulcères,  
en est de même pour l'érysipèle et l'éléphanté-  
dant la 1<sup>re</sup> à cette limite en parlant de l'éléphanté-  
et l'autre dans les dépôts. D'après cela nous  
ne parlerons que de certaines affections, avec  
des ulcères, de la teigne, l'éléphanté-  
que l'on peut dire telle est la limite qui appartient à  
la chirurgie, telle autre à la médecine, il n'y  
a point de limite entre celles qui leur  
appartiennent spécialement, ce qui est qu'un  
affaire de coutume.

Leamdu  
18 Septe

Das Engolures.

Au dancse se veno à une espèce d'infirmité  
 chronique, qui affectoit les estomacs & les  
 reins, qui causeoit des douleurs assez vives.  
 Les dancse chronique, par conséquent durent  
 long temps, ce qui fait d'après la grande  
 pureté les rapprocher de la 3<sup>ème</sup> série  
 les quelles arrivent chez les vieillards, vulgaires  
 qu'ils paraissent.

Il est rare qu'elle affecte les dermes, <sup>chez lesquels</sup> elle s'attaque plutôt les jeunes gens, et plus certaines personnes que d'autres, dans qu'on en a vu plusieurs raisons. Il faut admettre grand soin de remédier lorsqu'elle paraît sur le visage, parce qu'elle lui occasionne une odeur fétide et qu'elle lui fait faire des progrès plus ou moins considérables, les personnes qui



plus exposées à se être atteintes une autre  
cause. // est des individus qui en ressentent  
plus de douleurs que d'autres. // est rare qu'ils  
succombent avant les premiers frois, surtout  
chez celles qui n'en ont point encore eues.  
Au les considérer comme effet du froid  
sans qu'on lache à quoi cela tient, puisqu'il  
dans certains cas se termine et résout en car  
tunique, en demandant du ressort à migrastie.  
Au les fait arriver. // chez les personnes qui  
ayant froid passent subitement au chaud,  
ce qui arrive à celles qui présentent l'ulcère  
ulcères au foy ce qui produit dans l'intérieur  
une éruption de turgescence. Dans l'hyperstie,  
extérieure, par l'hyperstie de l'apex, tandis  
que les profondeurs restent pas encore.  
arrive alors pour les engulures, ce qui arrive  
aux parties qui sont gelées, qui les présentent  
sous le feu n'en étant pas trop éloignées, l'ulcère  
n'est pas en gangrène. // que les parties sont  
dans une espèce d'infirmité, se résolvant au point  
les considérer car étant dans un état d'atonie.  
Les parties qui doivent en être affectées,  
qui sont les plexes et les collines; plexes  
derrière la face dorsale, tandis que plexes  
l'autre est ord. que les tâtines, dans  
ord. plexes, dans d'immensité assés  
le plexe devient un peu flaccide, et un  
type qu'elle n'a pas un peu qu'elle n'a







451 Dans le cas où des chairs languissantes se  
manifesteraient, employer l'opprobre  
pour les détruire. On les peut aussi  
couper dans, et quand l'écaille est en  
petits grains employer quantité de  
mâges, en ce qui concerne les chirurgiens  
sont toutes pour elles, et que chaque  
personne à l'instant son remède différent.  
Des Corps aux pieds, ainsi que  
des ongles.

Des Corps 1.<sup>o</sup> Les Corps sont des durillons qui  
surviennent aux articulations, et qui ont une  
forme allongée, et qui sont pour  
rester, souvent seigneur appelé l'écaille,  
paraissant résider dans l'épiderme, mais  
par suite affectant toute la peau et  
jusqu'à os.  
Causa Ils sont ordinairement produits par  
l'usage que cause les chauffeurs, qui  
peuvent tenir à leur langue et leur langue  
Celle remarque qui leur revêt une  
semblerait plutôt être intéressante, bien  
examinant les, puisque se voit qu'ils  
naissance. Dans la quelle nous nous sommes  
dans les, que nous nous nous plus  
l'effet lorsque les durillons qui se forment  
apparemment n'ont pas été éprouvés  
en voyant leur fait l'écaille aux doigts  
des pieds, parce que ceux-ci sont  
dans le mouvement de l'écaille, s'allongent



naus marchans, s'agissent alors que les  
artels se fléchissent et se trouvent plus  
par les spallés. S'agissent nient point aux  
de la queue s'habitent, alors s'agissent de la queue  
latérales du pied, au s'agissent de la queue  
mais s'agissent de la queue. S'agissent  
à fait à ce sujet un mémoire très  
intéressant.

Si l'on parvient à désigner les cors, on  
voit qu'ils ont une nature fibreuse,  
forme de cornes hyperopées de la queue  
les autres.

Ils consistent souvent dans un ou deux  
partes, ce qui tient à la position que l'on  
occupe les chaudières. S'agissent cependant  
observer que cela n'est point toujours  
produit par la position dans les  
temps d'usage sans qu'il y ait de la queue  
ce qui n'est qu'à la position des parties  
par la rarefaction de l'air, l'agilité  
première même, est que s'agissent au y. S'agissent  
des douleurs dans la queue et dans les autres  
chaudières.

On ne peut s'agissent les autres qu'il s'agissent  
d'agissent, qui par la queue de la queue,  
s'agissent l'agissent et l'agissent. S'agissent les  
autres, qui s'agissent l'agissent  
s'agissent l'agissent. S'agissent l'agissent.  
1. Les Agnes s'agissent spécialement Des Agnes.  
dans les s'agissent au les s'agissent l'agissent.



488 plus exerce, et est pumula quicquid  
plus particulièrement pour les cas de...  
qui par leur nature différent...  
des autres. Ils sont...  
par des causes...  
les uns sont les autres.

Ils ne causent point tant de douleur  
que le cuir, se qui tient...  
expose à la chaleur...  
surface. Au lieu de...  
passions très fortes, on leur...  
Ils ont...  
difficulté aux pieds, en les...  
appuyés sur...  
doit les enlever...  
pour être plus...  
indication du...  
Des Verses.

Logan du  
19 d'octobre

Il est bon de dire auparavant qu'on  
doit point les confondre avec...  
excessives qui arrivent aux organes de la  
génération, tant chez l'homme que chez la  
femme, car au contraire...  
lesquelles sont...  
constitutionnelles, qui ont...  
rapport avec les...  
elles sont...  
arrivent le plus...  
dans la...  
volonté chez les personnes...  
djà...

154

7



155 97<sup>e</sup> acquiescent une flammée très caustique  
 Il s'en suit d'autres maux, par lesquels  
 que la flegme et les instruments tranchants.  
 Rarement on fait usage de la flegme, ou  
 quelle cause sur la partie ou on l'applique  
 une inflammation, qui peut être un peu la cause  
 d'un ulcère d'ulcère. Par conséquent, il faut  
 garder un usage des flegmes et des flegmes  
 de manière à empêcher tout de suite la partie  
 et non l'augmentation, mais sont encore  
 faire usage des instruments tranchants.  
 Cela Crique.

Ensuite  
 de la cécité  
 les Oeilles.

Il est bien d'avoir que d'un parler, d'un  
 un sont tous d'autres, affectueux, à la quelle  
 la peau du crâne peut être exposée.  
 1<sup>re</sup> D'abord il arrive qu'il arrive derrière les Oeilles  
 une inflammation profonde, qui arrive plus  
 particulièrement chez les enfants, qui s'en suit  
 à l'augmentation, plus caustique de l'ulcère  
 de la cécité, produite par les glandes de la  
 peau qui se tranchent.

Ce léger l'augmentation par laquelle  
 est qu'il s'en suit, en fait peut être  
 en suite, par conséquent, on peut  
 faire disparaître, ou qu'il s'en suit  
 que par un effet de la nature, que  
 devient simplement au moyen de la

Quand  
 l'augmentation

2<sup>e</sup> Il est une autre affection qui peut  
 être confondue avec la cécité, qui s'en suit

également au cuir adhérent, c'est-à-dire les dents 456  
lactées, qui n'en diffèrent que parce que  
le premier est accompagné d'ulcères, tandis  
que l'autre n'en a point.

L'usage de s'effrayer les gencives, au dait  
taché de les entretenir, me rappelle à remarquer  
quelles étaient les salivaires pour les enfants,  
ce que le vulgaire sait au contraire très bien,  
qu'il caractérise dans le nom de gomme,  
qui quand elles n'ont point en l'air, dit qu'elles  
sont point de cette même gomme, qu'elles  
conservent comme salivaires pour les dents  
adent les os. Les dents ne sont point l'usage  
de pousser.

Après avoir vu le nom de l'usage  
à une affection chronique de la peau ou  
Crane, qui consiste dans la présence de  
craintes qui s'entraînent fortement fixées,  
lesquelles ont une épaisseur et une largeur  
plus ou moins considérable, qui s'élèvent  
ce qui fait qu'elles seignent au dait  
platineux ne sont point accablés sous  
sujet, qui sont d'origine d'après les caractères  
dans les quels elle se présente en quatre  
espèces 1.° de la surface, 2.° d'origine, 3.°  
d'origine, 4.° de la surface, qui sont pas  
trop faciles à reconnaître parmi les autres  
lesquelles, en quelques uns point de caractères  
bien différents.  
Elle peut se développer de deux manières,  
de naissance, ou bien par contagion.



2487

Causes

Quelle due à une affection l'erythème  
 rubin id'autres causes? Perquis forment  
 croise dans certains cas qu'il est due à une  
 disposition l'erythème est que si l'écoulement  
 qu'on a chez certains individus au point qu'il  
 peut par suite affecter de plusieurs l'erythème  
 au lieu de l'écoulement. Il peut encore survenir  
 par la frigidité des personnes qui ne  
 sont point, avec celle qui font, ce qui est le plus  
 pas croise qu'il est la cause, puisqu'il  
 est le plus, ou la surait le plus, ce  
 qui n'est pas. Il est le plus probable qu'il  
 se jette par le sang de la peau de la peau  
 qui n'est pas à celle qui l'est, au lieu  
 encore par la transmission d'un autre  
 qu'un autre.

Il est à remarquer que beaucoup d'élus  
 est très rare qu'ils puissent être en  
 laient affectés.

Lignes

Il se développe toujours par une  
 éruption miliaire au lieu de l'écoulement  
 p. m. considérable, qui constamment sur  
 de l'écoulement. Lesquels on remarque  
 77. De petits ulcères et bandes qu'on voit  
 ne remarque simplement qu'il est  
 Il apparaît le d'une affection qui n'est  
 les pressés et les pils de l'écoulement dans  
 99. Des circonstances. Il ne paraît pas mal  
 de que prétendait certaines personnes, que

la tige a été tuée. D'autre l'ont dit 38  
chénopée. Quoiqu'il en soit, c'est une considérable  
l'accompagnement, tandis que d'autres fois les  
malades sont dans le délirium. Il paraît  
qu'elle est susceptible d. qu'on s'efforce  
de la guérir, surtout chez les petites filles,  
ce qui fait qu'on poursuit l'abandonner  
à elle-même, bien que la nature semble  
guérir, qui peut être tenue à l'écart  
cachée que nous ignorons.

Les moyens à employer pour la guérir  
sont les suivants: 1. se servir de saignée  
en examinant ce dont sont affectés les  
autours, qui sont en partie de la région  
l'acabement.

Il faut d'abord diminuer les douleurs  
si ça se peut, ce qui se fait en employant  
des moyens adoucissants, en même temps  
qu'on tâche de faire disparaître les  
causes, car si une fois les douleurs sont  
coulées. On se sert de la saignée de la substance  
végétale, c'est-à-dire en employant qui toutes  
sont pour ainsi dire de la même nature  
irritation locale. Les préparations de  
safran, de safran, sont aussi employées  
quand l'écoulement est très abondant  
car les substances grasses la rendent  
elle aussi employée, que j'ai une réaction  
dans ces derniers temps.



que quand nous  
vivons.  
Hendrix nous a écrit, comme  
il nous a écrit à son fils de se  
employer, les autres de se  
travailler, qu'il nous a écrit  
Mallard de la D. de la D.  
Mallard de la D. de la D.

autres, qq. avec saign.,  
insinuant rare.  
Causes qui y donnent lieu, sont les  
fautes très communes qui font  
les scélérats, la peur q. les secours sont  
éloignés.



pousser en haut, dans les angles, 69  
 ne le pouvant pas à cause de la résistance  
 qu'elle lui présente d'insidément dans les chairs  
 et d'augmenter l'un au développement de  
 fongosité qui les recouvrent et d'augmenter  
 et d'augmenter d'ailleurs, lesquels se trouvent comme  
 adhérents à la peau au bout de  
 Il ne suffit que d'augmenter l'une d'elles une  
 simple inspection pour les reconnaître. Signes

Deux indications se présentent pour les  
 guérir, trancher le portion <sup>d'angle</sup> d'angle dans  
 les chairs, puis détruire les fongosités,  
 ce qui se fait par le passage d'un fil de soie  
 au tranchant des angles qu'on en d'angle, après  
 la mise en désordre, au moyen d'un  
 instrument tranchant. On détruit les chairs  
 avec les pressa caustiques. On peut aussi  
 l'un peut-être à la manière de Desautels -  
 repasser au moyen d'une place et d'un  
 bandage. Quelquefois on ne peut point  
 tout d'un coup les extirper du bout s'il s'agit  
 d'un saut au bout l'extirpation se fait  
 ce qui fait qu'on recommence le traitement.

## Affections des Systèmes

d'organes qui conviennent à former des appareils.

### Du Système Musculaire

Les affections qui le composent ont  
 en dépendant sont au nombre de trois  
 1<sup>o</sup> La Gastro-Salivaire 2<sup>o</sup> La Gastro-Viscérale  
 3<sup>o</sup> La Catarrhe l'autre correspondant au  
 diaphragme, elle continue avec la peau.



468 id est les otolaries d'ant et d'ant

10. Les otolaries otolarysées sont d'ant  
distinction exposées à être otolarysées qui d'ant  
les cas d'ant est presque du ressort de  
otolarysées si on ne s'occupe otolarysées  
conjectures. Ils sont dans qq. circonstances  
otolarysées pour prendre le caractère de  
otolarysées au lieu d'ant dans la descente  
otolarysées du Rectum, dans les autres  
nature.

20

quelque l'on dit que d'ant par les  
affections par l'ant, cela n'est point d'ant  
on l'entend plutôt par analogie d'ant  
11. on ne peut pas trop le dire pour celle  
qui tapisse la otolarysées, les otolarysées, en ce que  
ne l'entend pas trop l'on s'occupe d'ant, dans  
otolarysées, on s'occupe d'ant, on s'occupe  
point trop admettre ce qu'on dit les  
pluspart des otolarysées qui s'entendent  
qui la otolarysées comme d'ant par l'ant  
ce qui n'est point, on s'occupe d'ant  
différentes dans les lieux qu'elles tapissent  
On la désigne maintenant dans le nom  
d. Otolarysées qui dans certains cas s'entendent  
être confondue avec l'argumentation d'ant  
en ce que quelques otolarysées s'entendent  
en ce que qq. il se trouve argumentation  
quelque l'ant il y a d'ant d'ant  
qui l'entendent dans cette dernière. On ne doit  
point prendre pour la otolarysées  
otolarysées, en ce qu'il s'entend par l'ant  
otolarysées d'ant jamais en d'ant et d'ant



qu'en la partie sont divisées en ulcères. 453

2.<sup>e</sup> Des ulcérations peuvent y exister, entre d'ulcères  
sans avoir parlé en partie d'ulcères.

3.<sup>e</sup> Les cancrs se abesse assez fréquents. De cancrs  
et est à elles qu'elle doivent être rapportés  
Droits certains cas, malgré que l'on dit qu'il  
cancres de l'ulcère, l'ulcère d'ulcères, qui  
en premier lieu à commencer par l'ulcère  
ulcère de la bouche, au lieu par la langue.

4.<sup>e</sup> Elles sont très fréquemment à siège d'ulcères  
d'ulcères, qui ne sont pas chez elles  
par la rupture, la division des vaisseaux  
amis d'un par une espèce de translation  
qui d'après la manière dont elles arrivent  
pour être divisées en actives passives  
sympatiques ou sympathiques, puis d'une  
manière essentielle. C'est une fréquence  
dans ces membranes, qui ne les arrivent  
fait considérer que comme à elles appartenant.  
affaires d'ulcères d'ulcères, en la tige cellulaire  
et la peau appartenant également à elles.

5.<sup>e</sup> Il faut si développer des tumeurs de cancrs  
sympatiques, qui ont le caractère d'être sympathiques  
sanguines, de la même manière qu'un  
que celles sont sans avoir parlé en  
traitement des maladies du tissu cellulaire.  
les hémorroïdes ne sont que de l'ulcère.  
6.<sup>e</sup> Enfin elles sont exposées à des tumeurs  
sanguines, qui comme elles sont sympathiques  
d'après la partie qui est prise  
de nous d'ulcères suppurant les hémorroïdes



1.64

ont une nature semblable.  
 Le second est le système siccité. Il est composé de plusieurs membranes, qui toutes recouvrent les principales cavités du corps. Il y a l'œsophage à la tête, les plèvres pour l'appareil, ainsi que la membrane interne du péricarde. Le péritoine pour le bas-ventre et la tunique vaginale pour l'homme. Toutes représentent des sacs dans lesquels se trouvent les différents organes, mais les uns se distribuent chacun par son propre vaisseau au diaphragme, excepté le péritoine qui communique avec l'œsophage par la cisterna, au moyen des branches de l'aorte. Il est donc susceptible de l'œdème et absorbant, a une grande capacité de sécréter, exhaler, ou phlogiser. Tout cela est de la nature calcaire, qui quand il est sécrété, en plus grande quantité qu'il n'est absorbé, produit des hydropisies.  
 Il est susceptible d'être attaqué d'inflammation, qui tantôt est considérable, tandis que d'autres fois elle n'est point, qui le plus souvent produit des douleurs locales, conduisant au cancer, d'où les divers différents d'inflammation. Le siège qu'elle occupe au bas-ventre, la région où elle est déterminée par



l'affection des organes, ainsi il y a une 465  
hépatique, la gastrique, la splénique,  
l'intestinale, toutes que cela n'est point qui  
parviennent toutes des ces espèces d'inflammation  
au péritoine au premier lieu, c'est pourquoi  
on ne fait plus cette distinction.

Ces plaies d'inflammation des membranes  
parviennent appartenant à la chirurgie, tant  
dans le domaine de la médecine, si on  
ne excepte la cécité qui dans quelques  
cas, tombe dans le plan de toute op.  
appartient, Hg. la tunique vaginale y  
appartient entièrement, qui par son affection  
determine souvent l'hydropse, que l'hydropse  
est l'un des au moyen de la punction  
dante de l'hydropse d'une tumeur  
excitant, pour produire de l'inflammation  
et par là produire son adhérence. Plus  
se voit par l'opération qu'il n'y ait qu'une seule  
partie de la tunique vaginale d'inflammation  
et c'est ce qui dans qques circonstances est  
comme si est mépris pour l'affection pénétrante  
testiculaire.

En général elles sont très sujettes à être  
atteintes d'inflammation, comme on voit plus souvent  
que la pleurésie, ce qui ne peut douter non  
les exemples qu'on en a puis par ceux de l'inflammation  
mème vient à l'inspection de l'ovaire, qui  
fait voir les adhérences entre la pleurésie et la  
et la tuberculeuse d'inflammation chez elle  
peut se terminer par résolution ou par  
suppuration, qui est caractérisée par cette  
épanche de sang qui se tapissent qques fois, par



466 d'une manière étrange à de petites taches, puis enfin  
d'une manière étrange à la quelle au par  
aquante l'hydropisie qui vient à l'effluve  
laquelle est presque dans tous les cas  
d'ailleurs de la médecine qui lorsqu'on a  
cette au jour au fluide, et puis reman  
le plus interne, et au la remorque chez  
des personnes qui l'un fait de temps à autre  
des punctions pour le purifier.

Dans tous  
les cas

Cependant on croit que les hydropisies  
dépendent de la lésion organique des  
membres sereux, mais il est reconnu  
maintenant qu'il n'est point de lésion  
avoir lui de trois espèces, 1<sup>re</sup> l'effluve  
comme dépendant du trouble de l'opération  
vitale de ces membranes, 2<sup>e</sup> fait observer  
que le changement de forme des fibres ou  
du fluide n'est que cause de l'effluve à la maladie  
determined par la pression du fluide contre  
lui, comme pour les autres organes. 3<sup>e</sup> d'une  
manière organique, c'est à dire d'après la  
lésion des membranes. 3<sup>e</sup> Sympatisme  
c'est à dire ne croit point nécessairement  
par les Maladies du cœur ou du  
Dolques voisins, car du fait, li.

Effet du système sympathique  
Il y a une analogie avec celles du  
système précédent, mais les membranes qui  
le composent peuvent être distinguées en celles  
qui reçoivent les impressions vitales  
et en celles qui envoient ces impressions  
à d'autres parties du corps.

ces angustiosités de la main, des costales, 467  
des autres qui peuvent le produire.

Elles peuvent être attaquées d'un seul coup de  
développement de petits tubercules, puis de  
petits corps qui ont une certaine consistance,  
qui se trouvent dans les articulations, les  
yeux dans certains cas se trouvent dans  
l'épaisseur de membranes, tandis que d'autres  
sont y tenant par une petite pédicule ou  
à un autre point dans la membrane vaginale.  
Dans y existant dans en traitant des articulations.

### Affections du système cartilagineux.

Les Cartilages qui le compose sont divisés  
en deux genres, ceux qui forment certaines  
parties de l'appareil, puis ceux qui  
constituent les surfaces articulaires des os.  
On les appelle.

Les premiers sont exposés à la carie, que  
on le voit gâté au larynx, la langue  
nous révèle leur état. Les seconds à un gonflement  
particulier et c'est ce qu'on appelle l'œdème  
spontané de la cavité articulaire.  
On les appelle.

Il y a encore d'autres systèmes d'organes affectés  
par les mêmes causes que ceux-ci.  
C'est d'abord le système capillaire  
système nerveux et le système capillaire  
pour les quels nous ne pouvons rien dire.  
trop indiquer les maladies, en indiquant  
les causes par trop. Les autres affectés



468 On distingue unentiers de l'arbre organique qui se compose de ces un de celles de celui de la Vie animale, sur lesquelles nous ne devons pas grand chose, mais qu'il est difficile de passer chaque organe en particulier, pris en même que toutes les autres parties du système de la vie animale, si ce n'est, celle de la circulation des qu'il nous nous arrêtons. Quand on distingue la circulation, nous y rangerons les artères, les os et les substances de la circulation des os. Pour enfin en qui regardent les organes sécrétaires, nous en parlerons en tant que sécrétions. Celle quatrième.

IV. Des Maladies suivant l'ordre des fonctions tant de la vie animale que de la vie organique. Les maladies se classent d'après la fonction qu'elles affectent. On les divise en maladies de la vie animale et en maladies de la vie organique. Les maladies de la vie animale se rapportent aux fonctions animales, et les maladies de la vie organique se rapportent aux fonctions organiques. Les maladies de la vie animale sont celles qui affectent les fonctions de la vie animale, et les maladies de la vie organique sont celles qui affectent les fonctions de la vie organique. Les maladies de la vie animale sont celles qui affectent les fonctions de la vie animale, et les maladies de la vie organique sont celles qui affectent les fonctions de la vie organique.

## Maladies des organes des Sens. 769

Quoiqu'il y en ait cinq, cependant nous ne  
nous en occuperons qu'à trois. De quoi nous  
parlerons point du touché, par conséquent  
son siège à la main, n'étant point  
déterminé au rapport de l'étude. La Maladie  
de la vue étant l'étude, nous y reviendrons  
par. Il y a encore celui du goût lequel  
est l'organe de la langue, sur lequel  
nous nous occuperons point également en  
ce qu'il se rapporte au précédent.

### Maladies de l'organe de la

vue.

Il est exposé aux trois Maladies dont  
nous avons parlé ci-dessus, qui sont les  
vices originaux, organiques et le trouble des  
fonctions.

Les Maladies qui attaquent l'œil, peuvent  
venir de naissance, ou bien accidentellement. Les Maladies  
on peut le rapporter à celles de la vue originelles

et aux globes de l'œil.

Les Sanguines peuvent être affectées 1<sup>o</sup> Les Cils  
l'une à l'autre, ou l'un d'eux, ou bien encore une peut mal  
au même temps au globe de l'œil. 3<sup>o</sup> Elles sont confirmées,  
peuvent être déguisées en devant, ou en dedans,  
ce qui constitue ce qu'on appelle l'œil larmoyant.  
4<sup>o</sup> Adhémence des Sanguines peut venir de Sanguines  
naissance chez les enfants nouveaux nés, ou





est plus difficile, elle demande le secours d'un  
habitué de la part du chirurgien, qui ne  
peut se contenter qu'en désignant pour ainsi dire  
l'autre et au globe de l'œil, il faut éviter  
la précaution de recommander au malade  
de manier les yeux, afin qu'une rémission  
ne se fasse point, autrement temps qu'un  
emplâtre ce qui causerait plutôt d'aggraver  
il y a dans tous les cas pour ainsi dire qu'il faut  
parce que les larmes ne pouvant couler  
pénètrent dans les conjonctives lacrimales, alors  
elles coulent sur les yeux.

2.° Les larmes peuvent être mal conformées & en pressent  
dans leur disposition, qui a bien <sup>des larmes</sup> ~~des larmes~~ <sup>des larmes</sup> ~~des larmes~~  
au lieu essentiellement. Le peu d'air arrivant  
lorsqu'il y a renversement des larmes, on  
sait qu'il y a une nombre de rangées de larmes  
plus grand nombre que de conjonctives, jusqu'à  
qu'il y a des personnes il y en a jusqu'à deux  
et trois, cela est cependant rare. Alluvions  
rapportés en arrivant par exemple, puis  
on y en avait un sur la caroncule, qui  
l'ayant arraché. Le malade d'ignorance, de  
2.° lorsqu'ils sont toutes naturellement de  
cette laideur, circonstance rare, qui n'est  
bien étudiée qu'aujourd'hui ces derniers temps,  
par Scarpa.



*Causa* Les causes qui donnent le plus ordinairement  
au renversement des Cils contre le globe de  
l'œil, sont de petites cicatrices, suite de petites  
ulcères de la conjonctive, qui se guérissent  
par l'emploi de sucs convenables, qui  
donnent lieu au renversement de la conjonctive,  
produit cet effet.

*Lignes*

Aussi on ne voit point tant de l'œil le  
plus ordinairement cette affection, qui s'accompagne par  
de petites picotements qui causent l'irritation  
du globe de l'œil, qui donnent lieu à une  
inflammation chronique, qui est fort incommode,  
par laquelle on commence à employer des  
pommades les baies locales, les frottements  
médicamenteux que l'administration des sucs  
internes est le plus efficace de. C'est toujours  
qu'on veut de l'emploi de tous ces moyens  
qu'on s'occupe de leur usage, le traitement fait  
alors un usage de l'œil qu'il  
la recouvre.

*Traitement* On ne voit comme cette affection se cause  
que dans l'implantation vicieuse des paupières,  
qu'on les arrachant qu'on la détruit en  
même temps qu'on fait une petite cicatrice  
dans le lieu qu'elle occupait, et l'œil se voit  
point paré que d'une part comme un œil  
un œil de la même espèce qu'on s'occupe  
au ne peut point recouvrer la vue qu'il a  
pu s'occuper c'est que cela n'est pas





**P** temps qu'il se figure la face. Les larmes  
coulent, avec quelle vitesse traversent-elles  
retenu par le petit canal que lui présente  
le rebord de la paupière, ce qui donne lieu à  
ce que l'on voit mis une grande partie  
d'eau.

**Pratiquer** Ce sont ces incursions qui ont fait  
inventer des moyens opératoires pour y  
remédier en ce qui n'y a aucun danger  
à appliquer. C'est cet opérateur qui a  
toute à cela, le quel est que par le moyen  
d'une petite division qu'il fait au dessus  
de la paupière inférieure et y mettant une  
petite lame d'or, redonne à la  
paupière sa hauteur naturelle, au moyen  
de la cicatrice; mais il fut trompé par  
l'expérience. Suffit lui d'avoir que les cicatrices  
ne se forment que par l'affaiblissement des fibres  
des plaies, ce qui par là produisait la cicatrice  
de ce qu'il se proposait aussi remédier tel qu'il  
lui de diminuer la difformité, elle augmenta.  
Ce remède ne réussit pas à acquiescence  
toute d'y remédier au moyen de petite  
bandelette aglutinative, usage sur laquelle  
on ne s'arrête point maintenant. La cicatrice  
n'est en usage est celle de Dodard (ou  
au Bordouard) qui consiste à retrancher une  
portion de la conjonctive, correspondante à  
la partie interne de la paupière, ce qui fait  
disparaître la difformité.

**Second** 2<sup>e</sup> division L'entropion agit toujours en conjonction  
avec l'écrou, ou la chaux ou la confirmation







4567 remède, qui peut suffire

Grand ou relaxement de toute même  
l'oppression qui consiste dans la paralysie  
de son muscle releveur, qui constitue une  
espèce de prolapsus, induit en particulier  
en traitement de la Paraly. des muscles.

Maladies du globe à être affecté de Maladies originelles  
gènes antérieurs en citant ex. Des exemples.

2°. Le globe de l'œil est très rarement  
enfant qui était ni avant terme lequel  
manque ou n'a pas qu'un seul œil lequel n'est  
privé de pas un seul des la position ordinaire de  
cet organe quel était situé sur la base orbitaire de  
crainte tandis qu'il n'y avait point de  
l'autre côté. Il n'avait non plus point tout  
les artères q. il devrait avoir, il lui en  
manquait, ce fait avait plutôt existant  
à avoir pour en faire la distinction, mais  
je puis l'obtenir, quoiqu'il en soit  
dépens de l'absolu.

Les yeux sont encore exposés à la  
presbytie et à la myopie, dont l'une  
consiste dans l'opacification très grande  
de cristallin tandis que l'autre a pour  
cause anormale la trop grande opacité  
du cristallin peut être aussi sur pende  
la cornée, ou l'un de l'un et de l'autre  
réunis.

imperforation de l'iris  
qui consiste dans la non existence de la  
Pupille, qui peut tenir toujours à la même  
d'une petite membrane qui existe à la

l'oeil, qu'un homme et qui - 45/47  
disparaît à l'époque de la naissance; qui  
est noté fait naît et produit alors la  
maladie de quelle est très difficile Cause  
disparaît au fur à fur de l'oeil, sans  
qu'un tache aigüe soit trise, ce qui a  
été déjà observé dans l'oeil. Elle peut même  
être la suite de l'opération de la cataracte  
et d'une inflammation du globe de l'oeil.  
Cette affection bien attendue intercepte  
tout passage des rayons lumineux.

Il faut y remédier il faut que l'oeil  
soit une ouverture artificielle, que l'on  
puisse faire encore que dans le cas qu'il  
n'y auroit point de tache à la pupille,  
qu'un appelle albuges, car si l'oeil  
à puis l'oeil au l'oeil, et la tache  
en derriere. Ceci est le premier qui  
en ait fait une. Il y a toujours en fait  
une il y a toujours une personne  
dont l'opération réussit, au point qu'elle  
viendroit à se cacher et l'on peut lire,  
sans qu'elle soit obligé d'être à l'oeil  
par les objets, mais que les rayons passent  
dans la direction de l'axe visuel, elle réussit  
il y a encore deux autres cas à Paris  
d'après la pratique de la manière  
suivante. Il se peut même la faire d'une  
manière telle qu'il se peut même  
entre la sclérotique et la corne transparente  
pour la faire pénétrer dans la chambre antérieure,




48 La queue y étant divisée avec la même  
irrégulement certaine longueur d'une manière  
transversale, mais cette opération ne fut  
puissamment finie de succès.

Famine à son imitation la pratique  
de cette, qui ne fut pas plus réussie de  
succès, se quitte attribua aux fibres tractées  
qui entre dans la compression de ce qui  
n'est encore qu'une pression mise qui lui  
donna lieu de la faire à la partie  
interne, d'une manière horizontale, afin  
de diviser les transversales. Il est facile  
à la partie interne, qui se trouve à  
la trop grande distance qui se trouve  
entre les axes fléchis.

Vinsol l'opère la pratiquait dans le lieu  
ordinaire au moyen de l'instrument  
porté dans lequel qu'on coupe la queue  
qui y étant parvenue y faisait pénétrer  
en même temps qu'elle formait dans  
cudrait un lambeau en l'abandonnant, qui  
qu'on se la détachait de l'os auquel il  
tenait par un petit pédicule, avec des  
pinces. Cette méthode ne pouvait être  
en usage de puis lui, non point qu'il  
ne le pût pratiquer pas, mais parce qu'il faut  
par l'habitude de s'en servir et qu'il produit  
le même effet par beaucoup d'autres  
Scarpes lui procurent de la force en portant  
l'instrument dans la chambre postérieure  
entre l'os pubis et le scrotum, à la partie



interne de l'opercule, en latrache.   
Lapris le corail ciliare; en même temps  
globe rotte l'instrument. Ce qui est possible le long du  
suaire et la. 2 & 3. Nota  
D. de la Différence Maladie Maladie

peut encore par les différentes Maladies Maladies  
 d'autr. il est susceptible, être réduit en un seul organe  
 corps, forme une espèce de moyen par  
 l'évacuation des humeurs qu'il contient, et qui  
 peut encore être considéré comme une  
 Maladie originelle, quoiqu'on nous rassurera.  
 former les Maladies organiques qui  
 attaquent l'organe Visuel. Il en est également  
 qui appartiennent aux Sanguières, tels que  
 glabre oculaire. De celles Des Sanguières. De celles Des  
 De celles Des Sanguières.

qui appartiennent aux  
globes oculaires.  
D'abord de celles des Paupières. De celles du  
Cil paill ennobles peuvent être affectés des Paupières  
différentes Maladies particulières aux douches  
darmes dont elles sont composées mais les  
legèrilles nous nous approprions point les  
darmes d'elle, si ce n'est avec un asinus d'op-  
portunité et traitant de la Paupière de l'autre.  
cellulaire nous nous bornons à y faire des incisions. Elles peuvent  
être cellulaires peut être le siège d'une inflammation  
infiltration séreuse qui tient au défaut de la membrane  
de la conjonctive qui est diploïque, qui lorsqu'elle  
est bien constituée une Maladie locale des  
causes qui y donnent lieu sont les mêmes  
des Paupières, au lieu même celle des  
légères et récentes. Elle se distingue par  
usage de moyens topiques tanquam. Des  
tumeurs lubrifiées, des loupes peuvent encore se former  
si d'inclapier, qui ne guérissent que par l'ablation de tumeurs  
enlevées, agissant tant soit fait, égale à la  
conjonctive lorsqu'un les extirpent, on agit



480. L'an infantant sont l'interprétation avec  
précision, on pourroit même en même temps  
à raison de sa finesse.

*D'infantation* l'inflammation peut encore affecter les  
paupières, qui quand elles arrivent à leur âge  
particulièrement à la conjonctive laquelle  
différente suivant quelle attaque l'organe  
qui les recouvre, au lieu de l'organe de la vision  
différence ne tient qu'à l'organisation  
de cette même membrane, sur le même état  
partie. En effet celle qui recouvre l'œil  
paupières est tout à fait différente de celle  
qui tapisse l'œil. Puisque l'une appuie  
des membranes lisses par les fonctions et  
son organisation, tandis que l'autre n'a  
nature des rugueuses. Aussi est-ce de celle  
qui recouvre l'œil, que les pathologistes  
choisissent pour donner une idée de l'état  
des membranes lisses, qui leur ressemblent  
parfaitement dans cet état, laquelle présente  
des petits vaisseaux gorgés de sang, qui  
aisément sur elles. Parmi les dépendances  
de cette même membrane celle qui tapisse  
les paupières est plus exposée à son inflammation  
que l'autre.

C'est à cette dernière que nous nous sommes  
spécialement, qui quand elle à l'inflammation  
régime appelée ophtalmie, lorsqu'elle est  
de l'organe l'unité produit ce qu'on nomme ophtalmie  
qui n'est autre chose qu'une petite tumeur  
infra-orbitaire albuginée ayant son  
siège dans le tissu cellulaire sous-jacent à  
la conjonctive, qui par sa nature est



rapprochée de des obstructions des plexus  
Il arrive également d'un côté du grand angle  
de l'œil, p. 100, dans certains cas en  
dessous, quand il y a dans l'autre est un peu  
étant plus grande par la présence qu'il y a  
les douleurs qui occasionnent

Causes

Les causes qui agissent bien, sont la  
différence de propriétés

Parvenue à certain point, il se termine  
par suppuration, dont le pus qui en est la liqueur et  
résulte se trouve le plus ord. réunis en un  
petit foyer, tandis que d'autre fois il est en  
un Vermine, laquelle donne issue en la  
pression au moyen de la base des doigts, qui  
suffit le plus souvent, pour le quel on fait  
cert. l'insertion si cela ne suffit point.

Il est assez commun chez les personnes de  
peuple, qui ne réclamant aux ord. point les  
personnes de l'art, et il se dissipe de lui  
même, quoiqu'il y ait il se convertit en un  
corps dur, pour le quel on est obligé de  
faire usage de petits remèdes fondants, pour  
détacher la suppuration.

Ophtalmie est de toutes les inflammations  
celle qui est la plus fréquente, aussi est-ce  
la plus commune aux yeux, et la plus  
leur traitement, qui leur donne plusieurs  
espèces, qui peut être considérée en aigue  
et en chronique  
1<sup>re</sup> Ophtalmie distinguée en deux  
espèces, en aigue et en chronique, ou

1<sup>re</sup> de l'aigue



486  
quelles on pourroit joindre la température  
mais n'est point une, comme dans le  
1.° l'aptitude essentielle pour tenir à quantité  
Causée cause la plus ordinaire tout l'empêchement  
de l'aptitude d'un air froid sur le globe de l'œil, peut  
être même à une cause regnant même  
dans l'atmosphère même où on voit  
régner également dans les grandes villes,  
et qu'on le voit il y a 99 ans temps à Paris  
la présence de corps irritants, en fait  
observer tantefois qu'il faut qu'ils y séjournent  
99 ans temps, puis qu'il arrive qu'il y a  
dirait au premier abord qu'une inflammation  
très vive en sera le résultat, mais la grande  
séparation ou séparation de l'air qu'ils attirent  
tandis qu'ils ont tant et tant de vie à  
l'instant pour ainsi dire de leur existence  
tant même l'opacité de l'œil à un état  
adroit, au bien sur un sol qui réfléchit  
les rayons lumineux. Beaucoup d'autres  
peuvent encore y donner lieu, qu'il est  
inutile de débattre. Quelques soit ceux  
y donner lieu, il suffit qu'ils existent, pour  
pouvoir la constater.

Signe

Comme toutes les autres, elle ne survient  
point tout de suite à la torpéfaction  
parce que les différents périodes, elle s'élève  
par des picotements, des douleurs p. un  
insupportable, qui 99 ans à raison d'un instant  
d'attente le bien-être. Des paupières,



de la conjonction, par le tissu cellulaire qui 480  
l'environne, qui se trouve gonflé,  
qui produit l'état que l'on désigne sous le  
nom de gonorrhée. Elle est plus ou moins  
longue à se terminer, il se voit qu'elle finit  
le 3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> jour, mais ce sont les mêmes faits,  
puisqu'il y a qui vont jusqu'à 28, 30.  
Lorsqu'elle existe, elle produit un trouble  
dans l'échelle du fluide sanguin qui  
lubrifie le globe de l'œil, lequel prend  
un changement de nature. Il est et de  
même de la chassie secrétée par les glandes  
de l'œil, qui se corrompt, prend de  
la consistance et détermine l'adhérence de  
l'œil dans certains cas. Lorsqu'elle est  
violente, elle peut produire des symptômes  
général, tels les douleurs de tête, lumbago  
parfois le.

Elle peut se terminer de deux manières 2<sup>e</sup> 4<sup>e</sup> chose  
supposant tantôt fait que l'œil ne soit plus  
inflamé, qui peut le devenir de laquelle  
est très incertain, ou bien par suite de continuation  
partie d'un lieu. Par rélutation, puis d'une  
manière chronique, ou dans un temps plus  
prolongé.

Certes les faits qu'elle est déterminée par  
une cause extérieure, qu'il y a par conséquent  
qu'elle existe lorsqu'on est appelé usage  
des répercussions causant en pareille



484

circumstance, tout en cumulant unis les  
quels produisent, que l'une manière d'ag  
qui in-arrête les progrès, et la dissip  
pétit à petit. Il ne faut pas cependant l'ign  
employer, car les questions sont que la  
soulageant, il faut les discontinuer, et les  
indépendant, parcequ'on a remarqué qu'elle  
se dissipe moins d'elle-même, par la ténac  
qu'à la nature à ramener tout à son état  
naturel. On joint à l'un usage le régime  
ainsi le malade évite le contact du air  
qui peut par sa présence l'entretenir et le  
détourner. son usage de substance de  
faite digestion, tout ce qui est adoucissant  
en éloignant les liqueurs alcooliques; l'usage  
sera modéré, ne fera aucun exercice fatig  
presque nullement relevant à ministres. Dans les  
cas de difficulté d'allaitement, l'usage  
de même des autres parties.

On peut encore faire usage de bain  
locaux, avec les lavachins convulsifs in  
l'eau tout simplement comme adoucissant  
de cataplasmes emollients, qui tiennent en par  
certaines circonstances, que l'on fasse  
usage de compresses avec certains sultans  
particuliers, avec ceux de pommade avec  
ou agoste un peu de taffetas ou de l'ég  
calmants. On doit éviter l'usage de l'ég  
les faire considérables, il faut même les  
faire moins, qu'à dire qu'ils soient trop  
épais, parcequ'ils chargeraient trop l'air,

c'est pour quoi que l'on doit en même temps  
qu'on s'occupe de l'entretien de l'humidité de  
l'œil, le renouveler fréquemment.  
On recommande encore l'usage des saignées  
du pied, préférablement à celles du bras,  
avec que l'on en cela d'arriver au sang  
à se porter aux pieds plutôt qu'à la tête,  
en produisant quelque appel les saignées  
répétées. Il ne paraît point que cela ait  
rien de cette manière, au contraire plutôt  
que l'effet n'est que sympathique, que l'effet  
qu'on en retire ne tient pas qu'à l'irritation  
que produit le bain de jambes d'autant que  
c'est pour cela. Cependant si l'on étoit  
certain que existât une sympathie entre  
les pieds pour pareille chose et la tête, on  
pourroit les faire. c'est à cette fin qu'on fait  
usage d'attacher pour cette partie, pour  
combattre l'affection d'une autre aussi d'après  
cela les chirurgiens font ils prescrire  
maintenant des saignées du bras, en y  
attachant autant de point. On peut faire  
faire prendre dans tous les cas des bains  
de pieds, admettre l'écoulement dans les  
embarras gastriques, pour débarrasser les  
premières voies.

On agit encore d'une manière locale  
c'est ainsi qu'on applique les sangsues les  
ventouses aux tempes, parce que l'irritation  
qu'on détermine produit d'autant mieux



l'effet, quel est plus près du lin app  
 On pourroit également les appliquer aux  
 les paupiers, mais on ne le fait point  
 parce qu'on a remarqué que leur application  
 provoquoit un gonflement dans la partie  
 où cela arrivoit. Dans tous les cas, on ne  
 le tire ultérieure est facile, car on le  
 remarque l'g. au fœtus, lorsqu'on les y  
 applique.

Lorsqu'on voit que la résolution suppose  
 il faut discontinuer l'emploi des évacuans  
 parce qu'on a remarqué qu'ils faisoient d'abord  
 l'effort en chronique, soit en relâchant  
 trop les parties ou autrement. Il faut aussi  
 faire usage de légers résolutifs avec la dose  
 de plante de. Lorsqu'elle a été de longue  
 durée, elle peut devenir de la durée de la  
 dangerosité, au de tâche qu'on n'en a pas  
 sur quoi nous reviendrons.

Cause de 2<sup>e</sup>. Elle a lieu d'une manière sympathique  
 la sympathie commune la suite de la gonorrhée de la  
 Blennorrhagie, opinion bien établie à ce  
 que l'on enseignoit dans le milieu du  
 dernier siècle, époque où l'on pensoit qu'il y  
 transport du fluide gonorrhéique dans  
 conjonctive, et qui causoit d'autant plus  
 l'opacification qu'il y avoit suppuration de la  
 dans le canal de l'urètre, et l'on admettoit  
 cette opinion, en feroit-il point qu'il  
 en exhalation, séparation et que des vaisseaux

l'absorbent pour le digérer sur la surface 187  
ce qui ne demanderait ni plus ni moins.  
encore supposons qu'il y ait une maladie  
Névrosique constitutionnelle, pour que cela  
existe. D'ailleurs on sait qu'il n'est pas que l'air  
peut avoir la propriété par l'usage mis  
de la bière, des liqueurs alcoolisées qui dans  
ce cas n'est qu'un remède, et ne fait durer  
que 9 ou 10 jours, qui dans ces cas, le fluide  
umide prend des caractères liés par la  
cause qui du d'ordinaire l'exhalation, qui  
s'indure aussi long temps que lorsqu'il  
est septique.

Si dans ce genre d'apoplexie la conjonction  
est infléchie partiellement, cela se voit.  
qui se remarque présente un caractère  
différent de celui des autres espèces, suivant  
la cause lymphatique qu'elle reçoit de la  
part du canal de l'isthme, qui d'ailleurs attire  
des fluides pour ces autres parties  
de même que les umides, qui se trouvent liés  
avec lui, d'une manière qui n'est pas inconnue.  
Cela pourrait encore paraître plus tranquille  
et n'est point septique, mais le fluide  
qui se présente en contact avec une autre  
membrane umide, chez une personne au  
cui n'aurait rien de l'apoplexie,  
dans cette espèce d'inflammation, tous  
les symptômes sont très intenses, qui, et  
sont d'un caractère umide présentant

Signes



488<sup>e</sup> caractère particulier, c'est d'insister  
au lieu d'insister trop du caractère légal  
un chirurgien attentif, instruit doit attribuer  
la suspicion, c'est lui d'ailleurs  
d'interroger le malade sur cette affection,  
lequel avouera le plus ord. qu'il a bien  
de craire que ce peut être la cause, puis  
qu'il a été frappé, lequel si par timidité ou  
autrement ne veut pas le dire - l'avoue et qu'il  
lui ou tous les autres qu'elle est causée par  
cette dernière, il faut dire que si la cause  
était connue, en employant ce qui convient.  
Continuement. Il arrive qd. quelquefois d'un certain temps  
l'esquille s'ouvre très intérieurement elle diminue  
peu à peu, au lieu de s'élargir de temps en  
le renouvellement de l'écaille, qui se renouvelle  
ce qui exige d'ailleurs ces traitements  
lorsqu'il ne paraît que très peu, même  
aussi dire pas, au lieu de l'écaille par  
l'interdiction de l'usage irritant de la lèvre  
ou la présence des algues, lorsqu'au contraire  
il s'écaille en certaine quantité au point  
de favoriser par le moyen d'un petit  
bâle l'usage, sans des cataplasmes, en mettant  
la lèvre dans de l'eau tiède,  
ou l'écaille. Dans le cas où l'écaille se détache  
l'écaille de la lèvre, accompagnée de l'écaille, soit  
la lèvre, soit la lèvre, soit la lèvre, soit la lèvre,  
qu'elle nait bien que par la lèvre, soit la lèvre,  
au lieu que le dernier se soit que le dernier

ou doit d'ailleurs l'écarter comme nous l'avons

déjà dit.

Quel que soit l'inflammation aigue peut être occasionnée  
encore de certains temps à de certains milieux  
ou intérêt, car on le remarque dans la  
Rangée, la petite vérole. C'est d'ailleurs  
affection que l'on a vu des enfants, spirituels  
dans cette dernière période de la vie. Aussi en cette  
circonstance faut-il porter les yeux du côté  
des yeux.

Le Quénosie que nous avons indiqué. Quénosie  
qui consiste dans le gonflement, le rougissement  
de la conjonctive, dans laquelle l'un voit un  
peu d'écoulement des larmes qui la piquent et  
qui doit pour en guérir les malades faire  
de petites incisions au moyen de la pince  
dans la conjonctive, ce qui est facile à faire par  
la douceur de l'instrument. Dans  
le cas ou le quénosie malgré cela persiste,  
il faudrait au lieu de l'incision, ce que  
l'on fait avec de petits ciseaux concaves  
à plat, ou pour chaque œil, que l'on  
d'écarter de cette manière un peu ou trois  
cinq fois.

2<sup>e</sup> L'ophtalmie chronique peut être distinguée  
en l'ophtalmie entraine espèce. D'abord une ophtalmie 2<sup>a</sup> de la  
nature d'une ophtalmie chronique c'est à dire  
essentielle, sympathique et symptomatique. 2<sup>e</sup>  
à une affection constante qui accompagne  
les paupières et le globe de l'œil, telle que



des saignees, de la cure d'une  
hernie à cette dernière à la suite de  
l'équie fait en dedans, soit en dehors ou  
nous l'avons dit. 50. Par une <sup>cause</sup> constitutionnelle  
règnante dans l'économie, c'est le Scrophule,  
le Venérien Dartreux.

Causé depuis point nous occupons de la  
deuxième espèce, en ce que nous n'avons  
parlé en traitant des affections qui lui donnaient  
lieu, puis qu'en son principe on voit mieux  
il n'est pas au même point qu'à la suite qu'il  
donne lieu.

De celle terminant l'écoulement  
l'écoulement. 10. Celle qui a des différentes espèces de  
l'écoulement, d'artère que souvent elle se voit  
mal traitée, qui alors dégénèrent en cancer  
on ne doit la considérer toute fois car elle  
que quand les causes qui sont données  
ont disparu, car si la petite fécule,  
rangée. Il est de cas où elle a une  
caractère, que qd. les Cils en tombent  
ordr. derrière parait. Les causes qui  
l'écoulement parait que cette petite fécule  
engendrant inégalement, celle qui restera  
suscite l'écoulement aussi dans certaines circonstances  
qui qd. l'écoulement la phthisie.

Saignée interne 20. Après nous dit l'écoulement peut être  
produit par une phthisie interne. Le Scrophule  
se reconnaît par les symptômes en général  
qui caractérisent le Scrophule, ainsi l'écoulement  
des ailes du nez du malade, lequel par

une tinte blanchâtre, sale, et le sang  
le gonflement de la lèvre supérieure la Maladie 98  
de la lèvre inférieure celle qui tient à une  
lipothémie constitutionnelle, cela est un sang plus  
difficile à coaguler survient 99. grand  
dans les typhes. Verrons nous des plaies de la  
arriver pour les ulcères du Vail du Palais  
unite d'une bande de soie blanche  
imposée pour elle qui est syphilitique.  
Ce qui peut encore faire reconnaître cette  
dernière, ce sont les informations prises  
de l'agit, une lèvre Maladie qu'il faut  
et d'un la Mucosa et d'un la Mucosa  
qu'il faut. Ce Verrons nous, on traite alors  
la Maladie par un traitement général,  
en administrant les chloreux, surtout  
ce n'est que cette lipothémie chronique,  
ou les ulcères du Palais qui font  
reconnaître la Maladie Verrons nous.  
Quand aux autres espèces d'ophtalmie  
elles sont dépendantes d'une cause locale  
ce qui fait que leur traitement est de  
même, ce qui n'est pas ainsi pour les autres.  
Les signes qui font reconnaître  
l'ophtalmie chronique, sont la Dure,  
le gonflement des paupières, une  
douleur plus ou moins considérable,  
une vision larmoyante, par larmes.



494 Le Médecin, les autres plus au  
mains forts.

Les Mayors d'ant. ont pour  
procure la guérison, l'ant. l'ant.  
appliqué avec les parties qui ont plus  
de rapport avec les yeux, en même  
temps que l'emploi des mayors  
locaux. Les irritants sont les  
et encore de préférence le salin dont  
il faut particulièrement faire usage  
en le continuant très longtemps.

fin

# Table Des Matières contenues

Dans le Deuxième tome.

Des Plaies Des Vêues urinaires -	1
Des Plaies Des Reins -	ib.
Des Plaies Des Ventrères -	ib.
Des Plaies De la Vessie -	ib.
Des Plaies Des intestins par instrumens tranchans 2	
Des Plaies De l'estomac par instrumens tranchans 3	
De la suture employée dans l'opération des parois abdominales -	4
De la suture des intestins, employée dans l'opération -	6
De l'épanchement sanguin abdominal -	12
Des Plaies Des Membres -	ib.
Des Plaies Des articulations -	13
Des cautères -	18
De la cautérisation Des articulations -	21
Des Plaies Des membres supérieurs -	ib.
Des plaies Des artères -	25
Des Plaies de poignet -	ib.
Des Plaies De la paume de la main -	ib.
De la fracture De la clavicule -	32
De la fracture De l'omoplate -	38
De la fracture De l'humérus -	42
De la fracture Des os De l'avant bras -	47
De la fracture De l'olécranon -	53
De la fracture Des os De la main -	58
Des Plaies Des membres inférieurs -	ib.
De la fracture Du fémur -	72
De la fracture De la rotule -	80
De la fracture Des os De la jambe -	



De la fracture des os du pied et du tendon d'achille	84
Des Plaies d'armes à feu	85
De la guérison des plaies d'armes à feu	86
Des Plaies d'armes à feu des membres	87
Des Plaies d'armes à feu avec simples lésions	88
De continuité de nos parties	89
Des Plaies d'armes à feu avec fracture compliquée	90
Des accidents des plaies d'armes à feu	103
De la pourriture d'hôpital	107
De télanos	109
Des Plaies d'armes à feu avec ablation d'une partie	112
Des Plaies d'armes à feu avec fracture des os et lésion des parties molles, sans lésion de continuité apparente	114
Des Plaies d'armes à feu suivant les parties intérieures	115
Des Plaies d'armes à feu de la tête	116
Des Plaies d'armes à feu du cal	120
Des Plaies d'armes à feu de la poitrine	121
Des Plaies d'armes à feu du bas ventre	125
Des Plaies d'armes à feu des parties génitales	126
De l'extraction des corps étrangers	127
De l'extraction des corps étrangers de l'œil	128
De l'extraction des corps étrangers des narines	129
De l'extraction des corps étrangers des oreilles	130
De l'extraction des corps étrangers du larynx	131
De l'extraction des corps étrangers du pharynx	132
De l'extraction des corps étrangers de l'estomac	133
De l'extraction des corps étrangers du rectum	134
De l'extraction des corps étrangers des parties génitales chez l'homme	135
De l'extraction des corps étrangers, des parties	136

généralité des luxations	141
Des différentes espèces de Luxations	142
Des luxations	ib.
De la luxation des os immobiles	150
De la luxation des os par engrenement	ib.
De la luxation des os par juste opposition	151
De la luxation des os par implantation	ib.
De la luxation des os mobiles	152
De la luxation des os à surface articulaire	ib.
De la luxation du coccyx	ib.
De la luxation des os immuables	153
De la luxation des vertèbres	ib.
De la luxation des os à surface articulaire	155
De la luxation des os qui ne jouissent que d'un glissement	ib.
De la luxation de l'articulation scapulaire de la Clavicule	ib.
De la luxation des os du carpe	158
De la luxation du péroné	159
De la luxation des os du tarse	ib.
De la luxation des os qui ne jouissent que d'un mouvement de rotation	160
De la luxation de la première vertèbre sur la deuxième	ib.
De la luxation des os de l'avant bras entrecroisés	ib.
De la luxation des os qui jouissent de mouvements de flexion et d'extension bornés	163
De la luxation huméro-cubitale	ib.
De la luxation fémoro-tibiale	163
De la luxation des os qui jouissent d'un mouvement de circonvolution et d'opposition	172
De la luxation de la machine inférieure	ib.
De la luxation de l'articulation humérale de la Clavicule	178
De la luxation du poignet	180
De la luxation des os du Métacarpe et des Phalanges	181
De la luxation du pied	185



De la location des os qui joignent de l'opposition & que de la circunduction et de la rotation	186
De la location d'articulation scapulo-humérale	ib.
De la location de l'articulation trochanterale	198
Des hernies	204
Des hernies de la tête	ib.
De la hernie du cerveau	ib.
Des hernies de la poitrine	207
De la hernie du foie	ib.
Des hernies du bas-ventre	208
De la généralité des hernies du bas-ventre	ib.
Des hernies de la paroi antérieure du bas-ventre	ib.
De la hernie inguinale	218
De la hernie congénitale	220
De la hernie crurale	ib.
De la hernie ombilicale	ib.
Des ligues de quatre espèces de hernies	222
De leur traitement	223
De celles qui sont réductibles	ib.
Des bandages inventés pour les hernies	226
De la manière de les appliquer	229
Des moyens proposés pour la sac herniaire	231
B. Des hernies irréductibles sans étranglement	238
C. Des hernies irréductibles avec étranglement	239
Des ligues	248
De l'opération de la hernie	250
De la complication des hernies	ib.
De la hernie des parties	265
De l'affection de l'épiploon	ib.
De l'affection de l'intestin	265
Des moyens proposés pour rétablir la communication	267
Des matières intestinales	ib.
Des autres espèces de hernies de la même région	270

Des hernies de la parois inférieure du bas-ventre	231
De la hernie du bras sciatique	232
De la hernie du trou osseux	233
De la hernie du péricrâne	234
De la hernie vaginale	235
Des hernies de la parois supérieure du bas-ventre	236
De la hernie lombaire	237
Des hernies de la parois supérieure du bas-ventre	238
Des hernies produites par les autres viscères abdominaux	239
De la hernie de l'estomac	240
De la hernie de la rate	241
De la hernie des intestins	242
De la hernie de la matrice	243
De la hernie de la vessie	244
Des hernies musculaires	245
Des Ulcères	246
De leurs généralités	247
Des Ulcères des parties molles	248
Des Ulcères produits par une cause physique	249
ou organique	250
Des Ulcères qui émanent de la peau	251
Des Ulcères fistuleux	252
Des Ulcères callus	253
Des Ulcères raténus	254
Des Ulcères cancéreux	255
De l'écrou	256
Des Ulcères qui sont liés avec une tumeur	257
de la nature d'écrou	258
Des Ulcères produits par une cause locale	259
ou générale	260
Des Ulcères produits par une affection	261
organique de la peau	262
De l'ulcère phagénique	263
De l'ulcère dartreux	264



Des Vices produits par une cause interne	334
De l'ulcère tuberculeux	ib.
De l'ulcère trochanterique	337
De l'ulcère humeral	340
Des Vices des Parties dures	347
De la Carie	ib.
De la Carie suivant chaque partie affectée	352
De la carie des os maxillaires	353
De la carie des os propres du nez	ib.
De la carie de la mandibule palatine	354
De la carie de la mandibule inférieure	ib.
De la carie des dents	356
De la carie de la langue	ib.
De la carie du pharynx	ib.
De la carie des côtes	ib.
De la carie des vertèbres	357
Des Depots par congestion	358
De la Goutte ou mal de pied	358
De la Carie du sacrum & du coccyx	359

## Classe troisième.

Des affections

des sens

## Des Maladies de quelques

organes en particulier

Des yeux

Des yeux par dilatation artérielle

Des yeux par dilatation des vaisseaux lymphatiques

Des yeux par dilatation de la seule tunique arachnoïdienne

Des yeux par dilatation de la tunique sclérotique

Des yeux par destruction des deux yeux

Des yeux par destruction des deux yeux

Des yeux par destruction des deux yeux

Des anévrysmes par tumeur artérielle aneurysm.	441
Des anévrysmes par érosion lente de toute l'épaisseur	ib.
Des anévrysmes par tumeur artérielle	ib.
Des anévrysmes par suite d'une guérison imparfaite	ib.
D'une plaie artérielle et l'expulsion du caillot qui	ib.
Reste formé momentanément	442
Des anévrysmes suivant les parties où elles se	ib.
développent	446
Des anévrysmes de l'artère carotide	ib.
Des anévrysmes de l'artère sous-clavière	447
Des anévrysmes de l'artère axillaire	ib.
Des anévrysmes de l'artère humérale	448
Des anévrysmes des artères radiale et cubitale	449
Des anévrysmes des artères iliaques et fémorales	ib.
Des anévrysmes de l'artère crurale	ib.
Des affections du système veineux	421
Des tumeurs variqueuses anévrysmatiques	ib.
Des varices	424
Des affections du système absorbant	427
Des maladies des vaisseaux lymphatiques	428
Des engorgements des glandes lymphatiques	ib.
Des affections du système nerveux	432
Des névralgies	ib.
Des ganglions	435
Des affections du système cellulaire	438
De l'écrou	ib.
Des loupes	440
Des tumeurs	441
Des tumeurs sanguines	ib.
Des hydatides	442
Des tumeurs anévrysmiques	443
En traitant de ces dernières affections	444
Des affections du système cutané	447
Des ulcères	448



Des corps	451
Des Aquions	452
Des valvules	458
Des accroissements qui n'ont pas de lieu bien déterminés	454
De la toue	455
Des maladies des angles	459
Des affections du système muqueux	460
Il peut être le siège de caries, d'ulcères, de cancers, d'hémorragies, de tumeurs spongieuses et sangeuses	ib.
Des affections du système séreux	464
Il est exposé à des inflammations et des hydropisies	ib.
Des affections du système synoviale	466
Il peut être le siège d'inflammation et de petits tubercules	ib.
Des affections du système cartilagineux	467
Des caries peuvent se développer	ib.

### Classe quatrième

Des maladies suivant l'ordre des fonctions, tant de la vie animale que de la vie organique et de celle destinée à la conservation de l'espèce	468
Elles peuvent être toutes, rapportées à trois vices, originelles, organiques, et aux troubles et altérations	ib.
Des maladies de la vie animale, extérieure, ou relative	ib.
Des maladies de l'organe de la vue	469
Des maladies originelles	ib.
A. Des maladies originelles	ib.
De l'adhérence des paupières	471
De l'éraillure	ib.
De l'absence du globe de l'œil	476
B. Des maladies organiques	ib.
Des maladies organiques	479

De l'œdème des paupières	480
Des loupes et des tumeurs aux lèbres	481
De l'orgelet	482
De l'ophtalmie aiguë	483
De la kératite	484
De l'ophtalmie chronique	485


---




1770  
1771  
1772  
1773


Received of the  
Honble the Secretary  
of the Treasury  
the sum of  
£ 1000  
for the  
year 1770

—














MS.  
B  
302  
V. 2



